


CAPÍTULO REIVINDICATORIO


1. Un método de fabricación de los compuestos de la Fórmula III, que comprende los pasos de:

a. obtener un compuesto de Fórmula II




b. contactar el compuesto de la Fórmula II, con un carbonato alcalino y un agente alquilante; y


c. formar un compuesto de la Fórmula III:



en donde R_1 es



R_2 se selecciona del grupo que consiste en:




y en donde

- i. la etapa de contactar incluye un disolvente y se lleva a cabo entre $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ii. la relación molar entre el compuesto de Fórmula II y el carbonato alcalino es de 3:1 a 1:1; y
- iii. la relación molar entre el compuesto de Fórmula II y el agente alquilante es de 1:1 a 3:1.


2. El método de la Reivindicación 1, en donde la etapa de contactar se lleva a cabo entre $22\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3. El método de la Reivindicación 1 o 2, en donde el disolvente es seleccionado del grupo que consiste en: DMF, DMSO, DMA, NMP, y CH_3CN .
4. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde el carbonato alcalino se selecciona del grupo que consiste en: Na_2CO_3 , K_2CO_3 , Cs_2CO_3 , y Li_2CO_3 .
5. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el agente alquilante se selecciona del grupo que consiste en: haluros de alquilo y haluros de bencilo.
6. El método de la Reivindicación 5, en donde los haluros de alquilo y los haluros de bencilo se seleccionan del grupo que consiste en: yoduro de metilo, yoduro de etilo, y bromuro de bencilo.
7. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en donde el carbonato alcalino es Cs_2CO_3 , y el disolvente es DMF.
8. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, en donde la relación molar entre el compuesto de Fórmula II y el carbonato alcalino es de 2:1.
9. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, que comprende además el paso de diluir una mezcla de reacción completa con CH_3CN y $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ acuoso al 2,5 %.
10. El método de la Reivindicación 9, en donde la relación entre DMF y CH_3CN es de 1:1 a 3:1 y la relación entre DMF y $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ acuoso al 2,5 % es de 1:2 a 2:1.
11. El método de la Reivindicación 10, en donde la relación entre DMF y CH_3CN es de 2:1 y la relación entre DMF y $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ acuoso al 2,5 % es de 1:1.
12. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, en donde el compuesto de Fórmula II se prepara mediante los pasos de:
 - a. obtener un compuesto de Fórmula I:



I ;


- b. contactar el compuesto de Fórmula I con bis-*N,O*-trimetilsililacetamida; y
- c. formar un compuesto de la Fórmula II:



II ;

en donde la relación molar entre el compuesto de Fórmula I y bis-*N,O*-trimetilsililacetamida es de 1:1,1 y la etapa de contactar se lleva a cabo a una temperatura de 22 °C hasta 70 °C.


13. El método de la Reivindicación 12, en donde la etapa de contactar incluye además contactar el compuesto de Fórmula I con CH₃CN.
14. El método de la Reivindicación 12 o 13, que comprende además la etapa de contactar una mezcla de reacción tratada con bis-*N,O*-trimetilsililacetamida con un cloruro de arilsulfonilo.
15. El método de la Reivindicación 14, en donde la relación molar entre el compuesto de Fórmula I y el cloruro de arilsulfonilo es de 1:2 a 2:1.
16. El método de la Reivindicación 15, en donde la relación molar entre el compuesto de Fórmula I y el cloruro de arilsulfonilo es 1:1,1
17. Un compuesto de fórmula III:




III ,

en donde R_1 es  ; y

R_2 se selecciona del grupo que consiste en:



isómero óptico, o una sal del mismo.

18. El compuesto de la Reivindicación 17, en donde R_1 es  y R_2 es  ; o un tautómero, o un isómero óptico, o una sal del mismo.

19. El compuesto de la Reivindicación 17 o 18, en donde la sal es clorhidrato, bromhidrato o yodhidrato.

20. Una composición que comprende el compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 17 a 19 y un material portador fitológicamente aceptable.

21. La composición de la Reivindicación 20, en donde la composición comprende además un surfactante adyuvante.