


MARZO 2018

1. Un compuesto peptídico de la fórmula:



en la que:

R¹, R², R³ y R⁴ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno; alquilo C₁-C₆; y -OR^x, en el que R^x es hidrógeno;

R⁵ y R⁶ son hidrógeno;

R⁷ y R⁸ son hidrógeno;

R⁹ y R¹⁰ son hidrógeno; o R⁹ y R¹⁰, junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo de 4-6 miembros sustituido o no sustituido y

sales, estereoisómeros, e hidratos farmacéuticamente aceptables de estos.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R^9 es hidrógeno.

3. El compuesto de la reivindicación 1 o 2, en el que R^{10} es hidrógeno.


4. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que al menos uno de R^1 , R^2 , R^3 y R^4 es hidroxilo.

5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que al menos uno de R^1 , R^2 , R^3 y R^4 es alquilo C_1 - C_6 .


6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en el que al menos uno de R^5 y R^6 es hidrógeno.

7. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^9 y R^{10} , junto con los átomos a los que se encuentran unidos, forman un anillo de 4 miembros.


8. El compuesto de la reivindicación 1 representado por:



9. El compuesto de la reivindicación 1 representado por:



10. El compuesto de la reivindicación 1 representado por:



11. El compuesto de la reivindicación 1 representado por:

