


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1. Composiciones plaguicidas, **caracterizadas** porque comprenden como compuestos activos

1) un compuesto de carboxamida activo como plaguicida I de la Fórmula (I):



y

2) un compuesto activo como plaguicida II seleccionado del grupo que consiste en:

- inhibidores de la biosíntesis de quitina tipo 0 seleccionados del grupo que consiste en teflubenzurón y flufenoxurón;
- componentes del árbol ginkgo seleccionados del grupo que consiste en bilobalida y ginkgolida A;
- agonistas del receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR) seleccionados del grupo que consiste en tiacloprid y acetamiprid;
- moduladores del canal de sodio seleccionados del grupo que consiste en bifentrina, lambda-cialotrin, alfa-cipermetrina y teflutrin;
- activadores del canal de cloruro seleccionados del grupo que consiste en emamectina y abamectina;
- antagonistas del canal de cloruro regulado por GABA seleccionados del grupo que consiste en etiprol;
- moduladores del receptor de rianodina seleccionados del grupo que consiste en ciantraniliprol (Cyazypyr®) y ciclaniliprol;
- compuestos activos insecticidas con modo de acción desconocido o incierto seleccionados del grupo que consiste en tioxazafen, sulfoxaflor, flupiradifurona, afidopiroopen, triflumezopirim, fluazaindolizina (8-cloro-N-[2-cloro-5-metoxifenil)sulfonil]-6-trifluorometil)-imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida) y flupirimin ((E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-acetamida);
- activadores alostéricos del receptor de acetilcolina nicotínico seleccionados del grupo que consiste en spinetoram;

- desacopladores de la fosforilación oxidativa mediante la alteración del gradiente protónico seleccionados del grupo que consiste en clorfenapir;
- bloqueadores del canal de sodio dependientes del voltaje seleccionados del grupo que consiste en metaflumizona;
- inhibidores del transporte de electrones del complejo mitocondrial II seleccionados del grupo que consiste en ciflumetofeno;
- inhibidores de acetilcolina esterasa (AChE) seleccionados del grupo que consiste en acefato;
- agonistas del receptor de ecdyson seleccionados del grupo que consiste en metoxifenoazida;
- inhibidores de acetil CoA carboxilasa seleccionados del grupo que consiste en espirotetramat, espiromesifeno y espirodiclofeno;

en una relación en peso del compuesto I al compuesto II comprendida entre 500:1 y 1:100.

2. Composiciones plaguicidas de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizadas porque el compuesto activo II es emamectin.

3. Composiciones plaguicidas de acuerdo con la Reivindicación 1, **caracterizadas** porque el compuesto activo II es teflubenzurón.

4. Composiciones plaguicidas de acuerdo con la Reivindicación 1, **caracterizadas** porque el compuesto activo II es ciantraniliprol.

5. Composiciones plaguicidas de acuerdo con la Reivindicación 1, **caracterizadas** porque el compuesto activo II es un plaguicida bioquímico del árbol ginkgo seleccionado del grupo que consiste en bilobalida, ginkgolida A.

6. Composiciones plaguicidas de acuerdo con la Reivindicación 1, **caracterizadas** porque el compuesto activo II es moduladores del canal de sodio seleccionados del grupo que consiste en bifentrina.