

TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS REIVINDICACIONES CONCEDIDAS POR LA USPTO Y LAS REIVINDICACIONES PENDIENTES ANTE LA SIC

Reivindicaciones patentadas USPTO	Reivindicaciones pendientes COLOMBIA	Explicación de la correspondencia
1. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 20-40% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 30-50% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 20-40% en peso de manitol, aproximadamente 1-10% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 1-10% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 0.1-2% en peso de estearato de magnesio. 2. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 28.57% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta,	1. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 20-40% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 30-50% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 20-40% en peso de manitol, aproximadamente 1-10% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 1-10% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 0.1-2% en peso de estearato de magnesio. 2. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 28.57% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta,	Las reivindicaciones actualmente pendientes ante la SIC son exactamente iguales a las concedidas por la USPTO

aproximadamente 37.43% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 26% en peso de manitol, aproximadamente 4% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 3% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 1% en peso de estearato de magnesio.	aproximadamente 37.43% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 26% en peso de manitol, aproximadamente 4% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 3% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 1% en peso de estearato de magnesio.	
3. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 20-40% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotopólogo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 20-40% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 20-40% en peso de manitol, aproximadamente 1-20% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 1-10% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 0.1-2% en peso de estearato de magnesio.	3. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 20-40% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotopólogo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 20-40% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 20-40% en peso de manitol, aproximadamente 1-20% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 1-10% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 0.1-2% en peso de estearato de magnesio.	
4. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 28.57% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero,	4. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 28.57% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero,	

solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 33.43% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 26% en peso de manitol, aproximadamente 8% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 3% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 1% en peso de estearato de magnesio.	solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 33.43% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 26% en peso de manitol, aproximadamente 8% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 3% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 1% en peso de estearato de magnesio.	
5. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 28.57% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, stereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 31.93% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 26% en peso de manitol, aproximadamente 8% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 4,5% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 1% en peso de estearato de magnesio.	5. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 28.57% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, stereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 31.93% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 26% en peso de manitol, aproximadamente 8% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 4,5% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 1% en peso de estearato de magnesio.	

6. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 20-40% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 20-50% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 20-40% en peso de manitol, aproximadamente 1-10% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 1-10% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 0.1-2% en peso de estearato de magnesio.	6. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 20-40% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 20-50% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 20-40% en peso de manitol, aproximadamente 1-10% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 1-10% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y aproximadamente 0.1-2% en peso de estearato de magnesio.	
7. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 28.57% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 35.93% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 26% en peso de manitol, aproximadamente 4% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 4,5% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y	7. Una composición farmacéutica que comprende aproximadamente 28.57% en peso de 2-(<i>terc</i>-butilamino)-4-((1R,3R,4R)-3-hidroxi-4-metilciclohexilamino)-pirimidina-5-carboxamida o una sal, estereoisómero, solvato, hidrato, isotópologo o forma sólida farmacéuticamente aceptable de esta, aproximadamente 35.93% en peso de celulosa microcristalina, aproximadamente 26% en peso de manitol, aproximadamente 4% en peso de carboximetil celulosa, aproximadamente 4,5% en peso de hidroxipropil metilcelulosa y	

aproximadamente 1% en peso de estearato de magnesio.

aproximadamente 1% en peso de estearato de magnesio.