

RESUMEN

Un compuesto representado por la fórmula (I) y que tiene una propiedad de modular la actividad de un receptor de andrógenos, o una sal médicamente aceptable del mismo. X representa S, u O; Z representa $(R^a)_n-A-(CR^{13}R^{14})_{0-1}-$ $(CR^{11}R^{12})_{0-1}-$; A representa un grupo arilo o un grupo heteroarilo; R^1 representa un grupo alquilo, un grupo cicloalquilo, un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo alcoxialquilo, un grupo arilo, un grupo arilalquilo, un grupo heterocíclico, o un grupo alquil heterocíclico; R^2 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo, un grupo cicloalquilo o un grupo fenilo; R^3 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo, un grupo cicloalquilo, un grupo alcoxialquilo, un grupo alquenilo, un grupo alquinilo, un grupo cicloalquenilo, un grupo arilo, un grupo arilalquilo, un grupo heterocíclico, un grupo alquil heterocíclico, un grupo acilo, un grupo cicloalquilcarbonilo, un grupo benzoílo, un grupo espiroalquilo, un grupo adamantilo, un grupo sililo, o $R^{31}R^{32}NCO-$; y R^4 y R^5 independientemente representan un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo, un grupo fenilo o un grupo cicloalquilo.

