




REIVINDICACIONES MODIFICADAS (JUNIO 2018)

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque:

El anillo A es un espiro[3,3]heptano opcionalmente sustituido con halógeno;



M se selecciona de N y CR^{10} ;

L se selecciona de $-(\text{CR}^4\text{R}^4)_{0-1}-$, $-(\text{CR}^4\text{R}^4)_{0-1} \text{C}(\text{O})-$, $-\text{OC}(\text{O})-$, $-\text{NR}^6\text{C}(\text{O})-$ y $-\text{NR}^6-$;

R^1 se selecciona de NR^5R^5 , OR^5 , $-(\text{CR}^4\text{R}^4)_n$ carbociclo C_{3-10} y $-(\text{CR}^4\text{R}^4)_n$ -heterociclo de 4 a 15 elementos que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y $\text{S}(\text{O})_p$; en donde el carbociclo y heterociclo se sustituyen

con 1-4 R⁷;

R³ es CH₃;

R⁴, en cada caso, se selecciona independientemente de H, OH, NH₂, CH₂NH₂, haloalquilo C₁₋₄, OCH₂F, OCHF₂, OCF₃, -NH(alquilo C₁₋₄), -N(alquilo C₁₋₄)₂, alcoxi C₁₋₄, CH₂OH, CH₂O(alquilo C₁₋₄), CH₂CO₂H, CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄), alquilo C₁₋₄, un carbociclo y un heterociclo, en donde el alquilo, alcoxi, haloalquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R⁹;

R⁵, en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₄, -(CR⁶R⁶)_n-carbociclo C₃₋₁₀ y -(CR⁶R⁶)_n-heterociclo de 4 a 10 elementos que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR⁸, O y S(O)_p, en donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 1-4 R⁷;

alternativamente, R⁵ y R⁵ se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 15 elementos sustituido con 1-4 R⁷;

R⁶, en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₄, CH₂NH₂, haloalquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, CH₂OH, CH₂O(alquilo C₁₋₄), CH₂CO₂H, CH₂CO₂(alquilo C₁₋₄), un carbociclo y un heterociclo, en donde el alquilo, alcoxi, haloalquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R⁹;

alternativamente, R¹ y R⁶ se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo que comprende átomos de carbono y 1-4

heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y S(O)_p , y se sustituye con 1-4 R^7 ;

R^7 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, =O, NO_2 , halógeno, alquilo C_{1-6} , alquilo C_{1-4} , alquenido C_{2-4} , alcoxi C_{1-4} , CN, OH, CF_3 , $-(\text{CH}_2)_n\text{-CO}_2\text{H}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-NR}^8\text{R}^8$, $-\text{NHCOH}$, $-\text{NHCO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCOCF}_3$, $-\text{NHCO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_3\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{CH}_2\text{NHCO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHC(O)NR}^8\text{R}^8$, $-\text{NHSO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{S(O)}_p(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{SO}_2\text{NH}_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{SO}_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-CONR}^8\text{R}^8$, $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{-carbociclo}$, $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{-heterociclo}$, $-\text{NHCO-carbociclo}$, $-\text{NHCO-heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-carbociclo}$ y $-(\text{CH}_2)_n\text{-heterociclo}$ que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y S(O)_p , en donde el alquilo, alquenido, alcoxi, un carbociclo y un heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , alquenido C_{2-4} , alquino C_{2-4} , $-(\text{CH}_2)_n\text{-C(O)alquilo } \text{C}_{1-4}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-C(O)carbociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-C(O)heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-C(O)NR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-NR}^a\text{C(O)alquilo } \text{C}_{1-4}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-C(O)O alquilo } \text{C}_{1-4}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-C(O)alquilo } \text{C}_{1-4}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-C(O)O-carbociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-C(O)O-heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-SO}_2\text{alquilo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-SO}_2\text{carbociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-SO}_2\text{ heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-SO}_2\text{NR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-carbociclo}$ y $-(\text{CH}_2)_n\text{-heterociclo}$, en

donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R⁹;

alternativamente, R⁸ y R⁸ se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos sustituido con 0-4 R⁹;

R⁹, en cada caso, se selecciona independientemente de halógeno, OH, =O, CN, NO₂, CHF₂, CF₃, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, CH₂OH, CO(alquilo C₁₋₄), CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), - (CHR¹⁰)_nNR^aR^a, - (CHR¹⁰)_nCONR^aR^a, - (CHR¹⁰)_nNR^aCO(alquilo C₁₋₄), - O(CHR¹⁰)_ncarbociclo, -O(CHR¹⁰)_nheterociclo, -O(CHR¹⁰)_nNR^aR^a y - (CR¹⁰R¹⁰)_n-heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b;

R¹⁰ se selecciona de H y alquilo C₁₋₄;

R^a, en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₄, -(CH₂)_nOH, CO(alquilo C₁₋₄), COCF₃, CO₂(alquilo C₁₋₄), -CONH₂, -CONH-alquilen C₁₋₄-CO₂(alquilo C₁₋₄), alquilen C₁₋₄-CO₂(alquilo C₁₋₄), R^c, CO₂R^c y CONHR^c; alternativamente, R^a y R^a se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alquilen y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b;

R^b, en cada caso, se selecciona independientemente de =O, OH, halógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, OCF₃, OC(O)alquilo C₁₋₄, NH₂, NO₂, N(alquilo C₁₋₄)₂, CO(alquilo C₁₋₄), CO(haloalquilo C₁₋₄), CO₂(alquilo C₁₋₄), CONH₂, -CONH(alquilo

C_{1-4}), $-\text{CON}(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-\text{CONH-alquilen } C_{1-4}-\text{O}(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-\text{CONH-alquilen } C_{1-4}-\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-\text{CONH-alquilen } C_{1-4}-\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-\text{alquilen } C_{1-4}-\text{O}-\text{P}(\text{O})(\text{OH})_2$, $-\text{NHCO}_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-\text{R}^c$, COR^c , CO_2R^c y CONHR^c , en donde el alquilo y alcoxi se sustituyen con R^d ;


R^c , en cada caso, se selecciona independientemente de $-(\text{CH}_2)_n\text{-cicloalquilo } C_{3-6}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-fenilo}$ y $-(\text{CH}_2)_n\text{-heterociclo}$ de 5 a 6 elementos que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, $\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})$, O y $\text{S}(\text{O})_p$; en donde cada porción del anillo se sustituye con 0-2 R^d ;

R^d , en cada caso, se selecciona independientemente de $=\text{O}$, halógeno, $-\text{OH}$, alquilo C_{1-4} , NH_2 , $\text{NH}(\text{alquilo } C_{1-4})$, $\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, alcoxi C_{1-4} y $-\text{NHCO}(\text{alquilo } C_{1-4})$, y un heterociclo que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, $\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})$, O y $\text{S}(\text{O})_p$;

n , en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y

p , en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1 y 2.

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la Fórmula (III):



o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:

M se selecciona de N y CR¹⁰;

R¹ se selecciona de NR⁵R⁵, OR⁵, -(CH₂)_n-carbociclo C₃₋₁₀ y -(CH₂)_n-heterociclo de 5 a 10 elementos, en donde el carbociclo y heterociclo se sustituyen con 1-4 R⁷.

R³ es CH₃;

R⁵, en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₄, -(CR⁶R⁶)_n-carbociclo C₃₋₁₀ y -(CR⁶R⁶)_n-heterociclo de 4 a 10 elementos que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR⁸, O y S(O)_p, en donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 1-4 R⁷;

alternativamente, R⁵ y R⁵ se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos sustituido con 1-4 R⁷;

R⁶, en cada caso, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₄;

R⁷, en cada caso, se selecciona independientemente de H, =O, NO₂, halógeno, alquilo C₁₋₆, alquilo C₁₋₄, alcoxi

C_{1-4} , CN , OH , CF_3 , $-(CH_2)_n-CO_2H$, $-(CH_2)_n-CO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-(CH_2)_n-NR^8R^8$, $-NHCOH$, $-NHCO$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCOCF_3$, $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_3O$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2OH$, $-NHCO_2(CH_2)_2NH_2$, $-NHCO_2(CH_2)_2N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-NHCO_2CH_2CO_2H$, $-CH_2NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHC(O)NR^8R^8$, $-NHSO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-S(O)_p$ (alquilo C_{1-4}), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH$ (alquilo C_{1-4}), $-SO_2N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-SO_2NH(CH_2)_2OH$, $-SO_2NH(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $-(CH_2)_n-CONR^8R^8$, $-O(CH_2)_n$ -carbociclo, $-O(CH_2)_n$ -heterociclo, $-NHCO$ -carbociclo, $-NHCO$ -heterociclo, $-(CH_2)_n$ -carbociclo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N , NR^8 , O y $S(O)_p$, en donde el alquilo, alqueno, alquino, alcoxilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente de H , alquilo C_{1-4} , alqueno C_{2-4} , $C(O)$ alquilo C_{1-4} , $C(O)$ carbociclo, $C(O)$ heterociclo, $-(CH_2)_n-C(O)NR^aR^a$, $-(CH_2)_n-NR^aC(O)$ alquilo C_{1-4} , $C(O)O$ alquilo C_{1-4} , $C(O)O$ -carbociclo, $C(O)O$ -heterociclo, SO_2 alquilo, SO_2 carbociclo, SO_2 heterociclo, $SO_2NR^aR^a$, $-(CH_2)_n$ -carbociclo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo, en donde el alquilo, alqueno, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^9 , en cada caso, se selecciona independientemente de halógeno, OH , CN , NO_2 , CHF_2 , CF_3 , alquilo C_{1-4} , alcoxilo C_{1-4} , CH_2OH , CO (alquilo C_{1-4}), CO_2H , CO_2 (alquilo C_{1-4}), $-(CHR^{10})_nNR^aR^a$, $-(CHR^{10})_nCONR^aR^a$, $-(CHR^{10})_nNR^aCO$ (alquilo C_{1-4}),

$O(CHR^{10})_n$ carbociclo, $-O(CHR^{10})_n$ heterociclo, $-O(CHR^{10})_nNR^aR^a$ y $-(CR^{10}R^{10})_n$ - heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ;

R^{10} se selecciona de H y alquilo C_{1-4} ;

R^a , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_nOH$, $CO(\text{alquilo } C_{1-4})$, $COCF_3$, $CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CONH_2$, $-CONH\text{-alquilen } C_{1-4}$, $-CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $\text{alquilen } C_{1-4}$, $-CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, R^c , CO_2R^c y $CONHR^c$; alternativamente, R^a y R^a se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alquilen y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ;

R^b , en cada caso, se selecciona independientemente de $=O$, halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , OCF_3 , $OC(O)\text{alquilo } C_{1-4}$, NH_2 , NO_2 , $N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $CO(\text{alquilo } C_{1-4})$, $CO(\text{haloalquilo } C_{1-4})$, $CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $CONH_2$, $-CONH(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CON(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-CONH\text{-alquilen } C_{1-4}$, $-O(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CONH\text{-alquilen } C_{1-4}$, $-N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-CONH\text{-alquilen } C_{1-4}$, $-N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-\text{alquilen } C_{1-4}$, $-O-P(O)(OH)_2$, $-NHCO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-R^c$, COR^c , CO_2R^c y $CONHR^c$, en donde el alquilo y alcoxi se sustituyen con R^d ;

R^c , en cada caso, se selecciona independientemente de $-(CH_2)_n$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CH_2)_n$ -fenilo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo de 5 a 6 elementos que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en:


N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)_p; en donde cada porción del anillo se sustituye con 0-2 R^d;

R^d, en cada caso, se selecciona independientemente de =O, halógeno, -OH, alquilo C₁₋₄, NH₂, NH(alquilo C₁₋₄), N(alquilo C₁₋₄)₂, alcoxi C₁₋₄ y -NHCO(alquilo C₁₋₄), y un heterociclo que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)_p;


n, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y

p, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1 y 2.

3. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, caracterizado porque tiene la Fórmula (IV):



o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:





11

R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , C(O)alquilo C_{1-4} , C(O)carbociclo, C(O)heterociclo, $-(CH_2)_n-C(O)NR^aR^a$, C(O)O alquilo C_{1-4} , C(O)O-carbociclo, C(O)O-heterociclo, SO_2 alquilo, SO_2 carbociclo, SO_2 heterociclo, $SO_2NR^aR^a$, $-(CH_2)_n$ -carbociclo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo, en donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

alternativamente, R^8 y R^8 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos sustituido con 0-4 R^9 ;

R^9 , en cada caso, se selecciona independientemente de halógeno, OH, CN, NO_2 , CHF_2 , CF_3 , alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CH_2OH , CO_2H , CO_2 (alquilo C_{1-4}), $CONH_2$, $-(CH_2)_nNR^aR^a$, $-(CH_2)_nCONR^aR^a$, $-(CH_2)_nNHCO$ (alquilo C_{1-4}), $-O(CH_2)_n$ heterociclo, $-O(CH_2)_{2-4}NR^aR^a$ y $-(CR^{10}R^{10})_n$ -heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ;


R^a , en cada caso, se selecciona independientemente de H y alquilo C_{1-4} ; alternativamente, R^a y R^a se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alquilenos y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ; y

R^b , en cada caso, se selecciona independientemente de $=O$, halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , OCF_3 , NH_2 , NO_2 , N (alquilo C_{1-4})₂, CO (alquilo C_{1-4}), CO (haloalquilo C_{1-4}), CO_2 (alquilo C_{1-4}), $CONH_2$, $-CONH$ (alquilo C_{1-4}), $-CON$ (alquilo

$C_{1-4})_2$, $-\text{CONH}-\text{alquilen } C_{1-4}-\text{O}(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-\text{CONH}-\text{alquilen } C_{1-4}-\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-\text{CONH}-\text{alquilen } C_{1-4}-\text{N}(\text{alquilo } C_{1-4})_2$ y $-\text{NHCO}_2(\text{alquilo } C_{1-4})$.

4. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3 o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque:


R^1 se selecciona de



R^7 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , $-\text{NR}^8\text{R}^8$, cicloalquilo C_{3-6} , fenilo y $-(\text{CH}_2)_n$ -heterociclo que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y $\text{S}(\text{O})_p$, en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , $-(\text{CH}_2)_n$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(\text{CH}_2)_n$ -fenilo y $-(\text{CH}_2)_n$ -heterociclo, en donde el alquilo, cicloalquilo, fenilo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

alternativamente, R^8 y R^8 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo seleccionado de:



R⁹, en cada caso, se selecciona independientemente de F, Cl, OH, CN, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, -(CH₂)_nNR^aR^a y un heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alcoxi y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b;

R^a, en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₄, -(CH₂)_nOH, CO(alquilo C₁₋₄), COCF₃, CO₂(alquilo C₁₋₄), -CONH₂, -CONH-alquilen C₁₋₄-CO₂(alquilo C₁₋₄) y alquilen C₁₋₄-CO₂(alquilo C₁₋₄); y

R^b, en cada caso, se selecciona independientemente de halógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, OCF₃, NH₂, NO₂, N(alquilo C₁₋₄)₂, CO(alquilo C₁₋₄), CO(haloalquilo C₁₋₄), CO₂(alquilo C₁₋₄), CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, -CONH-alquilen C₁₋₄-O(alquilo C₁₋₄), -CONH-alquilen C₁₋₄-N(alquilo C₁₋₄)₂, -CONH-alquilen C₁₋₄-N (alquilo C₁₋₄)₂, -alquilen C₁₋₄-O-P(O)(OH)₂ y -NHCO₂(alquilo C₁₋₄).

5. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2 o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque:

$$R^1 \text{ es } NR^5R^5;$$


R^5 y R^5 se toman junto con el átomo de nitrógeno al

que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos sustituido con 1-4 R⁷;

R⁷, en cada caso, se selecciona independientemente de H, halógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, CN, OH, CF₃ y -NR⁸R⁸;
y

R⁸, en cada caso, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₄.

6. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque tiene la Fórmula (V):



o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:

M se selecciona de N y CR¹⁰;

R¹ es un heterociclo de 5 a 10 elementos sustituido con 1-4 R⁷;

R⁶, en cada caso, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₄;

R⁷, en cada caso, se selecciona independientemente de H, =O, NO₂, halógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, CN, OH,

CF_3 , $-(\text{CH}_2)_n\text{-CO}_2\text{H}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-CO}_2(\text{alquilo C1-4})$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-NR}^8\text{R}^8$, $-$
 $\text{NHCO}(\text{alquilo C1-4})$, $-\text{NHCOCF}_3$, $-\text{NHCO}_2(\text{alquilo C1-4})$, $-$
 $\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo C1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_3\text{O}(\text{alquilo C1-4})$, $-$
 $\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo C1-4})_2$, $-$
 $\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{CH}_2\text{NHCO}_2(\text{alquilo C1-4})$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NR}^8\text{R}^8$, $-$
 $\text{NHSO}_2(\text{alquilo C1-4})$, $-\text{SO}_2\text{NH}_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{alquilo C1-4})$, $-$
 $\text{SO}_2\text{N}(\text{alquilo C1-4})_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo C1-4})$, $-$
 $(\text{CH}_2)_n\text{-CONR}^8\text{R}^8$, $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{-carbociclo}$, $-\text{O}(\text{CH}_2)_n\text{-heterociclo}$,
 $-\text{NHCO-carbociclo}$, $-\text{NHCO-heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n\text{-carbociclo}$, y $-$
 $(\text{CH}_2)_n\text{-heterociclo}$ que comprende átomos de carbono y 1-4
heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y $\text{S}(\text{O})_p$, en donde el
alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, carbociclo y
heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente
de H, alquilo C1-4, $-(\text{CH}_2)_n\text{-carbociclo}$ y $-(\text{CH}_2)_n\text{-heterociclo}$,
en donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen
con 0-4 R^9 ;

R^9 , en cada caso, se selecciona independientemente
de halógeno, OH, CN, NO_2 , CHF_2 , CF_3 , alquilo C1-4, alcoxi C1-
4, CH_2OH , $\text{CO}(\text{alquilo C1-4})$, CO_2H , $\text{CO}_2(\text{alquilo C1-4})$, $-$
 $(\text{CHR}^{10})_n\text{NR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CHR}^{10})_n\text{CONR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CHR}^{10})_n\text{NR}^a\text{CO}(\text{alquilo C1-4})$, $-$
 $\text{O}(\text{CHR}^{10})_n\text{carbociclo}$, $-\text{O}(\text{CHR}^{10})_n\text{heterociclo}$, $-\text{O}(\text{CHR}^{10})_n\text{NR}^a\text{R}^a$ y $-$
 $(\text{CR}^{10}\text{R}^{10})_n\text{-heterociclo}$ de 4 a 10 elementos, en donde el
alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con
0-4 R^b ;

R^{10} se selecciona de H y alquilo C1-4;

R^a , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C1-4, $-(CH_2)_nOH$, $CO(\text{alquilo C1-4})$, $COCF_3$, $CO_2(\text{alquilo C1-4})$, $-CONH_2$, $-CONH\text{-alquilen C1-4-}CO_2(\text{alquilo C1-4})$, $\text{alquilen C1-4-}CO_2(\text{alquilo C1-4})$, R^c , CO_2R^c y $CONHR^c$; alternativamente, R^a y R^a se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alquilen y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ;

R^b , en cada caso, se selecciona independientemente de $=O$, halógeno, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, OCF_3 , NH_2 , NO_2 , $N(\text{alquilo C1-4})_2$, $CO(\text{alquilo C1-4})$, $CO(\text{haloalquilo C1-4})$, $CO_2(\text{alquilo C1-4})$, $CONH_2$, $-CONH(\text{alquilo C1-4})$, $-CON(\text{alquilo C1-4})_2$, $-CONH\text{-alquilen C1-4-O}(\text{alquilo C1-4})$, $-CONH\text{-alquilen C1-4-N}(\text{alquilo C1-4})_2$, $-CONH\text{-alquilen C1-4-N}(\text{alquilo C1-4})_2$, $\text{alquilen C1-4-O-P(O)(OH)}_2$, $-NHCO_2(\text{alquilo C1-4})$, $-R^c$, COR^c , CO_2R^c y $CONHR^c$;

R^c , en cada caso, se selecciona independientemente de $-(CH_2)_n\text{-cicloalquilo C3-6}$, $-(CH_2)_n\text{-fenilo}$ y $-(CH_2)_n\text{-heterociclo de 5 a 6 elementos que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, N(alquilo C1-4), O y S(O)}_p$; en donde cada porción del anillo se sustituye con 0-2 R^d ;


R^d , en cada caso, se selecciona independientemente de $=O$, halógeno, $-OH$, alquilo C1-4, NH_2 , $NH(\text{alquilo C1-4})$, $N(\text{alquilo C1-4})_2$, alcoxi C1-4 y $-NHCO(\text{alquilo C1-4})$, y un heterociclo que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos

seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)_p;


n, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y

p, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1 y 2.

7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la Fórmula (VI):




o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:



R⁶ es H; y

R^7 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CN, OH, $-(CH_2)_n$ -carbociclo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo, en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 .

8. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la Fórmula (VII):



o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:

M se selecciona de N y CR^{10} ;

R^5 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , $-(CR^6R^6)_n$ -carbociclo C_{3-10} y $-(CR^6R^6)_n$ -heterociclo de 4 a 10 elementos que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y $S(O)_p$, en donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 1-4 R^7 ;

alternativamente, R^5 y R^5 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos sustituido con 1-4 R^7 ;

R^7 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, =O, NO_2 , halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CN, OH, CF_3 , $-(\text{CH}_2)_n-\text{CO}_2\text{H}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{NR}^8\text{R}^8$, $-\text{NHCO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCOCF}_3$, $-\text{NHCO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_3\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{CH}_2\text{NHCO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NR}^8\text{R}^8$, $-\text{NHSO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{SO}_2\text{NH}_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{SO}_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{CONR}^8\text{R}^8$, $-\text{O}(\text{CH}_2)_n-\text{carbociclo}$, $-\text{O}(\text{CH}_2)_n-\text{heterociclo}$, $-\text{NHCO}-\text{carbociclo}$, $-\text{NHCO}-\text{heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{carbociclo}$, y $-(\text{CH}_2)_n-\text{heterociclo}$ que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y $\text{S}(\text{O})_p$, en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , $\text{C}(\text{O})\text{alquilo } \text{C}_{1-4}$, $\text{C}(\text{O})\text{carbociclo}$, $\text{C}(\text{O})\text{heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{C}(\text{O})\text{NR}^a\text{R}^a$, $\text{C}(\text{O})\text{Oalquilo } \text{C}_{1-4}$, $\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{carbociclo}$, $\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{heterociclo}$, $\text{SO}_2\text{ alquilo}$, $\text{SO}_2\text{ carbociclo}$, $\text{SO}_2\text{ heterociclo}$, $\text{SO}_2\text{NR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{carbociclo}$ y $-(\text{CH}_2)_n-\text{heterociclo}$, en donde el alquilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^9 , en cada caso, se selecciona independientemente de halógeno, OH, CN, NO_2 , CHF_2 , CF_3 , alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CH_2OH , $\text{CO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, CO_2H , $\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-(\text{CHR}^{10})_n\text{NR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CHR}^{10})_n\text{CONR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CHR}^{10})_n\text{NR}^a\text{CO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, -

$O(CHR^{10})_n$ carbociclo, $-O(CHR^{10})_n$ heterociclo, $-O(CHR^{10})_nNR^aR^a$ y $-(CR^{10}R^{10})_n$ - heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ;

R^{10} se selecciona de H y alquilo C_{1-4} ;

R^a , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_nOH$, $CO(\text{alquilo } C_{1-4})$, $COCF_3$, $CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CONH_2$, $-CONH\text{-alquilen } C_{1-4}$, $-CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $\text{alquilen } C_{1-4}$, $-CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, R^c , CO_2R^c y $CONHR^c$; alternativamente, R^a y R^a se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alquilen y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ;

R^b , en cada caso, se selecciona independientemente de $=O$, halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , OCF_3 , NH_2 , NO_2 , $N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $CO(\text{alquilo } C_{1-4})$, $CO(\text{haloalquilo } C_{1-4})$, $CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $CONH_2$, $-CONH(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CON(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-CONH\text{-alquilen } C_{1-4}$, $-O(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CONH\text{-alquilen } C_{1-4}$, $N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-CONH\text{-alquilen } C_{1-4}$, $-N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $\text{-alquilen } C_{1-4}$, $-O-P(O)(OH)_2$, $-NHCO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-R^c$, COR^c , CO_2R^c y $CONHR^c$;

R^c , en cada caso, se selecciona independientemente de $-(CH_2)_n$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CH_2)_n$ -fenilo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo de 5 a 6 elementos que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, $N(\text{alquilo } C_{1-4})$, O y $S(O)_p$; en donde cada porción del

anillo se sustituye con 0-2 R^d;

R^d, en cada caso, se selecciona independientemente de =O, halógeno, -OH, alquilo C₁₋₄, NH₂, NH(alquilo C₁₋₄), N(alquilo C₁₋₄)₂, alcoxi C₁₋₄ y -NHCO(alquilo C₁₋₄), y un heterociclo que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)_p;


n, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y


p, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1 y 2.


9. El compuesto de conformidad con la reivindicación 8 o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque:

M es N;

R⁵ se selecciona de H, alquilo C₁₋₄, -(CH₂)_n-carbociclo C₃₋₁₀, -(CH₂)_n-arilo, -(CH₂)_n-heterociclo de 4 a 10


elementos seleccionados de ,





donde el alquilo, cicloalquilo, arilo se sustituyen con 1-4 R^7 ;

alternativamente, R^5 y R^5 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo seleccionado de:




R^7 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CN, OH, $-(CH_2)_n$ -carbociclo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo, en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 .

R^9 , en cada caso, se selecciona independientemente


de halógeno, OH, NO₂, CHF₂, CF₃, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, CH₂OH, CO₂H, CO₂(alquilo C₁₋₄), CONH₂, -NH₂ y heterociclo de 4 a 10 elementos.


10. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque tiene la Fórmula (VIII):




o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:



M se selecciona de N y CH;














alquinilo C_{2-4} , alcoxi C_{1-4} , CN, OH, CF_3 , $-(CH_2)_n-CO_2H$, $-(CH_2)_n-CO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-(CH_2)_n-NR^8R^8$, $-NHCOH$, $-NHCO$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCOCF_3$, $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_3O$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2OH$, $-NHCO_2(CH_2)_2NH_2$, $-NHCO_2(CH_2)_2N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-NHCO_2CH_2CO_2H$, $-(CH_2)_{1-2}NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHC(O)NR^8R^8$, $-NHSO_2$ (alquilo C_{1-4}), S (alquilo C_{1-4}), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH$ (alquilo C_{1-4}), $-SO_2N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-SO_2NH(CH_2)_2OH$, $-SO_2NH(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $-(CH_2)_n-CONR^8R^8$, $-O(CH_2)_n$ -carbociclo, $-O(CH_2)_n$ -heterociclo, $-NHCO$ -carbociclo, $-NHCO$ -heterociclo, $-(CH_2)_n$ -carbociclo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O, and $S(O)_p$, en donde el alquilo, alqueno, alquinilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituye con 0-4 R^9 , y en donde el carbociclo se selecciona de




y en donde el heterociclo se selecciona de



R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , $C(O)$ alquilo C_{1-4} , $C(O)$ carbociclo,

C(O)heterociclo, $-(CH_2)_n-C(O)NR^aR^a$, $-(CH_2)_n-NHC(O)$ alquilo C_{1-4} , C(O)O- alquilo C_{1-4} , C(O)O-carbociclo, C(O)O-heterociclo, SO₂ alquilo, SO₂ carbociclo, SO₂ heterociclo, SO₂NR^aR^a, $-(CH_2)_n-C_3-6$ cicloalquilo, $-(CH_2)_n$ -arilo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo, en donde el alquilo, cicloalquilo, arilo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R⁹;

alternativamente, R⁸ y R⁸ se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo seleccionado de:



R⁹, en cada caso, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, I, OH, =O, CN, NO₂, CHF₂, CF₃, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CH₂OH, CO₂H, CO₂(alquilo C_{1-4}), CONH₂, $-(CH_2)_nNR^aR^a$, $-(CH_2)_nCONR^aR^a$, $-(CH_2)_nNHCO$ (alquilo C_{1-4}), $-O(CH_2)_n$ heterociclo, $-O(CH_2)_{2-4}NR^aR^a$, $-(CH_2)_n$ -carbociclo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b;

R^a, en cada caso, se selecciona independientemente

de H y alquilo C₁₋₄; alternatively, R^a y R^a se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alquilen y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b;


R^b, en cada caso, se selecciona independientemente de =O, halógeno, alquilo C₁₋₄, alcoxi C₁₋₄, OCF₃, OC(O)alquilo C₁₋₄, NH₂, NO₂, N(alquilo C₁₋₄)₂, CO(alquilo C₁₋₄), CO(haloalquilo C₁₋₄), CO₂(alquilo C₁₋₄), CONH₂, -CONH(alquilo C₁₋₄), -CON(alquilo C₁₋₄)₂, -CONH-alquilen C₁₋₄-O(alquilo C₁₋₄), -CONH-alquilen C₁₋₄-N(alquilo C₁₋₄)₂, -CONH-alquilen C₁₋₄-N(alquilo C₁₋₄)₂ y -NHCO₂(alquilo C₁₋₄), en donde el alquilo y alcoxi se sustituyen con R^d;

R^d, en cada caso, se selecciona independientemente de =O, halógeno, -OH, alquilo C₁₋₄, NH₂, NH(alquilo C₁₋₄), N(alquilo C₁₋₄)₂, alcoxi C₁₋₄ y -NHCO(alquilo C₁₋₄), y un heterociclo que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)_p;

n, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y

p, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1 y 2.

11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque tiene la Fórmula (VIII):




R^5 y R^5 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo seleccionado de:





30


$(\text{CH}_2)_n\text{-NR}^8\text{R}^8$, $\text{-NHSO}_2(\text{alquilo C}_{1-4})$, $\text{-SO}_2\text{NH}_2$, $\text{-SO}_2\text{NH}(\text{alquilo C}_{1-4})$,
 $\text{-SO}_2\text{N}(\text{alquilo C}_{1-4})_2$, $\text{-(CH}_2)_n\text{-CONR}^8\text{R}^8$, $\text{-(CH}_2)_n\text{-fenilo}$ y $\text{-(CH}_2)_n\text{-}$
heterociclo seleccionado de



;


R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente

de H, CF_3 , CD_3 , CH_3 , $\text{C}(\text{CH}_3)_3$, ,  y



;

alternativamente, R^8 y R^8 se toman juntos para


formar  ; y

R^9 , en cada caso, se selecciona independientemente
de F, Cl, OH, NO_2 , CHF_2 , $(\text{CH}_2)_{0-2}\text{CF}_3$, CD_3 , CH_3 , Oalquilo C_{1-4} ,
 SO_2NH_2 y fenilo sustituido con alquilo C_{1-4} .

12. El compuesto de conformidad con la
reivindicación 6 o una sal del mismo farmacéuticamente
aceptable, caracterizado porque:

M es N;

R^1 y R^6 se toman junto con el átomo de nitrógeno al
que están unidos para formar un heterociclo seleccionado de:



R^7 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CN, OH, CF_3 , $-(CH_2)_n-CO_2H$, $-(CH_2)_n-CO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-(CH_2)_n-NR^8R^8$, $-NHCO$ (alquilo C_{1-4}), $-NHC(O)NR^8R^8$, $-NHSO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-SO_2NH_2$, $-SO_2NH$ (alquilo C_{1-4}), $-SO_2N$ (alquilo C_{1-4})₂, $-SO_2NH(CH_2)_2OH$, $-SO_2NH(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), $-(CH_2)_n-CONR^8R^8$, $-(CH_2)_n$ -carbociclo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y $S(O)_p$, en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente de H y alquilo C_{1-4} :


R^9 , en cada caso, se selecciona independientemente de halógeno, OH, CN, NO_2 , CHF_2 , CF_3 , alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CH_2OH , CO (alquilo C_{1-4}), CO_2H y CO_2 (alquilo C_{1-4});

n, en cada caso, se selecciona

independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y

p, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1 y 2.

13. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tiene la Fórmula (IX):



o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, en donde:

R^1 se selecciona de NR^5R^5 y un heterociclo de 5 a 10 elementos sustituido con 1-4 R^7 ;

R^3 es CH_3 ;

R^5 y R^5 se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos sustituido con 1-4 R^7 ;

R^7 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, =O, NO_2 , halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , CN, OH, CF_3 , $-(CH_2)_n-CO_2H$, $-(CH_2)_n-CO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-(CH_2)_n-NR^8R^8$, $-NHCO$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCOCF_3$, $-NHCO_2$ (alquilo C_{1-4}), $-NHCO_2(CH_2)_2O$ (alquilo C_{1-4}), -

$\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_3\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2$,
 $-\text{NHCO}_2(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{NHCO}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{CH}_2\text{NHCO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{NR}^8\text{R}^8$, $-\text{NHSO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$,
 $-\text{SO}_2\text{NH}_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{SO}_2\text{N}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})_2$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{OH}$, $-\text{SO}_2\text{NH}(\text{CH}_2)_2\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{CONR}^8\text{R}^8$,
 $-\text{O}(\text{CH}_2)_n-\text{carbociclo}$, $-\text{O}(\text{CH}_2)_n-\text{heterociclo}$, $-\text{NHCO}-\text{carbociclo}$, $-\text{NHCO}-\text{heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{carbociclo}$, y $-(\text{CH}_2)_n-\text{heterociclo}$ que comprende átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de N, NR^8 , O y $\text{S}(\text{O})_p$, en donde el alquilo, alqueno, alquino, alcoxilo, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^8 , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , alqueno C_{2-4} , $\text{C}(\text{O})\text{alquilo } \text{C}_{1-4}$, $\text{C}(\text{O})\text{carbociclo}$, $\text{C}(\text{O})\text{heterociclo}$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{C}(\text{O})\text{NR}^a\text{R}^a$, $\text{C}(\text{O})\text{Oalquilo } \text{C}_{1-4}$, $\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{carbociclo}$, $\text{C}(\text{O})\text{O}-\text{heterociclo}$, $\text{SO}_2\text{alquilo}$, $\text{SO}_2\text{carbociclo}$, $\text{SO}_2\text{heterociclo}$, $\text{SO}_2\text{NR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CH}_2)_n-\text{carbociclo}$ y $-(\text{CH}_2)_n-\text{heterociclo}$, en donde el alquilo, alqueno, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^9 ;

R^9 , en cada caso, se selecciona independientemente de halógeno, OH, CN, NO_2 , CHF_2 , CF_3 , alquilo C_{1-4} , alcoxilo C_{1-4} , CH_2OH , $\text{CO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, CO_2H , $\text{CO}_2(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-(\text{CHR}^{10})_n\text{NR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CHR}^{10})_n\text{CONR}^a\text{R}^a$, $-(\text{CHR}^{10})_n\text{NR}^a\text{CO}(\text{alquilo } \text{C}_{1-4})$, $-\text{O}(\text{CHR}^{10})_n\text{carbociclo}$, $-\text{O}(\text{CHR}^{10})_n\text{heterociclo}$, $-\text{O}(\text{CHR}^{10})_n\text{NR}^a\text{R}^a$ y $-(\text{CR}^{10}\text{R}^{10})_n-\text{heterociclo}$ de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo,

alcoxi, carbociclo y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ;

R^{10} se selecciona de H y alquilo C_{1-4} ;

R^a , en cada caso, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_nOH$, $CO(\text{alquilo } C_{1-4})$, $COCF_3$, $CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CONH_2$, $-CONH-$ alquilen $C_{1-4}-CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, alquilen $C_{1-4}-CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, R^c , CO_2R^c y $CONHR^c$; alternativamente, R^a y R^a se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterociclo de 4 a 10 elementos, en donde el alquilo, alquilen y heterociclo se sustituyen con 0-4 R^b ;

R^b , en cada caso, se selecciona independientemente de $=O$, halógeno, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , OCF_3 , NH_2 , NO_2 , $N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $CO(\text{alquilo } C_{1-4})$, $CO(\text{haloalquilo } C_{1-4})$, $CO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $CONH_2$, $-CONH(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CON(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-CONH-$ alquilen $C_{1-4}-O(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-CONH-$ alquilen $C_{1-4}-N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-CONH-$ alquilen $C_{1-4}-N(\text{alquilo } C_{1-4})_2$, $-alquilen C_{1-4}-O-P(O)(OH)_2$, $-NHCO_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-R^c$, COR^c , CO_2R^c y $CONHR^c$;

R^c , en cada caso, se selecciona independientemente de $-(CH_2)_n$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CH_2)_n$ -fenilo y $-(CH_2)_n$ -heterociclo de 5 a 6 elementos que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, $N(\text{alquilo } C_{1-4})$, O y $S(O)_p$; en donde cada porción del anillo se

sustituye con 0-2 R^d;

R^d, en cada caso, se selecciona independientemente de =O, halógeno, -OH, alquilo C₁₋₄, NH₂, NH(alquilo C₁₋₄), N(alquilo C₁₋₄)₂, alcoxi C₁₋₄ y -NHCO(alquilo C₁₋₄), y un heterociclo que contiene átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en: N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)_p;

n, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y

p, en cada caso, se selecciona independientemente de 0, 1 y 2.

14. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en

N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-inden-2-carboxamida,

4-(dimetilamino)-N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

2-(naftalen-1-il)-N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]acetamida,

2-(naftalen-2-il)-N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]acetamida,

1-metil-N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-3-fenilpropanamida,

N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-3-carboxamida,
 3-metil-N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 1-*terc*-butil-N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida,
 N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-fenil-1H-pirazol-3-carboxamida,
 1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,
 N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 5-metil-N-[6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxamida,
 1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,
 N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-3-carboxamida,
 1-(2,2-difluoroetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida,
 1-metil-N-[(aS)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

N-[(aS)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-pirazol-3-carboxamida,

1-(2,2-difluoroetil)-N-[(aS)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida,

5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-pirazol-3-carboxamida,

1-(ciclopropilmetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida,

3-ciclopropil-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-5-carboxamida,

1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamida,

5-ciclopropil-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida,

1-ciclopropil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida,

5-(difluorometoxi)-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida,

1-ciclopropil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida,

6-fluoro-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2,2-difluoroetil)-3-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida,

4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2-(piperidin-1-il)-1,3-tiazol-5-carboxamida,

4-metil-2-(morfolin-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2-(pirrolidin-1-il)-1,3-tiazol-5-carboxamida,

2-[(3S)-3-fluoropirrolidin-1-il]-4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

2-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-il]-4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

2-[(3S)-3-cianopirrolidin-1-il]-4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

2-[(3R)-3-cianopirrolidin-1-il]-4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

rel-2-[(1S,5R)-2-azabicciclo[3.1.0]hexan-2-il]-4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

2-(ciclopropilamino)-4-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

4-(aR)-{6-[(5-fenil-1,3,4-tiadiazol-2-il)amino]espiro[3.3]heptan-2-il}-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-(aR)-{6-[(5-fenil-1,3-oxazol-2-il)amino]espiro[3.3]heptan-2-il}-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-(aR)-{6-[(ftalazin-1-il) amino]espiro[3.3]heptan-2-il}-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-[6-(2,3-dihidro-1H-indol-1-carbonil)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-[6-(2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carbonil)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

N-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-carboxamida,

N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

4-{6-[2-(2,3-dihidro-1H-indol-1-il)-2-oxoetil]espiro[3.3]heptan-2-il}-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

2-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-il]-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida,

2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida,

2-[(3S)-3-cianopirrolidin-1-il]-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida,

2-[(3R)-3-cianopirrolidin-1-il]-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida,

2-[(3,3-difluorociclobutil)amino]-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida,

2-[(3S)-3-fluoropirrolidin-1-il]-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida,

5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2-[(2S)-2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida,

5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2-[(2R)-2-(trifluorometil)pirrolidin-1-il]-1,3-tiazol-4-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-5-metoksi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-metoksi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

6-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

5-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

5-fluoro-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirrol-2,3-b]piridin-3-carboxamida,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[2-(morfolin-4-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

2-(morfolin-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-tiazol-5-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2-(pirrolidin-1-il)-1,3-tiazol-5-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2-benzoxazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-3-carboxamida,

5-[2-(morfolin-4-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

5-(2-hidroxi-3-metoxipropoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(morfolin-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

5-(2-hidroxi-2-etoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,1-benzoxazol-3-carboxamida,

6-(difluorometoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2,2-difluoroetoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[2-(1H-pirazol-1-il)etoxi]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[2-(pirrolidin-1-il)etoxi]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

5-(morfolin-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(4-metilpiperazin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[(3S)-3-fluoropirrolidin-1-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3-fluoroazetidin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3,3-difluoroazetidin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzo[d]imidazo[2,1-b]tiazol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[2,1-b][1,3]tiazol-6-carboxamida,

2-etil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[2,1-b][1,3,4]tiadiazole-6-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-b]piridazin-3-carboxamida,

7-ciclopropil-6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-(trifluorometil)propoxi]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(benciloxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

1-(2,2-difluoroetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-5-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-pirazol-5-carboxamida,

1-[(4-metoxifenil)metil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida,

1-(ciclopropilmetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-5-carboxamida,

1-(oxan-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-5-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(oxolan-3-iloxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

terc-butil N-[2-(4-{[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]carbamoil}-1H-pirazol-1-il)etil]carbamate,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropoxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

1-(3-metoxifenil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida,

1-bencil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-3-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3,7-dicarboxamida,

7-ciano-6-hidroxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-7-(metoximetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-fenil-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamida,

1-(4-metoxifenil)-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamida,

1-(3-metoxifenil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamida,

1-(2-metoxifenil)-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamida,

5-(4-fluorofenil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2,4-oxadiazole-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropoxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropoxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(oxolan-3-iloxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(oxolan-3-iloxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

3-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,

6-(benciloxi)-7-ciclopropil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(benciloxi)-7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(benciloxi)-7-ciano-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

7-ciclopropil-6-hidroxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

1-(2-metoxifenil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamida,

6-(benciloxi)-7-[(dimetilamino)metil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[(1,3-difluoropropan-2-il)oxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[(1,1-dioxo-1λ⁶-tian-4-il)oxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(3,3,3-trifluoropropoxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[(4,4-difluorociclohexil)oxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(oxan-4-iloxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

metil 3-[(3-{[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]carbamoil}pirazolo[1,5-a]piridin-6-il)oxi]azetidina-1-carboxilato,

6-hidroxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3,3-difluorociclobutoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etoxi]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,
 6-[(5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,
 6-(benciloxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-(trifluorometil)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,
 6-ciclopropil-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,
 1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-fenil-1H-indazol-3-carboxamida,
 6-(4-chlorofenil)-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,
 1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,
 1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[(E)-2-feniletetil]-1H-indazol-3-carboxamida,

6-[(E)-2-ciclopropiletetil]-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(6-metoxipiridin-2-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

6-[(Z)-2-ciclopropiletetil]-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

6-bromo-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(4-metoxifenil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

6-(dimetil-1,2-oxazol-4-il)-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

6-(3-chlorofenil)-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(2-metoxifenil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(3-metoxifenil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

6-(2,6-difluorofenil)-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

6-(2-cianofenil)-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(1,2-oxazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

N-[6-fluoro-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-indazol-3-carboxamida,

6-fluoro-N-[6-fluoro-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-indazol-3-carboxamida,

N-[6-fluoro-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(2-oxopirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-ciclopropil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-ciano-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-oxo-1,2-dihidropiridin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-{1-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-

hidroxipropil]-1H-pirazol-4-il}pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(1,3-tiazol-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(1H-pirazol-4-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(dimetil-1H-1,2,3-triazol-5-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1H-imidazol-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(1H-pirazol-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-metoxietoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(4-oxo-1,4-dihidropiridin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-hidroxietoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[2-(3-fluoroazetidin-1-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[2-(dimetilamino)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[2-(4-hidroxi-3,3-dimetilpiperidin-1-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[2-(azetidin-1-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[2-(2,2-dimetilmorfolin-4-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-{2-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-il]etoxi}-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-{2-[(3S)-3-fluoropirrolidin-1-il]etoxi}-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[3-(morfolin-4-il)propil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[3-(pirrolidin-1-il)propil]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[3-(dimetilamino)propil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[3-(ciclopropilamino)propil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3-hidroxipropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)propil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)propil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3-hidroxi-3-metilbutil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[4,4,4-trifluoro-3-hidroxi-3-(trifluorometil)butil]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(morfolin-4-ilmetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(piperidin-1-ilmetil)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[(dimetilamino)metil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-bencil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[3-(morfolin-4-il)-3-oxopropil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(3,3,3-trifluoropropil)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-cianoetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-{[2-(morfolin-4-il)etoxi]metil}-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(metoximetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-metoxipirimidin-5-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[(oxan-4-ilmetoxi)metil]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[(prop-2-en-1-iloxi)metil]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(hidroximetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-acetil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-hidroxipropan-2-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[1-(²H₃)metil-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(trimetil-1H-pirazol-4-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[1-(oxan-4-il)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[1-(propan-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-terc-butil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[1-(oxolan-3-il)-1H-pirazol-4-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

1-(4-bromofenil)-3-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]urea,

1-[4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)fenil]-3-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]urea,

1-{4-[1-(²H₃)metil-1H-pirazol-4-il]fenil}-3-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]urea,

1-[4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)fenil]-3-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]urea,

1-{4-[1-(oxan-4-il)-1H-pirazol-4-il]fenil}-3-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]urea,

1-{4-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]fenil}-3-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]urea,

3-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-[4-(trimetil-1H-pirazol-4-il)fenil]urea,

5-bromo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

5-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5-(trimetil-1H-pirazol-4-il)-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

5-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-
[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-
il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

5-[1-(²H₃)metil-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-
3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-
1H-indol-1-carboxamida,

5-[1-(oxan-4-il)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-
3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-
1H-indol-1-carboxamida,

5-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-
(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-
dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

5-(1-terc-butil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-
3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-
1H-indol-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-
il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5-[1-(oxolan-3-il)-1H-pirazol-4-
il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-
il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5-[1-(propan-2-il)-3-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-
carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-
il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5-(3,3,3-trifluoropropil)-2,3-
dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5-(trimetil-1H-pirazol-4-il)-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

5-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

5-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5-[1-(propan-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

5-[1-(oxan-4-il)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

5-(1-*terc*-butil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

5-[1-(²H₃)metil-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

3,3-dimetil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H,2H,3H-pirrolo[2,3-b]piridin-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5H,6H,7H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-carboxamida,

5-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(trifluorometil)-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

5-(dimetilsulfamoil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

3-(morfolin-4-ilmetil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-1-carboxamida,

2-(4-metilfenil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5H,6H,7H-pirrolo[3,4-d]pirimidin-6-carboxamida,

5-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H,2H,3H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2-dihidroespiro[indol-3,4'-piperidine]-1-carboxamida,

N,1-dimetil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

N-etil-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-3-carboxamida,

2-metil-1-[(3-{[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]carbamoil}pirazolo[1,5-a]piridin-6-il)oxi]propan-2-il 2-aminoacetate,

2-metil-1-[(3-{[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]carbamoil}pirazolo[1,5-a]piridin-6-il)oxi]propan-2-il (2S)-2-amino-3-metilbutanoate,

2-metil-1-[(3-{[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]carbamoil}pirazolo[1,5-a]piridin-6-il)oxi]propan-2-il (2S)-2-aminopropanoate,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-[6-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

terc-butil 3-{[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]carbamoil}-4H,5H,6H,7H-tieno[2,3-c]piridin-6-carboxilate,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4H,5H,6H,7H-tieno[2,3-c]piridin-3-carboxamida,

6-acetil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4H,5H,6H,7H-tieno[2,3-c]piridin-3-carboxamida,

metil 3-{[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]carbamoil}-4H,5H,6H,7H-tieno[2,3-c]piridin-6-carboxilate,

6-metansulfonil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4H,5H,6H,7H-tieno[2,3-c]piridin-3-carboxamida,

6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,1-benzoxazol-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-(6-{4-oxo-3H,4H-pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-1-il}espiro[3.3]heptan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-(6-{4-oxo-3H,4H-pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-1-il}espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

1-metil-N-(6-{4-oxo-3H,4H-pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-1-il}espiro[3.3]heptan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-(6-{8-metil-4-oxo-3H,4H-pirrolo[1,2-d][1,2,4]triazin-1-il}espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-carboxamida,

6-[(3,5-dimetilfenil)amino]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-b]piridazin-3-carboxamida,

6-bromo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,1-benzoxazol-3-carboxamida,

1-etil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-5-carboxamida,

1-(difluorometil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirazol-5-carboxamida,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,1-benzoxazol-3-carboxamida,

1-(3-clorofenil)-7-oxo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H,4H,5H,6H,7H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-carboxamida,

1-(4-metoxifenil)-7-oxo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H,4H,5H,6H,7H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-carboxamida,

5-chloro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2-benzoxazol-3-carboxamida,

6-acetamido-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2-benzoxazol-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,5-a]piridin-1-carboxamida,

5-metoxi-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

7-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4H,5H,6H,7H-[1,3]tiazolo[5,4-c]piridin-2-carboxamida,

4-chloro-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

2-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-3-carboxamida,

7-chloro-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

4-chloro-7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]tieno[2,3-b]pirazin-6-carboxamida,

4-bromo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-chloro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-1,3-benzodiazole-2-carboxamida,

5-chloro-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(propan-2-il)-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxamida,

2-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-3H-imidazo[4,5-b]piridin-6-carboxamida,

4-formamido-3-hidroxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-2-carboxamida,

6-chloro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-benzotiofen-2-carboxamida,

6-metoxi-1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

2-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,3-benzoxazol-6-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-6-carboxamida,

1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

5-(benciloxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

6-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-inden-1-carboxamida,

7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-isoindol-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]isoquinoline-3-carboxamida,

7-hidroxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

7-chloro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

6-fluoro-7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]quinoline-2-carboxamida,

4-bromo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-(trifluorometil)-1H-indol-2-carboxamida,
 7-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,
 4,7-dimetoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,
 5-fluoro-7-metansulfonil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,
 N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-3-(1H-pirazol-1-il)benzamida,
 N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(1H-pirazol-4-il)benzamida,
 3-[2-(morfolin-4-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,
 N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-3-(1H-pirazol-4-il)benzamida,
 3-(4-metil-1,3-tiazol-2-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,
 6-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-3-carboxamida,
 N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(trifluorometil)piridin-3-carboxamida,

2-hidroxi-6-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-[2-(pirrolidin-1-il)etil]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)benzamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-carboxamida,

5-chloro-6-hidroxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)benzamida,

3-metoxi-4-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

3-metoxi-4-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

5-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-2-carboxamida,

3-(1H-imidazol-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

3-ciano-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(propan-2-iloxi)benzamida,

3-(difluorometoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

4-etoxi-5-oxo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-carboxamida,

6-(dimetilamino)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(1H-pirazol-3-il)benzamida,

4-(1,3-oxazol-5-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

4-(1H-imidazol-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-3-(1H-pirazol-3-il)benzamida,

8-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,

6-bromo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,

1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-3-carboxamida,

5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2-(piridin-4-il)-1,3-tiazol-4-carboxamida,

1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-6-carboxamida,

1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-6-carboxamida,

1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-5-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5-(pirrolidin-1-il)piridin-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-5-(trifluorometil)piridin-2-carboxamida,

5-ciano-6-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-2-carboxamida,

7-metoxi-3-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

1-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indazol-5-carboxamida,

7-bromo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,

5-bromo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,

7-(4-metilpiperazin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-ciano-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

8-ciano-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-8-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

8-chloro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(benciloxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

8-chloro-7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-3-(propan-2-il)-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]piridin-1-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(3S)-3-fluoropirrolidin-1-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(3R)-3-hidroxipirrolidin-1-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(2-hidroxietil)(metil)amino]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(2-metoxietil)(metil)amino]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[2-(morfolin-4-il)etoxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(2-hidroxi-2-metilpropil) (metil) amino]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il) espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il) espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il) espiro[3.3]heptan-2-il]-7-[2-(pirrolidin-1-il)etoxi]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-7-oxo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il) espiro[3.3]heptan-2-il]-1H,7H-imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il) espiro[3.3]heptan-2-il]-7-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

8-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il) espiro[3.3]heptan-2-il]-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

6-fluoro-8-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il) espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(difluorometoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il) espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

6-fluoro-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

6-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(2-hidroxi-2-metilpropil)amino]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

6-fluoro-7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

6,8-difluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

8-(benciloxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(metilsulfanil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

4-oxo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4H,5H,6H,7H-pirazolo[1,5-a]pirazin-2-carboxamida,

3-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(1H-pirazol-4-il)benzamida,

3-ciano-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(1H-pirazol-4-il)benzamida,

3-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(1H-pirazol-4-il)benzamida,

2-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-(1H-pirazol-4-il)benzamida,

7-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1H-indol-2-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-6H-isochromeno[4,3-d]pirimidin-8-carboxamida,

3-metoxi-4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

3-fluoro-4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-3-carboxamida,

7-acetil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

3-fluoro-4-[1-(²H₃)metil-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

4-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-3-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

7-(2-hidroxiopropan-2-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(1-hidroxietil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(1,1-dioxo-1λ⁶-tian-4-il)oxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-(3,3,3-trifluoropropoxi)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(1,3-difluoropropan-2-il)oxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-(piridin-2-iloxi)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-3-(propan-2-il)imidazo[1,5-a]piridin-1-carboxamida,

7-(2,2-difluoroetoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-(propan-2-iloxi)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

4-(morfolin-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

7-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[1-(²H₃)metil-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[1-(oxan-4-il)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-[1-(propan-2-il)-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

4-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-3-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

3-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-4-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]benzamida,

3-fluoro-4-[1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

4-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-3-fluoro-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

3-fluoro-4-[1-(oxan-4-il)-1H-pirazol-4-il]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-2-carboxamida,

4-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]benzamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-(piridin-3-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-7-(piridin-3-il)imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,

7-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,

7-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

4-[6-(1-oxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-2-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-{6-[(4S)-4-benc1-2-oxoimidazolidin-1-il]espiro[3.3]heptan-2-il}-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-{6-[(4R)-4-benc1-2-oxoimidazolidin-1-il]espiro[3.3]heptan-2-il}-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-{6-[(2-nitrofenil)amino]espiro[3.3]heptan-2-il}-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-[6-(2-oxo-2,3-dihidro-1H-1,3-benzodiazol-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-1,2-dihidroftalazin-1-ona,

4-ciclopropil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

3-fluoro-5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]piridin-2-carboxamida,

6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il 2,3-dihidro-1H-isoindol-2-carboxilate,

7-metansulfonil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]pirazolo[1,5-a]pirazin-3-carboxamida,

5-bromo-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]-2,3-dihidro-1H-indol-2-carboxamida,

Ácido 2-metil-2-[(3-{[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]carbamoil}pirazolo[1,5-a]piridin-6-il)oxi]propanoico,

7-(morfolin-4-il)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-[(4,4-difluorociclohexil)oxi]-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il]imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

4-Metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-2-(piperidin-1-il)tiazol-5-carboxamida,

2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-5-metil-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)tiazol-4-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida,

6-metoxi-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-1H-indol-3-carboxamida,

6-(2,2-difluoroetoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-(1H-pirazol-1-il)etoxi)-N-[(aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(4-metilpiperazin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-((R)-3-fluoropirrolidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-((S)-3-fluoropirrolidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3-fluoroazetidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3,3-difluoroazetidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

7-ciclopropil-6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(benciloxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-((tetrahidrofuran-3-il)oxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropoxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(benciloxi)-7-metil-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(benciloxi)-7-ciano-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-((1,3-difluoropropan-2-il)oxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-((1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)oxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(3,3,3-trifluoropropoxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-((4,4-difluorociclohexil)oxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3,3-difluorociclobutoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etoxi)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-((5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-6-(2-metoxifenil)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida,

6-(2-cianofenil)-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-1H-indazol-3-carboxamida,

6-ciclopropil-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

6-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

N-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(tiazol-2-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

N-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(1*H*-pirazol-4-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

N-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(1*H*-pirazol-1-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

6-(2-metoxietoxi)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

6-(2-(4-hidroxi-3,3-dimetilpiperidin-1-il)etoxi)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

6-(2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)etoxi)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

6-(2-(2,2-dimetilmorfolino)etoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-((R)-3-fluoropirrolidin-1-il)etoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(2-((S)-3-fluoropirrolidin-1-il)etoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)propil)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(3-hidroxi-3-metilbutil)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-bencil-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(3,3,3-trifluoropropil)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-((aliloxi)metil)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-(²H₃)metil-1H-pirazol-4-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-isopropil-1H-pirazol-4-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1H-pirazol-4-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,

6-(1-metil-3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-
((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-
il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

6-(1-isopropil-3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il)-
N-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-
2-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

6-(1-(*terc*-butil)-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-
oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-
il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

N-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-
il)espiro[3.3]heptan-2-il)-6-(1-(tetrahidrofuran-3-il)-1*H*-
pirazol-4-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-3-carboxamida,

5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-
dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)indoline-1-
carboxamida,

5-(1-ciclopropil-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-
3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)indoline-1-
carboxamida,

5-(1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-
3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)indoline-1-
carboxamida,

2-metil-1-((3-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-
1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)carbamoil)pirazolo[1,5-*a*]piridin-
6-il)oxi)propan-2-il 2-aminoacetate,

(*S*)-2-metil-1-((3-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-
dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-

il) carbamoil)pirazolo[1,5-a]piridin-6-il)oxi)propan-2-il 2-
amino-3-metilbutanoate,

(S)-2-metil-1-((3-((aR)-6-(4-oxo-3,4-
dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-
il)carbamoil)pirazolo[1,5-a]piridin-6-il)oxi)propan-2-il 2-
aminopropanoate,

6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-
dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-
il)benzo[c]isoxazole-3-carboxamida,

6-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-
dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-
il)benzo[c]isoxazole-3-carboxamida,

6-fluoro-7-metil-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-
dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-1H-indol-2-
carboxamida,

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-
il)espiro[3.3]heptan-2-il)-7-(trifluorometil)-1H-indol-2-
carboxamida,

7-(4-metilpiperazin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-
dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-
a]piridin-3-carboxamida),

N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-
il)espiro[3.3]heptan-2-il)-7-fenilimidazo[1,2-a]piridin-3-
carboxamida,

7-(benciloxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-metoxi-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-((R)-3-fluoropirrolidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-((S)-3-fluoropirrolidin-1-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-((2-metoxietil)(metil)amino)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(2-morfolinoetoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

6-fluoro-8-metil-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(difluorometoxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

8-(benciloxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

7-(metiltio)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

3-metoxi-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-4-(1H-pirazol-4-il)benzamida,

3-ciano-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-4-(1H-pirazol-4-il)benzamida,

3-metil-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-4-(1H-pirazol-4-il)benzamida,

7-((1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)oxi)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,

N-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-7-(piridin-2-iloxi)imidazo[1,2-*a*]piridin-3-carboxamida,

7-(2,2-difluoroetoxi)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-3-carboxamida,

7-(1-etil-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-3-carboxamida,

7-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-3-carboxamida,

7-(1-isopropil-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-3-carboxamida,

7-(1-(metil-*d*3)-1*H*-pirazol-4-il)-*N*-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-3-carboxamida,

N-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-7-(1-(tetrahidro-2*H*-piran-4-il)-1*H*-pirazol-4-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-3-carboxamida,

N-((*aR*)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-7-(piridin-3-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-3-carboxamida,

$N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)-7-(piridin-3-il)imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,$
 $7-(2-metiltiazol-5-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida,$
 $7-(2-metiltiazol-5-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida,$
 $4-((aR)-6-(1-oxoisoindolin-2-il)espiro[3.3]heptan-2-il)ftalazin-1(2H)-ona,$
 $4-((aR)-6-((S)-4-benc1-2-oxoimidazolidin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)ftalazin-1(2H)-ona,$
 $4-((aR)-6-((R)-4-benc1-2-oxoimidazolidin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)ftalazin-1(2H)-ona,$
 $4-((aR)-6-((2-nitrofenil)amino)espiro[3.3]heptan-2-il)ftalazin-1(2H)-ona,$
 $4-((aR)-6-(2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzo[d]imidazol-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)ftalazin-1(2H)-ona,$
 $4-ciclopropil-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)pirazolo[1,5-a]piridin-3-carboxamida,$
 $3-fluoro-5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)picolinamide,$

6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il isoindoline-2-carboxilate,

7-(metilsulfonil)-N-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)imidazo[1,2-a]piridin-3-carboxamida, y

Ácido 2-metil-2-((3-((aR)-6-(4-oxo-3,4-dihidroftalazin-1-il)espiro[3.3]heptan-2-il)carbamoil)pirazolo[1,5-a]piridin-6-il)oxi)propanoico.

15. Una composición farmacéutica para la profilaxis y/o el tratamiento de trastornos asociados con la actividad anómala de la cinasa Rho caracterizada porque comprende uno o más compuestos de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-14 y un portador o diluyente farmacéuticamente aceptables.