



## CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Forma cristalina A del Compuesto 1, o un tautómero del mismo:




que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 10.55, 13.61, y 19.84° 2 $\theta$ .

2. Forma cristalina B del Compuesto 1, o un tautómero del mismo:



que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 9.80, 17.29, y 21.74° 2 $\theta$ .


3. Forma cristalina C del Compuesto 1, o un tautómero del mismo:



1

que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 9.83, 17.26, y 21.86 ° 2 $\theta$ .


4. Forma cristalina D del Compuesto 1, o un tautómero del mismo:



1

que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 10.37, 13.41, y 19.52° 2 $\theta$ .


5. Forma cristalina E del Compuesto 1, o un tautómero del mismo:



1

que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 9.92, 17.29 y 21.81 ° 2 $\theta$ .


6. Forma cristalina F del Compuesto 1, o un tautómero del mismo:



1

que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 18.53, 20.85 y 21.10° 2 $\theta$ .


7. Forma cristalina G del Compuesto 1, o un tautómero del mismo:



1

que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 9.51, 17.90 y 21.28° 2 $\theta$ .


8. Forma cristalina H del el Compuesto 1, o un tautómero del mismo:



1

que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 9.74, 17.22, y 21.76° 2 $\theta$ .

9. Forma cristalina I del Compuesto 1, o un tautómero del mismo:



1

que tiene un patrón de difracción en polvo por rayos X que comprende picos en aproximadamente 7.94, 16.00, y 18.27° 2 $\theta$ .