


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Compuesto de Fórmula (II)



en la que

X se selecciona del grupo que consiste en un enlace sencillo y un grupo -NH-;

cuando X es un enlace sencillo, R_{1a} se selecciona del grupo que consiste en d1) fenilo no sustituido o sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en NR₅R₆, CN, alquilo C₁₋₃ lineal o ramificado, alcoxilo C₁₋₃ lineal o ramificado y átomos de halógeno; e1) naftilo; f1) heterociclilo C₅₋₁₀ en el que el resto heterociclilo comprende 1 o 2 heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en nitrógeno y oxígeno y está no sustituido o sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en OH, CF₃, alquilo C₁₋₃ lineal o ramificado y átomos de halógeno; y h1) (cicloalquil C₅₋₆)-alquilo C₀₋₂;

cuando X es un grupo -NH-, R_{1a} es g2) alquilo C₁₋₄ lineal o ramificado;

R_{2a} se selecciona del grupo que consiste en i1) alquilo C₂₋₅, j1) (alcoxi C₁₋₃)-alquilo C₁₋₃ y k1) cicloalquilo C₃₋₅;

R_{3a} es m1) bencilo;


R_{4a} se selecciona del grupo que consiste en n1) alquilo C₂₋₅, o1) cicloalquilo C₃₋₅ y p1) alcoxilo C₁₋₃; y

R₅ y R₆ se seleccionan independientemente de grupos alquilo C₁₋₃ lineal o ramificado;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Compuesto de Fórmula (II) según la Reivindicación 1, en el que o bien (i) X es NH y R_{1a} se selecciona del grupo que consiste en a1) alquilo C₁₋₄ o bien ii) X es un enlace sencillo y el grupo R_{1a} se selecciona del grupo que consiste en d1) fenilo no sustituido o sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en CN, alquilo C₁₋₃ lineal o ramificado; y átomos de halógeno y f1) heterociclilo C₆ en el que el resto heterociclilo es heteroaromático y comprende 1 o 2 átomos de nitrógeno y está no sustituido o sustituido con de 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en OH, CF₃, alquilo C₁₋₃ lineal o ramificado y halógeno.

3. Compuesto de Fórmula (II) según la Reivindicación 2, en el que X es un enlace sencillo.
4. Compuesto de Fórmula (II) según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en el que el grupo R_{2a} se selecciona del grupo que consiste en alquilo C₂₋₅ lineal o ramificado y cicloalquilo C₃₋₅.
5. Compuesto de Fórmula (II) según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en el que el grupo R_{2a} se selecciona del grupo que consiste en isopropilo, propilo y ciclopropilo.
6. Compuesto de Fórmula (II) según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, en el que el grupo R_{2a} es isopropilo.
7. Compuesto de Fórmula (II) según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, en el que el grupo R_{4a} se selecciona del grupo que consiste en alquilo C₂₋₅ lineal o ramificado y cicloalquilo C₃₋₅.
8. Compuesto de Fórmula (II) según la Reivindicación 7, en el que el grupo R_{4a} se selecciona del grupo que consiste en etilo, terc-butilo y ciclopropilo.
9. Compuesto según la Reivindicación 1, que tiene la siguiente Fórmula:
N-[(1S)-1-(1-bencil-2-metoxycarbamoil-2-oxo-etilcarbamoil)-3-metil-butil]-3-metoxi-benzamida.
10. Procedimiento para la preparación de un compuesto de Fórmula (II) según una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, que comprende la reacción de un compuesto de Fórmula (IV) con peryodinano de Dess-Martin



en la que X, R_{1a}, R_{2a}, R_{3a} y R_{4a} son según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a

8.
