

REIVINDICACIONES

1. Una formulación para la aplicación tópica en infecciones de la piel causadas por *Leishmania* spp., CARACTERIZADA POR incluir Glicirricina entre 5 y 10% en peso como ingrediente activo y excipientes entre 90 y 95% en peso

2. La formulación para la aplicación tópica en infecciones de la piel causadas por *Leishmania* spp. de la reivindicación 1, CARACTERIZADA POR que la formulación comprende:

- a) 5.00% Glicirricina (por peso);
- b) 71.32% Agua (por peso);
- c) 0.10% de Metilparabeno de sodio (por peso);
- d) 0.02% Propilparabeno de sodio (por peso);
- e) 0.96% Fosfato de sodio monobasico (por peso);
- f) 5.00% Alcohol cetilico (por peso);
- g) 4.00% Aceite mineral ligero (por peso);
- h) 2.90% Emulium delta® (Alcohol cetilico y Gliceril estearato y PEG-75 estearato y Ceteth-20 y Steareth-20 (por peso);
- i) 10.00% petrolato blanco (por peso); y
- j) 0.70% Glicerol monostearato (por peso).

3. La formulación para la aplicación tópica en infecciones de la piel causadas por *Leishmania* spp., de la reivindicación 1 CARACTERIZADA POR ser una emulsión de aceite en agua (O/W)

4. La formulación para la aplicación tópica en infecciones de la piel causadas por *Leishmania* spp., de la reivindicación 1 CARACTERIZADA POR que la infección puede ser causada por varias especies de *Leishmania* tales como *L. braziliensis*, *L. panamensis*, *L. guyanensis*, *L. amazonensis* y *L. mexicana*.