

REIVINDICACIONES

1. Una forma cristalina I de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonyl)-4-methoxy-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmetanamina clorhidrato que tiene picos a ángulos de difracción ($2\theta \pm 0,2^\circ$) de $5,8^\circ$, $9,7^\circ$, $10,0^\circ$, $12,8^\circ$, $13,2^\circ$, $17,4^\circ$ y $18,5^\circ$ en un patrón de difracción de polvo de rayos X.

2. La forma cristalina I de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonyl)-4-methoxy-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmetanamina clorhidrato de la Reivindicación 1,

donde la forma cristalina I tiene una temperatura de iniciación endotérmica de $215,02 \pm 3^\circ\text{C}$, y exhibe un pico endotérmico máximo a una temperatura endotérmica de $217,11 \pm 3^\circ\text{C}$ en un análisis de calorimetría de barrido diferencial.

3. Una forma cristalina II de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonyl)-4-methoxy-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmetanamina clorhidrato que tiene picos a ángulos de difracción ($2\theta \pm 0,2^\circ$) de $9,2^\circ$, $10,0^\circ$, $12,9^\circ$ y $20,2^\circ$ en un patrón de difracción de polvo de rayos X.

4. La forma cristalina II de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonyl)-4-methoxy-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmetanamina clorhidrato de la Reivindicación 3,

donde la forma cristalina II tiene una temperatura de iniciación endotérmica de $213,14 \pm 3^\circ\text{C}$ y exhibe un pico endotérmico máximo a una temperatura endotérmica de $215,7 \pm 3^\circ\text{C}$ en un análisis de calorimetría de barrido diferencial.

5. Una forma cristalina de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonyl)-4-methoxy-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmetanamina succinato que tiene picos a ángulos de difracción ($2\theta \pm 0,2^\circ$) de $8,0^\circ$, $11,2^\circ$, $12,0^\circ$, $14,9^\circ$, $22,1^\circ$ y $24,1^\circ$ en un patrón de difracción de polvo de rayos X.

6. La forma cristalina de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-metoxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina succinato de la Reivindicación 5,

donde la forma cristalina tiene una temperatura de iniciación endotérmica de $132,3 \pm 3^\circ\text{C}$ y exhibe un pico endotérmico máximo a una temperatura endotérmica de $133,9 \pm 3^\circ\text{C}$ en un análisis de calorimetría de barrido diferencial.

7. Una forma cristalina de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-metoxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina tartrato que tiene picos a ángulos de difracción ($2\theta \pm 0,2^\circ$) de $11,7^\circ$, $21,5^\circ$ y $23,5^\circ$ en un patrón de difracción de polvo de rayos X.

8. La forma cristalina de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-metoxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina tartrato de la Reivindicación 7,

donde la forma cristalina tiene una temperatura de iniciación endotérmica de $146,34 \pm 3^\circ\text{C}$ y exhibe un pico endotérmico máximo a una temperatura endotérmica de $148,27 \pm 3^\circ\text{C}$ en un análisis de calorimetría de barrido diferencial.

9. Una forma cristalina I de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-metoxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina fumarato que tiene picos a ángulos de difracción ($2\theta \pm 0,2^\circ$) de $7,9^\circ$, $11,9^\circ$ y $24,0^\circ$ en un patrón de difracción de polvo de rayos X.

10. La forma cristalina I de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-metoxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina fumarato de la Reivindicación 9,

donde la forma cristalina I tiene una temperatura de iniciación endotérmica de $164,97 \pm 3^\circ\text{C}$ y exhibe un pico endotérmico máximo a una temperatura endotérmica de $167,46 \pm 3^\circ\text{C}$ en un análisis de calorimetría de barrido diferencial.

11. Una forma cristalina II de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-metoxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina fumarato que tiene picos a ángulos de difracción ($2\theta \pm 0,2^\circ$) de $8,4^\circ$, $10,5^\circ$ y $19,02^\circ$ en un patrón de difracción de polvo de rayos X.

12. La forma cristalina II de 1-(5-(2,4-difluorfenil)-1-((3-fluorfenil)sulfonil)-4-metoxi-1H-pirrol-3-il)-N-metilmetanamina fumarato de la reivindicación 11,

donde la forma cristalina II tiene una temperatura de iniciación endotérmica de $179,47 \pm 3^\circ\text{C}$ y exhibe un pico endotérmico máximo a una temperatura endotérmica de $189,05 \pm 3^\circ\text{C}$ en un análisis de calorimetría de barrido diferencial.