


**REIVINDICACIONES:**

1. Un compuesto de fórmula (I):



(I)

donde

R<sup>1</sup> se selecciona entre:

(a) -S(O)<sub>2</sub>R<sup>4</sup>, donde R<sup>4</sup> se selecciona entre:

C<sub>1-4</sub>alquilo, donde C<sub>1-4</sub>alquilo se sustituye opcionalmente con -CN, -OC<sub>1-3</sub>alquilo, o C<sub>3-6</sub>cicloalquilo,

heterociclilo que contiene entre 4 y 6 átomos del anillo que incluye un átomo de nitrógeno, donde cualquier heterociclilo se sustituye opcionalmente con -CN, C<sub>3-6</sub>cicloalquilo,

piridinilo, donde piridinilo se sustituye opcionalmente con fluoro, y

fenilo;

(b) C<sub>1-4</sub>alquilo, donde C<sub>1-4</sub>alquilo se sustituye opcionalmente con -CN, , CN, ,

o

piridinilo, donde piridinilo se sustituye opcionalmente con -CN; y

(c) -C(O)R<sup>5</sup>, donde R<sup>5</sup> se selecciona entre:

C<sub>1-4</sub>alquilo, donde C<sub>1-4</sub>alquilo se sustituye opcionalmente con C<sub>3-6</sub>cicloalquilo,  
o con uno o dos fluoro,

-OC<sub>1-4</sub>alquilo,

C<sub>3-6</sub>cicloalquilo, y

morfolinilo;

R<sup>2</sup> es hidrógeno o metilo;

R<sup>3</sup> es C<sub>1-3</sub>alquilo; y

*n* es 1 o 2;

o una sal farmacéuticamente aceptable o estereoisómero del mismo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, donde R<sup>3</sup> es metilo.

3. El compuesto de la reivindicación 1, donde R<sup>2</sup> es metilo.

4. El compuesto de la reivindicación 1, donde *n* es 2.

5. El compuesto de la reivindicación 1, donde R<sup>1</sup> se selecciona entre:

(a) S(O)<sub>2</sub>R<sup>4</sup>, donde R<sup>4</sup> se selecciona entre:

C<sub>1-2</sub>alquilo, donde C<sub>1-2</sub>alquilo se sustituye opcionalmente con -CN, -OCH<sub>3</sub>,  
o ciclopropilo,

azetidinilo o pirrolidinilo, donde azetidinilo se sustituye opcionalmente  
con -CN,

ciclopropilo,

piridinilo, donde piridinilo se sustituye opcionalmente con fluoro, y

fenilo;

(b) C<sub>1-4</sub>alquilo, donde C<sub>1-4</sub>alquilo se sustituye opcionalmente con -CN, ,  
o

piridinilo, donde piridinilo se sustituye opcionalmente con -CN; y

(c) C(O)R<sup>5</sup>, donde R<sup>5</sup> se selecciona entre:

C<sub>1-2</sub>alquilo, donde C<sub>1-2</sub>alquilo se sustituye opcionalmente con ciclopropilo, o con uno o dos fluoro,

-OC<sub>1-4</sub>alquilo,

C<sub>3-6</sub>cicloalquilo, y

morfolinilo.

6. El compuesto de la reivindicación 1, donde el compuesto se selecciona entre:

1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo,

1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo,

(3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(metilsulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,

(3-((6-metoxi-2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-((2-metoxietil)sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,

3-((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-8-azabicyclo[3,2,1]octan-8-il)propanonitrilo,

5-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)metil)picolinonitrilo,

5-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)metil)nicotinonitrilo,

(1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-carboxilato de isobutilo,


2,2-difluoro-1-((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)etan-1-ona,

(3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(azetidin-1-ilsulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)amino)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-9-il)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo,  
 (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-((5-fluoropiridin-3-il)sulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((6-metoxi-2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(fenilsulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(etilsulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-((ciclopropilmetil)sulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((6-metoxi-2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(piridin-3-ilsulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 3-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-9-il)-sulfonil)propanonitrilo,  
 (3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(pirrolidin-1-ilsulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(ciclopropilsulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(piridin-3-ilsulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(fenilsulfonil)-9-azabicciclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,

(3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(azetidin-1-il) sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-((ciclopropilmetil) sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-((5-fluoropiridin-3-il) sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 4-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)metil)picolinonitrilo,  
 (3-((6-metoxi-2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(piridin-3-il)metil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 3-((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)propanonitrilo,  
 1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo,  
 (3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(piridin-4-il)metil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol,  
 4-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)metil)picolinonitrilo,  
 2,2-difluoro-1-((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)etan-1-ona,  
 (1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-carboxilato de isobutilo  
 (1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-carboxilato de metilo,

((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxi-pirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)(morfolino)metanona, 2-ciclopropil-1-((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)etan-1-ona, ciclopentil((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)metanona, y ciclobutil((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)metanona, y sales aceptables farmacéuticamente del mismo.

7. El compuesto de la reivindicación 1, donde el compuesto es un compuesto de fórmula (II):



(II)


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. El compuesto de la reivindicación 7, donde R<sup>4</sup> es metilo, etilo, azetidino, pirrolidinilo, ciclopropilo, piridinilo, o fenilo, donde etilo se sustituye opcionalmente con metoxi, azetidino se sustituye opcionalmente con -CN, y piridinilo se sustituye opcionalmente con fluoro.

9. El compuesto de la reivindicación 7, donde el compuesto se selecciona entre:

1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo, (3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(metilsulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, (3-((6-metoxi-2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-((2-metoxietil)sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, 3-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxi-pirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)-sulfonil)propanonitrilo, (3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(pirrolidin-1-il)sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(ciclopropilsulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, (3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(piridin-3-il)sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, (3-((6-metoxi-2-(metil((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(fenilsulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)amino)pirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-(azetidin-1-il)sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-((ciclopropilmetil)sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, y (3-((2-(((1*R*,3*s*,5*S*)-9-((5-fluoropiridin-3-il)sulfonil)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-3-il)(metil)amino)-6-metoxipirimidin-4-il)amino)-1*H*-pirazol-5-il)metanol, y sales farmacéuticamente aceptable de los mismos.

10. 1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo de formula:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

11. 1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo.

12. Una forma cristalina de 1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo, donde la forma cristalina se caracteriza por una difracción de rayos X en polvo que comprende picos de difracción a valores  $2\theta$  de  $8,89 \pm 0,20$ ,  $12,99 \pm 0,20$ ,  $13,44 \pm 0,20$ , y  $20,16 \pm 0,20$ .

13. La forma cristalina de la reivindicación 12 donde el patrón de difracción de rayos X en polvo se caracteriza además por presentar dos o más picos de difracción adicionales a valores  $2\theta$  que se seleccionan entre  $10,64 \pm 0,20$ ,  $10,99 \pm 0,20$ ,  $15,02 \pm 0,20$ ,  $15,74 \pm 0,20$ ,  $16,47 \pm 0,20$ ,  $20,93 \pm 0,20$ ,  $22,22 \pm 0,20$ , y  $26,25 \pm 0,20$ .

14. La forma cristalina de la reivindicación 12, donde la forma cristalina se caracteriza por un patrón de difracción de rayos X en polvo en donde las

posiciones de los picos están sustancialmente de acuerdo con las posiciones de los picos del patrón que se muestra en la Figura 1.


15. La forma cristalina de la reivindicación 12 en donde la forma cristalina se caracteriza por un trazo de calorimetría de barrido diferencial registrado a una tasa de calentamiento de 10°C por minuto que muestra un máximo en el flujo de calor endotérmico a una temperatura entre aproximadamente 235 °C y aproximadamente 245 °C.

16. La forma cristalina de la reivindicación 15, en donde la forma cristalina se caracteriza por un trazo de calorimetría de barrido diferencial sustancialmente de acuerdo con que se muestra en la Figura 2.

17. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

18. La composición farmacéutica de la reivindicación 17 que además comprende uno o más agentes terapéuticos adicionales que son útiles para tratar la enfermedad inflamatoria gastrointestinal.


19. Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I):



(I)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ , y  $n$  son como se definen en la reivindicación 1, comprendiendo el proceso:

(a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula (III):



(III)


donde  $R^2$ ,  $R^3$ , y  $n$  son como se definen en la reivindicación 1, con

- (i)  $\text{Cl-S(O)}_2\text{R}^4$ , donde  $R^4$  es como se define en la reivindicación 1;
- (ii) un compuesto de fórmula  $\text{L-R}^A$  donde L es un grupo saliente y  $R^A$  es  $\text{C}_{1-4}$ alquilo, donde  $\text{C}_{1-4}$ alquilo se sustituye opcionalmente con  $-\text{CN}$ , , o piridinilo, donde piridinilo se sustituye opcionalmente con  $-\text{CN}$ ;
- (iii)  $\text{Cl-C(O)R}^5$ , donde  $R^5$  es como se define en la reivindicación 1; o
- (iv)  $\text{HO-C(O)R}^5$ , donde  $R^5$  es como se define as en la reivindicación 1; y

(b) opcionalmente formar una sal farmacéuticamente aceptable

para dar un compuesto de fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

20. Un compuesto de fórmula (III):



(III)

donde  $R^2$ ,  $R^3$ , y  $n$  son como se definen en la reivindicación 1.

21. El compuesto de la reivindicación 20, donde  $R^2$  y  $R^3$  son cada uno metilo.

22. Un método para preparar la forma cristalina de 1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)sulfonyl)azetidin-3-carbonitrilo como se define en la reivindicación 12, comprendiendo el método:

(a) disolver 1-(((1*R*,3*s*,5*S*)-3-((4-((5-(hidroximetil)-1*H*-pirazol-3-il)amino)-6-metoxipirimidin-2-il)(metil)amino)-9-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-il)sulfonyl)azetidin-3-carbonitrilo en un diluyente seleccionado entre *N*-metilpirrolidona y dimetilformamida para formar una mezcla de reacción;

(b) agregar acetona y agua a la mezcla de la reacción; y

(c) aislar la forma cristalina de la mezcla de la reacción.

23. Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 para usar en el tratamiento de una enfermedad inflamatoria gastrointestinal en un mamífero.

24. El compuesto de la reivindicación 23 donde la enfermedad inflamatoria gastrointestinal es colitis ulcerativa.

25. El compuesto de la reivindicación 23 donde el compuesto es para usar en combinación con uno o más agentes terapéuticos adicionales de utilidad para el tratamiento de una enfermedad inflamatoria gastrointestinal.

26. Uso de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 para la elaboración de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad inflamatoria gastrointestinal en un mamífero.

27. El uso de la reivindicación 26 donde la enfermedad inflamatoria gastrointestinal es colitis ulcerativa.

28. Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 para usar en el tratamiento de una enfermedad inflamatoria de la piel en un mamífero.
29. El compuesto de la reivindicación 28 donde la enfermedad inflamatoria de la piel es dermatitis atópica.
30. Uso de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 para la elaboración de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad inflamatoria de la piel en un mamífero.
31. El uso de la reivindicación 30, donde la enfermedad inflamatoria de la piel es dermatitis atópica.
32. Un método para tratar una enfermedad inflamatoria gastrointestinal en un mamífero, comprendiendo el método administrar al mamífero un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
33. El método de la reivindicación 32, donde el método comprende además administrar uno o más agentes terapéuticos adicionales útiles para el tratamiento de una enfermedad inflamatoria gastrointestinal.
34. El método de la reivindicación 32, donde la enfermedad inflamatoria gastrointestinal es colitis ulcerativa
35. Un método para tratar una enfermedad inflamatoria de la piel en un mamífero, comprendiendo el método aplicar una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16 a la piel del mamífero.
36. El método de la reivindicación 35, en donde la enfermedad inflamatoria es dermatitis atópica.