


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODICADO
(Modificaciones Voluntarios)

1. Compuestos de la fórmula (I)



en la cual

- Q representa oxígeno o azufre,
- V representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y ciano,
- W representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y ciano,
- Y representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo opcionalmente sustituido el cual está opcionalmente interrumpido por heteroátomos, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido que está opcionalmente interrumpido por heteroátomos, arilalquilo, hetarilalquilo y ciano,
- A representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustituidos y cicloalquilo y cicloalquilalquilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos,
- T representa oxígeno o un par de electrones,
- U¹ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalquenilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido el cual está opcionalmente interrumpido por heteroátomos, arilo y hetarilo opcionalmente sustituidos, arilalquilo y hetarilalquilo opcionalmente sustituidos,

- L^2 representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo opcionalmente sustituido
- o
- L^1 y L^2 junto con el átomo de carbono al cual están unidos representan un anillo alifático de tres a ocho miembros opcionalmente sustituido el cual puede estar opcionalmente interrumpido por heteroátomos
- o
- L^1 y L^2 juntos representan alquenilo opcionalmente sustituido,
- L^3 representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} y $N(R^2)(R^3)$, donde en caso de que L^1 y/o L^2 represente hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, L^3 representa un radical del grupo que consiste en $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} y $N(R^2)(R^3)$,
- R^{1a} representa un radical del grupo que consiste en alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalquenilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo y cicloalquenilalquilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, arilo y hetarilo opcionalmente sustituidos, arilalquilo y hetarilalquilo opcionalmente sustituidos,
- R^{1b} representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalquenilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo y cicloalquenilalquilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, arilo y hetarilo opcionalmente sustituidos y arilalquilo y hetarilalquilo opcionalmente sustituidos,
- R^2 representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalquenilo opcionalmente sustituidos que están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo y cicloalquenilalquilo opcionalmente sustituidos que están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, arilo y hetarilo opcionalmente sustituidos y arilalquilo y hetarilalquilo opcionalmente sustituidos,
- R^3 representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustituidos o representa los radicales $C(O)N(R^5)(R^6)$, $C(O)R^7$, $C(O)OR^8$ y SO_2R^9 ,

o

R² y R³ junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos representan un heterociclo saturado, parcialmente saturado o aromático opcionalmente sustituido el cual tiene de 3 a 9 átomos en el anillo y puede estar opcionalmente interrumpido por otros heteroátomos y/o uno o dos grupos CO,

R⁵ y R⁶ independientemente entre sí representan un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alqueno y alquino opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalqueno opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido el cual está opcionalmente interrumpido por heteroátomos, arilo y heterilo opcionalmente sustituidos y arilalquilo y heterilalquilo opcionalmente sustituidos,

o

R⁵ y R⁶ junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos representan un anillo alifático de tres a ocho miembros opcionalmente sustituido el cual puede estar opcionalmente interrumpido por heteroátomos

R⁷ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alqueno y alquino opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalqueno opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo y cicloalquenalquilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, arilo y heterilo opcionalmente sustituidos y arilalquilo y heterilalquilo opcionalmente sustituidos,

R⁸ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alqueno y alquino opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalqueno opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo y cicloalquenalquilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, arilo y heterilo opcionalmente sustituidos y arilalquilo y heterilalquilo opcionalmente sustituidos,

R⁹ representa un radical del grupo que consiste en alquilo, alqueno y alquino opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalqueno opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo y cicloalquenalquilo opcionalmente sustituidos los cuales están opcionalmente interrumpidos por heteroátomos, arilo y heterilo opcionalmente sustituidos y arilalquilo y heterilalquilo opcionalmente sustituidos,

- n representa un número 0, 1 o 2,
- y sus sales.
2. Los compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde
- Q representa oxígeno o azufre,
- V representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₄ y ciano,
- W representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₄ y ciano,
- Y representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alqueno C₃-C₆ o alquino C₃-C₆, opcionalmente sustituido una o varias veces independientemente entre sí con halógeno, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₈, opcionalmente sustituido de una a cuatro veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano; cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n y NR⁴ y opcionalmente sustituido de una a cuatro veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano; aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril- alquilo C₁-C₄, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano,
- A representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆, alqueno C₃-C₆ y alquino C₃-C₆, opcionalmente sustituidos una o varias veces independientemente entre sí con halógeno, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano, cicloalquilo C₃-C₆ el cual está opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano, puede estar opcionalmente interrumpido por O, S(O)_n, NR⁴; y cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada y el cual está opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y el cual puede estar opcionalmente interrumpido por O, S(O)_n o NR⁴,
- T representa oxígeno o un par de electrones,
- L¹ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₈, alqueno C₂-C₈ y alquino C₂-C₈, opcional e independientemente uno del

otro sustituidos de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₈ y cicloalquenilo C₅-C₈ los cuales están sustituidos opcional e independientemente uno del otro de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y que pueden estar opcionalmente interrumpidos una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n, CO y NR⁴; cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ y cicloalquenilo C₅-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada que están sustituidos opcional e independientemente uno del otro de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y que pueden estar opcionalmente interrumpidos una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n, CO y NR⁴; y arilo, hetarilo, arilalquilo y hetarilalquilo que están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente uno del otro con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano,

L² representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₄ que está sustituido opcional e independientemente uno del otro de una a cinco veces con halógeno y sustituido una o dos veces con alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano

o

L¹ y L² junto con el átomo de carbono al que están unidos representan cicloalquilo C₃-C₈ el cual está sustituido, opcional e independientemente uno del otro, de una a tres veces con halógeno, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano

o

L¹ y L² en forma conjunta representan alquenilo C₂-C₆ el cual está sustituido, opcional e independientemente uno del otro, de una a tres veces con halógeno, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano,

L³ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} y N(R²)(R³), donde en caso de que L¹ y/o L² represente hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, L³ representa un radical del grupo que consiste en S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} y N(R²)(R³),

R^{1a} representa un radical del grupo que consiste en alquilo C₁-C₈, alquenilo C₃-C₈ y alquinilo C₃-C₈, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces

con alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, ciano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ y C(O)OR⁸; cicloalquilo C₃-C₈ y cicloalquenilo C₅-C₈ los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cuatro veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n, CO y NR⁴; cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ y cicloalquenilo C₅-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cuatro veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n, CO y NR⁴; arilo y hetarilo que están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano; y aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano,

R^{1b} representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₈, alquenilo C₃-C₈ y alquinilo C₃-C₈, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, ciano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ y C(O)OR⁸; cicloalquilo C₃-C₈ y cicloalquenilo C₅-C₈ los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cuatro veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n, CO y NR⁴; cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ y cicloalquenilo C₅-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada que están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cuatro veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n, CO y NR⁴; arilo y hetarilo los cuales están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano; y aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-

C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano,


G representa O, N-CN o N-OR⁸,

R² representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₈, alquenilo C₃-C₈ y alquinilo C₃-C₈, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₈ y cicloalquenilo C₅-C₈ los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, una o dos veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n, CO y NR⁴; cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ y cicloalquenilo C₅-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están sustituidos, opcional e independientemente entre sí, una o dos veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos una o dos veces independientemente entre sí por O, S(O)_n, CO y NR⁴; arilo y hetarilo los cuales están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano; y aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada que están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano,

R³ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₈, alquenilo C₃-C₈ y alquinilo C₃-C₈, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a tres veces con halógeno, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano, o representa los radicales C(O)N(R⁵)(R⁶), C(O)R⁷, C(O)OR⁸ y SO₂R⁹,

o

R² y R³ junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos representan un heterociclo del grupo que consiste en U-1 a U-36,



R⁴ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₈, alqueno C₃-C₈ y alquino C₃-C₈, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alcoxi C₁-C₄ y alquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻; cicloalquilo C₃-C₈ y cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano; arilo y hetarilo, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, nitro y ciano; y aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, nitro y ciano,

- R⁵ y R⁶ independientemente uno del otro representan un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₈, alqueno C₃-C₈ y alquino C₃-C₈, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alcoxi C₁-C₄ y alquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻; cicloalquilo C₃-C₈, cicloalqueno C₅-C₈ y cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano; arilo y hetarilo, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, nitro y ciano; y aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, nitro y ciano,
- o
- R⁵ y R⁶ junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos representan un anillo alifático de tres a ocho miembros el cual puede estar opcionalmente sustituido con alquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂ y alcoxi C₁-C₂ y opcionalmente interrumpido por O o S(O)_n,
- R⁷ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₈, alqueno C₃-C₈ y alquino C₃-C₈, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻ y ciano; cicloalquilo C₃-C₈ y cicloalqueno C₅-C₈ los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, una o dos veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos por O, S(O)_n, CO o NR⁴; cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ y cicloalqueno C₅-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, una o dos veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos por O, S(O)_n, CO o NR⁴; arilo y hetarilo los cuales están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n⁻, nitro y ciano; y aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄,

haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano,

R⁸ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₈, alqueno C₃-C₈ y alquino C₃-C₈, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₈ y cicloalqueno C₅-C₈ los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, una o dos veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos por O, S(O)_n, CO, NR⁴; cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ y cicloalqueno C₅-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, una o dos veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos por O, S(O)_n, CO, NR⁴; arilo y hetarilo los cuales están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano; y aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano,

R⁹ representa un radical del grupo que consiste en alquilo C₁-C₈, alqueno C₃-C₈ y alquino C₃-C₈, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con halógeno y sustituidos una o dos veces con alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₈ y cicloalqueno C₅-C₈ los cuales están sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, una o dos veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos por O, S(O)_n, CO, NR⁴; cicloalquilo C₃-C₈-alquilo C₁-C₄ y cicloalqueno C₅-C₈-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada los cuales están sustituidos, opcional e independientemente entre sí, una o dos veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y ciano y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos por O, S(O)_n, CO, NR⁴; y arilo y hetarilo que están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano;

aril-alquilo C₁-C₄ y hetaril-alquilo C₁-C₄ de cadena recta o ramificada que están opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano,

X^b representa un radical del grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, alcoxi C₁-C₄-alquilo C₁-C₄, ciano-alquilo C₁-C₄; cicloalquilo C₃-C₆ y cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₄ los cuales están opcionalmente sustituidos de una a cuatro veces con halógeno, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄ y alquilo C₁-C₄-S(O)_n- y los cuales pueden estar opcionalmente interrumpidos por O o S(O)_n; alqueno C₂-C₆, alquino C₂-C₆, alquilo C₁-C₄carbonilo, haloalquilo C₁-C₄carbonilo, alcoxi C₁-C₆carbonilo, alquilo C₁-C₆aminocarbonilo, di-alquil(C₁-C₆)aminocarbonilo, alquilo C₁-C₆carbonilamino, arilo y hetarilo, donde los sustituyentes arilo y hetarilo pueden estar opcionalmente sustituidos una o varias veces con sustituyentes idénticos o diferentes del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, alquilo C₁-C₆, alqueno C₂-C₆, alquino C₂-C₆, alcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₆, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, nitro y ciano y donde los átomos de nitrógeno en el anillo en U-13, U-14, U-16, U-28 y U-35 no se sustituyen con halógeno, nitro, ciano, alcoxi C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₄ y alcoxi C₁-C₄-alquiloxi C₁-C₄,

m representa un número 0, 1 o 2, donde en el caso de m = 2 los radicales X^b opcionalmente pueden ser independientes respecto entre sí,

n representa un número 0, 1 o 2,

y sus sales.

3. Los compuestos de acuerdo con la Reivindicación 2, en donde

Q representa oxígeno o azufre,

V representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi y ciano,

W representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi y ciano,

- Y representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₄, alquenilo C₃-C₄ y alquinilo C₃-C₄, opcionalmente sustituidos de una a cinco veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, ciano; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente sustituido una a dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, NR⁴ y opcionalmente sustituido de una a cuatro veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, ciano; y ciano,
- A representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alquenilo C₃-C₆ o alquinilo C₃-C₆, opcionalmente sustituido de una a cinco veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- o ciano; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente sustituido una a dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o ciano; y cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituido una a dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o ciano,
- T representa oxígeno o un par de electrones,
- L¹ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆ y alquinilo C₂-C₆, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con flúor, cloro y bromo y sustituidos de una a tres veces con metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, CO y NR⁴ y opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, CO y NR⁴ y opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; fenilo, naftilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo y tiadiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi,

trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano; y fenil-alquilo C₁-C₂, piridil-alquilo C₁-C₂, pirimidil-alquilo C₁-C₂, tiazolil-alquilo C₁-C₂ y pirazolil-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,

L² representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₄ que está sustituido opcional e independientemente uno del otro de una a cinco veces con flúor, cloro y bromo y sustituido una o dos veces con metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano

o

L¹ y L² junto con el átomo de carbono al que están unidos representan cicloalquilo C₃-C₈ que está sustituido, opcional e independientemente uno del otro, de una a tres veces con flúor, cloro, bromo, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano

o

L¹ y L² en forma conjunta representan alqueno C₂-C₆ que está sustituido, opcional e independientemente uno del otro, de una a tres veces con flúor, cloro, bromo, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano

L³ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} y N(R²)(R³), donde en caso de que L¹ y/o L² represente hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, L³ representa un radical del grupo que consiste en S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} y N(R²)(R³),

R^{1a} representa un radical del grupo que consiste en alquilo C₁-C₆, alqueno C₃-C₆ y alquino C₃-C₆, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con flúor, cloro y bromo y sustituidos una o dos veces con metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, ciano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ y C(O)OR⁸; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, CO y NR⁴ y opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, CO y NR⁴ y opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro,

bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; fenilo, naftilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo y tiadiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano; y fenil-alquilo C₁-C₂, piridil-alquilo C₁-C₂, pirimidil-alquilo C₁-C₂, tiazolil-alquilo C₁-C₂ y pirazolil-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,

R^{1b} representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alquenilo C₃-C₆ y alquinilo C₃-C₆, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con flúor, cloro y bromo y sustituidos una o dos veces con metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, ciano, C(O)N(R⁵)(R⁶), C(G)R⁷ y C(O)OR⁸; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, CO y NR⁴ y opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, CO y NR⁴ y opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; fenilo, naftilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo y tiadiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano; y fenil-alquilo C₁-C₂, piridil-alquilo C₁-C₂, pirimidil-alquilo C₁-C₂, tiazolil-alquilo C₁-C₂ y pirazolil-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,

- G representa O o N-OR⁸,
- R² representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alquenilo C₃-C₆ y alquinilo C₃-C₆, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con flúor, cloro y bromo y sustituidos una o dos veces con metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, CO y NR⁴ y opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente interrumpido una o dos veces independientemente entre sí con O, S(O)_n, CO y NR⁴ y opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; fenilo, naftilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo y tiadiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano; y fenil-alquilo C₁-C₂, piridil-alquilo C₁-C₂, pirimidil-alquilo C₁-C₂, tiazolil-alquilo C₁-C₂ y pirazolil-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,
- R³ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alquenilo C₃-C₆ y alquinilo C₃-C₆, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano; o representa los radicales C(O)N(R⁵)(R⁶), C(O)R⁷, C(O)OR⁸ y SO₂R⁹,
- o
- R² y R³ junto con N representan un heterociclo del grupo que consiste en U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-10, U-13, U-14, U-24, U-25, U-26, U-27, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 y U-36,
- R⁴ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alquenilo C₃-C₆ y alquinilo C₃-C₆, opcionalmente sustituidos de una a tres

veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; fenilo, naftilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo y tiadiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano; y fenil-alquilo C₁-C₂, piridil-alquilo C₁-C₂, pirimidil-alquilo C₁-C₂, tiazolil-alquilo C₁-C₂ y pirazolil-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,

R⁵ y R⁶ independientemente uno del otro representan un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alqueno C₃-C₆ y alquino C₃-C₆, sustituidos, opcional e independientemente entre sí, de una a cinco veces con flúor, cloro y bromo y sustituidos una o dos veces con metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; fenilo, naftilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo y tiadiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano; fenil-alquilo C₁-C₂, piridil-alquilo C₁-C₂, pirimidil-alquilo C₁-C₂, tiazolil-alquilo C₁-C₂ y pirazolil-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo,

etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,

o

R⁵ y R⁶ junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos representan un anillo alifático de tres a seis miembros el cual puede estar sustituido opcionalmente con alquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂ y alcoxi C₁-C₂ y opcionalmente interrumpido por O o S(O)_n,

R⁷ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alqueno C₃-C₆ y alquino C₃-C₆, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con flúor, cloro y bromo y sustituidos una o dos veces con metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; fenilo, naftilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo y tiadiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano; y fenil-alquilo C₁-C₂, piridil-alquilo C₁-C₂, pirimidil-alquilo C₁-C₂, tiazolil-alquilo C₁-C₂ y pirazolil-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,

R⁸ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; alquilo C₁-C₆, alqueno C₃-C₆ y alquino C₃-C₆, sustituidos, opcional e independientemente uno del otro, de una a cinco veces con flúor, cloro y bromo y sustituidos una o dos veces con metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano; cicloalquilo C₃-C₆, opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; cicloalquilo C₃-C₆-alquilo C₁-C₂ de

cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituido una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi y ciano; fenilo, naftilo, piridilo, pirimidilo, piridazinilo, pirazinilo, triazinilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo y tiadiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano; y fenil-alquilo C₁-C₂, piridil-alquilo C₁-C₂, pirimidil-alquilo C₁-C₂, tiazolil- alquilo C₁-C₂ y pirazolil-alquilo C₁-C₂ de cadena recta o ramificada, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,


X^b representa un radical del grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₆, haloalquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₄, alquilo C₁-C₄-S(O)_n-, haloalcoxi C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄-S(O)_n-, halocicloalquilo C₃-C₆, alcoxi C₁-C₄-alquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄carbonilo, alquilo C₁-C₄aminocarbonilo, alquilo C₁-C₆sulfonilo, alquilo C₁-C₆carbonilamino y fenilo, donde el fenilo puede estar opcionalmente sustituido de una a tres veces con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n-, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometil-S(O)_n-, difluoroetil-S(O)_n-, trifluoroetil-S(O)_n-, nitro y ciano,

m representa un número 0, 1 o 2, donde en el caso de m = 2 los radicales X^b opcionalmente pueden ser independientes entre sí,

n representa un número 0, 1 o 2,

y sus sales.

4. Los compuestos de acuerdo con la Reivindicación 2 de la fórmula (I-1)



donde

- V representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, metilo y ciano,
- W representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, bromo, metilo, etil y ciano,
- Y representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; metilo, etilo, propilo, alilo y propargilo, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con flúor, metoxi, etoxi y ciano,
- A representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; metilo, etilo, propilo, alilo, propargilo, ciclopropilo y ciclopropilmetilo, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con flúor, metoxi, etoxi y ciano,
- T representa un par de electrones u oxígeno,
- L¹ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; metilo, etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, pentilo, isopentilo, 2,2-dimetilpropilo, hexilo, neo-hexilo, vinilo, alilo, metalilo, 2-butenilo, propargilo, etinilo y 2-butinilo, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con flúor, cloro y bromo y sustituidos una vez con metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo o ciano; ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; ciclopropilmetilo, ciclobutilmetilo, ciclopentilmetilo y ciclohexilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; fenilo, piridilo, pirimidilo, tienilo y tiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo,

difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano; bencilo, piridilmetilo, pirimidilmetilo, tiazolilmetilo y pirazolilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano,

L^2 representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; metilo, etilo y propilo, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con flúor, metoxi, etoxi y ciano

o

L^1 y L^2 junto con el átomo de carbono al que están unidos representan ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo o ciclohexilo, sustituido, opcional e independientemente uno del otro, de una a tres veces por flúor, cloro, bromo, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano

o

L^1 y L^2 en forma conjunta representan etenilo, propenilo o butenilo, sustituido, opcional e independientemente uno del otro, de una a tres veces con flúor, cloro, bromo, metil-S(O)_n-, etil-S(O)_n- y ciano,

L^3 representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} y N(R²)(R³), donde en caso de que L^1 y/o L^2 represente hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, L^3 representa un radical del grupo que consiste en S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} y N(R²)(R³),

R^{1a} representa un radical del grupo que consiste en metilo, etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, pentilo, isopentilo, 2,2-dimetilpropilo, hexilo, neo-hexilo, alilo, metalilo, 2-butenilo, propargilo y 2-butinilo, opcionalmente sustituidos de una a cinco veces independientemente entre sí con flúor, cloro y bromo y sustituidos una vez con metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo,

etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, ciano, $C(O)N(R^5)(R^6)$ o $C(O)OR^8$; ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; tetrahidrofurano, tetrahidropirano, pirrolidilo, N-metilpirrolidilo, piperidilo y N-metilpiperidilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; ciclopropilmetilo, ciclobutilmetilo, ciclopentilmetilo y ciclohexilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; fenilo, piridilo, pirimidilo, tienilo y tiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano; y bencilo, piridilmetilo, pirimidilmetilo, tiazolilmetilo y pirazolilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano,

R^{1b} representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; metilo, etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, pentilo, isopentilo, 2,2-dimetilpropilo, hexilo, neo-hexilo, alilo, metalilo, 2-butenilo, propargilo y 2-butinilo, opcionalmente sustituidos de una a cinco veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo o sustituidos una vez con metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, ciano, $C(O)N(R^5)(R^6)$ o $C(O)OR^8$; ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; tetrahidrofurano, tetrahidropirano, pirrolidilo, N-metilpirrolidilo, piperidilo y N-metilpiperidilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo,

trifluorometilo, metoxi y ciano; ciclopropilmetilo, ciclobutilmetilo, ciclopentilmetilo y ciclohexilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; fenilo, piridilo, pirimidilo, tienilo y tiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano; y bencilo, piridilmetilo, pirimidilmetilo, tiazolilmetilo y pirazolilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano,

R² y R³ junto con N representan un heterociclo del grupo que consiste en U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-13, U-25, U-26, U-27, U-29, U-30, U-31, U-32, U-33, U-34, U-35 y U-36,

R⁵ y R⁶ independientemente uno del otro representan un radical del grupo que consiste en hidrógeno; metilo, etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, pentilo, isopentilo, 2,2-dimetilpropilo, hexilo, neo-hexilo, alilo, metalilo, 2-butenilo, propargilo y 2-butinilo, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con flúor, cloro y bromo o sustituidos una vez con metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo o ciano; ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; ciclopropilmetilo, ciclobutilmetilo, ciclopentilmetilo y ciclohexilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; fenilo, piridilo, pirimidilo, tienilo y tiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo,

etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano; y bencilo, piridilmetilo, pirimidilmetilo, tiazolilmetilo y pirazolilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano,

R⁸ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno; metilo, etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, pentilo, isopentilo, 2,2-dimetilpropilo, hexilo, neo-hexilo, alilo, metalilo, 2-butenilo, propargilo y 2-butinilo, opcionalmente sustituidos de una a tres veces independientemente entre sí con flúor, cloro y bromo o sustituidos una vez con metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo o ciano; ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo y ciclohexilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; ciclopropilmetilo, ciclobutilmetilo, ciclopentilmetilo y ciclohexilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, metilo, etilo, trifluorometilo, metoxi y ciano; fenilo, piridilo, pirimidilo, tienilo y tiazolilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo, trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano; y bencilo, piridilmetilo, pirimidilmetilo, tiazolilmetilo y pirazolilmetilo, opcionalmente sustituidos una o dos veces independientemente entre sí con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, metilsulfanilo, etilsulfanilo, metilsulfinilo, etilsulfinilo, metilsulfonilo, etilsulfonilo, difluorometoxi, trifluorometoxi, trifluorometilsulfanilo,

trifluorometilsulfinilo, trifluorometilsulfonilo, difluorometilsulfanilo, difluorometilsulfinilo, difluorometilsulfonilo, trifluoroetilsulfanilo, trifluoroetilsulfinilo, trifluoroetilsulfonilo, nitro y ciano,


X^b representa un radical del grupo que consiste en flúor, cloro, bromo, ciano, metilo, etilo, n-propilo, isopropilo, ciclopropilo, trifluorometilo, difluorometilo, trifluoroetilo, metoxi, etoxi, n-propoxi, isopropoxi, trifluorometoxi, metoximetilo, etoximetilo, metoxietilo, etoxietilo, metil- $S(O)_n$ -, etil- $S(O)_n$ - y fenilo, donde el fenilo puede estar opcionalmente sustituido de una a tres veces con flúor, cloro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi, nitro y ciano,

m representa un número 0, 1 o 2, donde en el caso de $m = 2$ los radicales X^b opcionalmente pueden ser independientes entre sí,

n representa un número 0, 1 o 2,

y sus sales.

5. Los compuestos de acuerdo con la Reivindicación 2 de la fórmula (I-1)



donde

V representa hidrógeno,

W representa hidrógeno,

Y representa metilo,

A representa metilo, etilo o ciclopropilo,

T representa un par de electrones u oxígeno,

L^1 representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, trifluorometilo, triclorometilo, isopropilo, isobutilo, isopentilo, fenilo, 2-clorofenilo, 3-clorofenilo, 4-clorofenilo, 3,4-diclorofenilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, 4-cloropiridin-3-ilo, 2-pirimidilo y bencilo,

- L^2 representa hidrógeno o metilo,
- o
- L^1 y L^2 en forma conjunta representan vinilo, prop-1-en-2-ilo, (1*E*)-prop-1-en-1-ilo, (1*Z*)-prop-1-en-1-ilo o ciclopropilo,
- L^3 representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} y $N(R^2)(R^3)$, donde en caso de que L^1 y/o L^2 represente hidrógeno o alquilo opcionalmente sustituido, L^3 representa un radical del grupo que consiste en $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} y $N(R^2)(R^3)$,
- R^{1a} representa un radical del grupo que consiste en metilo, etilo, isopropilo, isobutilo, terc-butilo, ciclopropilmetilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-metoxi-2-oxoetilo, fenilo, 2-clorofenilo, 3-clorofenilo, 4-clorofenilo y 2-pirimidilo,
- R^{1b} representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, 2,2,2-trifluoroetilo, isopropilo, ciclopropilmetilo, bencilo, 3-clorofenilo y 4-clorofenilo,
- R^2 y R^3 junto con N representan un heterociclo del grupo que consiste en U-2, U-4, U-5 y U-13,
- X^b representa trifluorometilo, metilo o ciclopropilo,
- m representa un número 0 o 1,
- n representa un número 0 o 2,
- y sus sales.

6. Los compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, caracterizados porque

- L^3 representa un radical del grupo que consiste en $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} y $N(R^2)(R^3)$.




7. Los compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, caracterizados porque

- L^3 representa un radical del grupo que consiste en $S(O)_nR^{1a}$ y $N(R^2)(R^3)$.

8. Los compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, caracterizados porque

- L^3 representa un radical $S(O)_nR^{1a}$.

9. Los compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 según cualquiera de las fórmulas (I-1a), (I-1c) o (I-1d), preferentemente según (I-1c).




10. Composición, que comprende por lo menos un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9 y extensores y/o tensioactivos habituales en particular para controlar plagas animales.

11. Una formulación agroquímica que comprende por lo menos un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9 en cantidades biológicamente eficaces de desde 0,00000001 hasta 98% en peso sobre la base del peso de la formulación agroquímica, y también extensores y/o tensioactivos.

12. La formulación agroquímica de acuerdo con la Reivindicación 11, que comprende adicionalmente un compuesto agroquímicamente activo adicional.

13. Los compuestos intermedios de las fórmulas (II) y (III)



donde los radicales tienen los significados de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 2 a 5 y, preferentemente, el significado de acuerdo con la Reivindicación 5.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- El presente Capítulo Reivindicatorio reemplaza en su totalidad al presentando al momento de la solicitud;
- se eliminaron las Reivindicaciones 11 a 14,
- se reemplazan la expresión “*que*” por “*el cual*” o “*los cuales*” a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio;
- se reemplaza la expresión “*consta de*” por la expresión “*consiste en*”;
- se modifica la expresión de transición a las Reivindicaciones 6 a 8 por “*caracterizado porque*”;
- se modifica la numeración y dependencia de las reivindicaciones según los cambios antes mencionados.