


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula:



caracterizado porque:

R1a es hidrógeno, metilo, etenilo, ciano, fluoro,
10 cloro, fluorometilo, o difluorometilo;

R1b es hidrógeno, fluoro, o cloro;


R1c es hidrógeno, hidroxilo, fluoro, benciloxi, o
hidroxietilamino;

R2 es hidrógeno o metilo;


15 R2a es hidrógeno o metilo; y

R3a es tetrahidropirranilo.


2. El compuesto de conformidad con la
reivindicación 1, caracterizado porque es:



3. El compuesto de conformidad con ya sea la
25 reivindicación 1 o reivindicación 2, caracterizado porque es:



5 4. El compuesto de conformidad con ya sea la reivindicación 1 o reivindicación 2, caracterizado porque es



10

5. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque es 4-fluoro-N-((1R)-1-[[1-(tetrahydro-2H-piran-4-ylcarbonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]etil]benzamida cristalina.

15 6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque es 4-fluoro-N-((1R)-1-[[1-(tetrahydro-2H-piran-4-ylcarbonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]etil]benzamida cristalina caracterizada por un patrón de difracción en polvo de rayos X (radiación de Cu, λ -1.54060 Å)

20 que comprende al menos un pico a 17.38° en combinación con uno o más picos seleccionados a partir del grupo que consiste de 12.51° , 15.65° , 16.37° , 17.56° , 21.48° y 25.23° ($2\theta \pm 0.2^\circ$).

7. Una composición farmacéutica, caracterizada

25 porque comprende un compuesto de conformidad con cualquiera

de las reivindicaciones 1-6, con uno o más excipientes, portadores o diluyentes farmacéuticamente aceptables.

8. Un método para tratar un paciente con un cáncer seleccionado a partir del grupo que consiste de
5 melanoma, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica, cáncer colorrectal, carcinoma de células renales, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, carcinoma de tubos de falopio, carcinoma peritoneal primario, cáncer cervical, cáncer gástrico, cáncer hepático, cáncer
10 pancreático, cáncer tiroideo, glioma, linfoma no Hodgkin, y linfoma de Hodgkin, caracterizado porque comprende administrar al paciente una cantidad efectiva de un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-6.

9. Un compuesto de conformidad con cualquiera de
15 las reivindicaciones 1-6, para uso en terapia.

10. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, para uso en cáncer.

11. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque el cáncer se
20 selecciona a partir del grupo que consiste de melanoma, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica, cáncer colorrectal, carcinoma de células renales, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, carcinoma de tubos de falopio, carcinoma peritoneal primario, cáncer cervical, cáncer gástrico, cáncer hepático, cáncer pancreático, cáncer tiroideo, glioma, linfoma no Hodgkin, y linfoma de Hodgkin.