



REIVINDICACIONES

1. Un proceso para preparar un compuesto oligomérico de Fórmula (A):




(A) ;

en donde n es un número entero desde 10 a 40, y cada R^2 , independientemente de cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:



caracterizado porque el proceso comprende las etapas secuenciales de:


(a) poner en contacto un compuesto de Fórmula (A1):



(A1);

en donde R^1 es un medio de soporte y R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo;


con un agente de desbloqueo para formar el compuesto de Fórmula (II):



(II);

en donde R^1 es un medio de soporte;


(b) poner en contacto el compuesto de Fórmula (II) con un compuesto de Fórmula (A2):



(A2);

en donde R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo;


para formar un compuesto de Fórmula (A3):



(A3);

en donde R^1 es un medio de soporte, y R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo;


15 (c) poner en contacto el compuesto de Fórmula (A3) con un agente de desbloqueo para formar un compuesto de Fórmula (IV):



(IV);


25 en donde R^1 es un medio de soporte;

(d) poner en contacto el compuesto de Fórmula (IV) con un compuesto de Fórmula (A4):




(A4);

en donde R³ se selecciona del grupo que consiste de
 10 tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y
 trimetoxitritilo, y R⁴ se selecciona del grupo que consiste de:



para formar un compuesto de Fórmula (A5):





(A5);

en donde R^1 es un medio de soporte, R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo, y


15

R^4 se selecciona de:






(T),




(PA),




(P5mC),


5



(U),



(I), y




(PG);

10

(e) realizar n-1 iteraciones de las etapas
secuenciales de:

(e1) poner en contacto el producto formado por la
etapa inmediatamente previa con un agente de desbloqueo; y

(e2) poner en contacto el compuesto formado por la
15 etapa inmediatamente previa con un compuesto de Fórmula (A8):




20


(A8);

en donde R^3 se selecciona del grupo que consiste de
trinitilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y
trimetoxitritilo, y R^4 , independientemente de cada compuesto de
25 Fórmula (A8), se selecciona del grupo que consiste de:


5



10




15




para formar un compuesto de Fórmula (A9):

20




25

en donde n es un número entero desde 10 a 40, R^1 es un medio de soporte, R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo, y R^4 , independientemente de cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:





(f) poner en contacto el compuesto de Fórmula (A9) con un agente de desbloqueo para formar un compuesto de Fórmula (A10):




(A10) ;

en donde n es un número entero desde 10 a 40, R¹ es
 15 un medio de soporte, y R⁴, independientemente de cada aparición,
 se selecciona del grupo que consiste de:






(T) ,




(PA) ,




(P5mC) ,


5



(U) ,



(I) , y




(PG) ;

10

(g) poner en contacto el compuesto de Fórmula (A10) con un agente de escisión para formar un compuesto de Fórmula (A11) :

15




20

25


(A11) ;

en donde n es un número entero desde 10 a 40, y R^4 , independientemente de cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:



(j) poner en contacto el compuesto de Fórmula (A11) con un agente de desprotección para formar el compuesto oligomérico de Fórmula (A).

2. El proceso de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A4) es de Fórmula (A4a):




(A4a);

en donde:


R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo, y

R^4 se selecciona de:




(PC),


(DPG),




(T),




(PA),




(P5mC),



(U),




(I), y



(PG) .

3. El proceso de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A5) es de Fórmula (A5a):



(A5a);

15


en donde:

R^1 es un medio de soporte


R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo, y

R^4 se selecciona de:

20




(PC) ,




(DPG) ,

25




5



10

4. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A8) es de Fórmula (A8a):

15



(A8a);

en donde:



20

R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo, y


R^4 , independientemente en cada aparición del compuesto de Fórmula (A8a), se selecciona del grupo que consiste de:

25

5




10



5. El proceso de conformidad con cualquiera de las
 15 reivindicaciones 1-4, caracterizado porque el compuesto de
 Fórmula (A9) es de Fórmula (A9a):

20



25

(A9a) ;


en donde:

n es un número entero desde 10 a 40,

R¹ es un medio de soporte


R³ se selecciona del grupo que consiste de tritilo,
5 monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo, y

R⁴, independientemente de cada aparición, se
selecciona del grupo que consiste de:



6. El proceso de conformidad con cualquiera de las
25 reivindicaciones 1-5, caracterizado porque el compuesto de

Fórmula (A10) es de Fórmula (A10a):




(A10a) ;


en donde:

n es un número entero desde 10 a 40,


$\mathbb{R}^1$ es un medio de soporte, y

R^4 , independientemente de cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:






5



10

7. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A11) es de Fórmula (A11a):

15



20

25

(A11a);


en donde:

n es un número entero desde 10 a 40, y


R^4 , independientemente de cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:

5


10



15



20




8. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, caracterizado porque el compuesto oligomérico de Fórmula (A), n es 30, y R^2 en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a 3':

25

Posición No. 5'	R ²	Posición No. 5'	R ²	Posición No. 5'	R ²
a 3'		a 3'		a 3'	
1	C	11	A	21	G
2	T	12	A	22	C
3	C	13	G	23	A
4	C	14	G	24	T
5	A	15	A	25	T
6	A	16	A	26	T
7	C	17	G	27	C
8	A	18	A	28	T
9	T	19	T	29	A
10	C	20	G	30	G


10

en donde el compuesto oligomérico de Fórmula (A) es un compuesto de Fórmula (E):




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. El proceso de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado porque el compuesto oligomérico de Fórmula (E) es un compuesto oligomérico de Fórmula (XII):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


10. El proceso de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado para preparar un compuesto oligomérico de Fórmula (E):



(II) ;


en donde R^1 es un medio de soporte;

(b) poner en contacto el compuesto de Fórmula (II) con compuesto (B) :



(B) ;


para formar un compuesto de Fórmula (III) :



(III) ;

en donde R^1 es un medio de soporte;


(c) poner en contacto el compuesto de Fórmula (III) con un agente de desbloqueo para formar un compuesto de Fórmula (IV) :



(IV) ;



en donde R^1 es un medio de soporte;

(d) poner en contacto el compuesto de Fórmula (IV) con un compuesto de Fórmula (C) :




(C) ;

para formar un compuesto de Fórmula (V) :




(f) poner en contacto el compuesto de Fórmula (VI) con compuesto de Fórmula (F):



(F) ;

para formar un compuesto de Fórmula (VII):




(VII) ;

en donde R^1 es un medio de soporte;

(g) realizar 28 iteraciones de las etapas
secuenciales de:


(g1) poner en contacto el producto formado por la
etapa inmediatamente previa con un agente de desbloqueo; y


5 (g2) poner en contacto el compuesto formado por la
etapa inmediatamente previa con un compuesto de Fórmula (VIII):




(VIII);

15 en donde R^2 , independientemente de cada compuesto de
Fórmula (VIII), se selecciona del grupo que consiste de:





(T), y




(PA),

5 en donde, para cada iteración desde 1 a 28, R^2 es:

No. Iteración	de R^2	No. Iteración	de R^2	No. Iteración	de R^2
1	PC	11	DPG	21	PA
2	PC	12	DPG	22	T
3	PA	13	PA	23	T
4	PA	14	PA	24	T
5	PC	15	DPG	25	PC
6	PA	16	PA	26	T
7	T	17	T	27	PA
8	PC	18	DPG	28	DPG
9	PA	19	DPG		
10	PA	20	PC		


para formar un compuesto de Fórmula (IX):



(IX);

en donde R^1 es un medio de soporte,


en donde R^2 , independientemente de cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:



15 en donde R^2 en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a 3' :


Posición No. 5'	R^2	Posición No. 5'	R^2	Posición No. 5'	R^2
a 3'		a 3'		a 3'	
1	PC	11	PA	21	DPG
2	T	12	PA	22	PC
3	PC	13	DPG	23	PA
4	PC	14	DPG	24	T
5	PA	15	PA	25	T
6	PA	16	PA	26	T
7	PC	17	DPG	27	PC
8	PA	18	PA	28	T
9	T	19	T	29	PA
10	PC	20	DPG	30	DPG


(h) poner en contacto el compuesto de Fórmula (IX) con un agente de desbloqueo para formar un compuesto de Fórmula (X) :




20

25





(T), y




(PA), y

5 en donde R^2 en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a 3':


Posición No. 5' a 3'	R^2	Posición No. 5' a 3'	R^2	Posición No. 5' a 3'	R^2
1	PC	11	PA	21	DPG
2	T	12	PA	22	PC
3	PC	13	DPG	23	PA
4	PC	14	DPG	24	T
5	PA	15	PA	25	T
10 6	PA	16	PA	26	T
7	PC	17	DPG	27	PC
8	PA	18	PA	28	T
9	T	19	T	29	PA
10 10	PC	20	DPG	30	DPG

(i) poner en contacto el compuesto de Fórmula (X) con
15 un agente de escisión para formar un compuesto de Fórmula (XI):



(XI),

en donde R^2 , independientemente de cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:



15 en donde R^2 en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a 3' :

Posición No. 5' a 3'	R^2	Posición No. 5' a 3'	R^2	Posición No. 5' a 3'	R^2
1	PC	11	PA	21	DPG
2	T	12	PA	22	PC
3	PC	13	DPG	23	PA
4	PC	14	DPG	24	T
5	PA	15	PA	25	T
20 6	PA	16	PA	26	T
7	PC	17	DPG	27	PC
8	PA	18	PA	28	T
9	T	19	T	29	PA
10	PC	20	DPG	30	DPG

y

(j) poner en contacto el compuesto de Fórmula (XI)
 25 con un agente de desprotección para formar el compuesto

oligomérico de Fórmula (E).

11. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, caracterizado porque la etapa (d) o etapa (e2) comprende además poner en contacto el compuesto de
5 Fórmula (IV) o el compuesto formado por la etapa inmediatamente previa, respectivamente, con un agente de terminación de cadena.

12. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, caracterizado porque el agente de
10 desbloqueo usado en cada etapa es ácido halogenado o ácido cianoacético.


13. El proceso de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el ácido halogenado se selecciona del grupo que consiste de ácido cloroacético, ácido dicloroacético,
15 ácido tricloroacético, ácido fluoroacético, ácido difluoroacético y ácido trifluoroacético.

14. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-13, caracterizado porque al menos una de las etapas (a), (c), (e1), y (f) comprende además la etapa de poner
20 en contacto el compuesto desbloqueado de cada etapa con un agente de neutralización.

15. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-14, caracterizado porque el medio de soporte comprende un material seleccionado del grupo que consiste de
25 vidrio, vidrio modificado o funcionalizado, plásticos


(incluyendo acrílicos, poliestireno (por ejemplo, poliestireno con 1% divinilbenceno reticulado), copolímeros de estireno y otros materiales, polipropileno, polietileno, polibutileno, poliuretanos y TEFLÓN), polisacáridos, nilón o nitrocelulosa, cerámicas, resinas, sílice o materiales a base de sílice (incluyendo silicio y silicio modificado), carbono, metales y haces de fibra óptica.

16. Un compuesto, caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste de Fórmula (A1):



(A1),

y Fórmula (A3):




(A3)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en

donde:

cada R^1 es independientemente un medio de soporte; y
 cada R^3 independientemente se selecciona del grupo
 que consiste de hidrógeno, tritilo, monometoxitritilo,
 5 dimetoxitritilo y trimetoxitritilo.

17. Un compuesto de Fórmula (A5):



(A5)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,
 caracterizado porque:



R^1 es un medio de soporte;

20 R^3 se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno,
 tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y
 trimetoxitritilo; y




R^4 , independientemente en cada aparición, se
 selecciona del grupo que consiste de:

25




5



10




15



18. El compuesto de conformidad con la reivindicación 17, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A5) es de Fórmula (A5a):

20



25


(A5a) ;

en donde:

R^1 es un medio de soporte


R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo, y

5 R^4 se selecciona de:



19. El compuesto de conformidad con la reivindicación 18, caracterizado porque R^3 es tritilo.

20. Un compuesto de Fórmula (A9):



15

(A9),

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en
donde:

n es un número entero desde 10 a 40;

R¹ es un medio de soporte;


20

R³ se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno,
trinitilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y
trimetoxitritilo; y


R⁴, independientemente en cada aparición, se
selecciona del grupo que consiste de:

25


5



10




15



20

21. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A9) es de Fórmula (A9a):

25



(A9a) ;

en donde:

n es un número entero desde 10 a 40,


15 R^1 es un medio de soporte


R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo, y

R^4 , independientemente de cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:


20

25






5



10

22. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A9) es de Fórmula (IX):

15



20


25

(IX) ,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^1 es un medio de soporte, y


R^2 , independientemente en cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:



en donde R^2 en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a 3' :

Posición No. 5' a 3'	R^2	Posición No. 5' a 3'	R^2	Posición No. 5' a 3'	R^2
1	PC	11	PA	21	DPG
2	T	12	PA	22	PC
3	PC	13	DPG	23	PA
4	PC	14	DPG	24	T
5	PA	15	PA	25	T
6	PA	16	PA	26	T
7	PC	17	DPG	27	PC
8	PA	18	PA	28	T
9	T	19	T	29	PA
10	PC	20	DPG	30	DPG

23. El compuesto de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (IX) es de Fórmula (IXa):



(IXa),


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en

20 donde

R¹ es un medio de soporte, y

R², independientemente en cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:

25




en donde R^2 en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a

3' :

	Posición No. 5'	R^2	Posición No. 5'	R^2	Posición No. 5'	R^2
	a 3'		a 3'		a 3'	
15	1	PC	11	PA	21	DPG
	2	T	12	PA	22	PC
	3	PC	13	DPG	23	PA
	4	PC	14	DPG	24	T
	5	PA	15	PA	25	T
	6	PA	16	PA	26	T
	7	PC	17	DPG	27	PC
20	8	PA	18	PA	28	T
	9	T	19	T	29	PA
	10	PC	20	DPG	30	DPG

24. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A9) es de Fórmula (Xa):




(Xa) ,


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en

15 donde

R^1 es un medio de soporte, y

R^2 , independientemente en cada aparición, se
selecciona del grupo que consiste de:





5 en donde R^2 en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a 3' :


	Posición No. 5'	R^2	Posición No. 5'	R^2	Posición No. 5'	R^2
	a 3'		a 3'		a 3'	
	1	PC	11	PA	21	DPG
10	2	T	12	PA	22	PC
	3	PC	13	DPG	23	PA
	4	PC	14	DPG	24	T
	5	PA	15	PA	25	T
	6	PA	16	PA	26	T
	7	PC	17	DPG	27	PC
15	8	PA	18	PA	28	T
	9	T	19	T	29	PA
	10	PC	20	DPG	30	DPG

25. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 16-24, caracterizado porque el medio de soporte comprende poliestireno.

26. Un compuesto de Fórmula (A11):

5

10



(A11),

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

15

n es un número entero desde 10 a 40;


R^1 es un medio de soporte;


R^3 se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo; y

R^4 , independientemente en cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:


20

25






(T) ,




(PA) ,




(P5mC) ,


5



(U) ,



(I) , y




(PG) .

10

27. El compuesto de conformidad con la reivindicación 26, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A11) es de Fórmula (A11a):

15



20

25

(A11a) ,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


n es un número entero desde 10 a 40;

R¹ es un medio de soporte;


5 R³ se selecciona del grupo que consiste de tritilo, monometoxitritilo, dimetoxitritilo y trimetoxitritilo; y

R⁴, independientemente en cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:


10



15




20



25

28. El compuesto de conformidad con la

reivindicación 26, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (A11) es de Fórmula (XI):





o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^2 , independientemente en cada aparición, se selecciona del grupo que consiste de:


20

25





(T), y




(PA), y

5 en donde R² en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a 3' :

Posición	No. R ²	Posición	No. R ²	Posición	No. R ²
5' a 3'		5' a 3'		5' a 3'	
1	PC	11	PA	21	DPG
2	T	12	PA	22	PC
3	PC	13	DPG	23	PA
4	PC	14	DPG	24	T
5	PA	15	PA	25	T
6	PA	16	PA	26	T
7	PC	17	DPG	27	PC
8	PA	18	PA	28	T
9	T	19	T	29	PA
10	PC	20	DPG	30	DPG


20 29. El compuesto de conformidad con la reivindicación 28, caracterizado porque el compuesto de Fórmula (XI) es de Fórmula (XIa):




(XIa) ,

15 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en
donde

R², independientemente en cada aparición, se
selecciona del grupo que consiste de:





en donde R² en cada posición es desde 1 a 30 y 5' a

3' :

Posición No. 5'	R ²	Posición No. 5'	R ²	Posición No. 5'	R ²
a 3'		a 3'		a 3'	
1	PC	11	PA	21	DPG
2	T	12	PA	22	PC
3	PC	13	DPG	23	PA
4	PC	14	DPG	24	T
5	PA	15	PA	25	T
6	PA	16	PA	26	T
7	PC	17	DPG	27	PC
8	PA	18	PA	28	T
9	T	19	T	29	PA
10	PC	20	DPG	30	DPG