

REIVINDICACIONES

1. Un método para tratar el cáncer de próstata en un ser humano que necesita tal tratamiento que comprende administrar al ser humano una cantidad segura y eficaz de niraparib.
2. Un método de la reivindicación 1, en donde el cáncer de próstata es cáncer de próstata resistente a la castración o cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.
3. Un método de la reivindicación 2, en donde el cáncer de próstata es resistente a los antiandrógenos.
4. Un método como en la reivindicación 3, en donde el ser humano porta al menos una anomalía en la reparación del ADN seleccionada del grupo que consiste en BRCA-1, BRCA-2, FANCA, PALB2, CHEK2, BRIP1, HDAC2 y ATM.
5. Un método de la reivindicación 4, en donde la anomalía en la reparación del ADN es BRCA-1 o BRCA-2.
6. Un método de la reivindicación 5, en donde el cáncer de próstata es cáncer de próstata resistente a la castración.
7. Un método de la reivindicación 5, en donde el cáncer de próstata es cáncer de próstata metastásico resistente a la castración.

8. Un método de la reivindicación 6, en donde niraparib se administra en una cantidad de aproximadamente 30 mg/día a aproximadamente 400 mg/día.
9. Un método de la reivindicación 8, en donde la cantidad de niraparib administrada es aproximadamente 300 mg/día.
10. Un método de la reivindicación 9, en donde niraparib se administra como administración oral una vez al día en tres formas de dosificación oral de 100 mg.
11. Un método para tratar el cáncer de próstata resistente a la castración y a los antiandrógenos en un ser humano que comprende administrar tres formas de dosificación oral de 100 mg de niraparib una vez al día al ser humano.