

Reivindicaciones

1. Un bloqueador de ácido competitivo con potasio (P-CAB), para uso en el tratamiento, prevención y/o reducción de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) en pacientes que responden de manera parcial a un inhibidor de la bomba de protones (IBP).
2. El P-CAB para usarse de acuerdo con la reivindicación 1, donde el uso es para el tratamiento, prevención y/o reducción de los síntomas de la enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE) o esofagitis erosiva (EE) de Grado A según lo definido por la Clasificación de Los Ángeles (LA).
3. El P-CAB para usarse de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, donde el uso es para el tratamiento, prevención y/o reducción de los síntomas de la ERNE.
4. El P-CAB para usarse de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, donde el uso es para el tratamiento, prevención y/o reducción de los síntomas de EE de Grado A según lo definido por la Clasificación LA.
5. El P-CAB para usarse de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el PCAB se selecciona de 1-[5-(2-fluorofenil)-1-(piridin-3-ilsulfonil)-1H-pirrol-3-il]-N-metilmetanamina (vonoprazan), revaprazan, YH4808, tegoprazan (RQ-4) y 7- (4-fluorobenciloxi) -2,3-dimetil-1 - {[(1S, 2S) -2-metilciclopropil] metil} - 1H-pirrol [2,3-d] piridazina (CS-526), soroprazan (BY359), linaprazan (AZD0865), 8-benciloxi-2-metil-imidazo (1,2-a) piridin-3-ilo) acetonitrilo (SCH 28080) o una sal del mismo.
6. El P-CAB para usarse de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el PCAB es vonoprazan o una sal del mismo.
7. El P-CAB para usarse de acuerdo con la reivindicación 6, donde el PCAB es fumarato de vonoprazan.
8. El P-CAB para usarse de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la dosis del P-CAB a administrar es 0,5 mg a 500 mg al día.
9. El P-CAB para usarse de acuerdo con la reivindicación 8, donde la dosis del P-CAB a administrar es 20 mg a 40 mg al día.

- 10.** El P-CAB para usarse de acuerdo con la reivindicación 9, donde la dosis del P-CAB a administrar se selecciona de 20 ó 40 mg al día.
- 11.** El P-CAB para usarse de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, donde el IBP se selecciona de lansoprazol, pantoprazol, omeprazol y rabeprazol, o una forma ópticamente activa de los mismos, o una sal de los mismos.
- 12.** El P-CAB para usarse de acuerdo con la reivindicación 11, donde el IBP es dexlansoprazol o esomeprazol o una sal de los mismos.
- 13.** El P-CAB para usarse de acuerdo con la reivindicación 12, donde el IBP es esomeprazol o una sal del mismo.
- 14.** El P-CAB para usarse de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el P-CAB se administra por dosificación una vez al día.