

CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Un proceso para preparar la forma polimórfica III del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina que comprende:
 - a. Agitar una suspensión del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina en un disolvente orgánico seleccionado a partir de la lista de acetonitrilo, propionitrilo, acetona, metanol, etanol, tolueno y xilenos (*orto*, *meta* o *para*) o una mezcla de estos, en un rango de temperatura de 45°C a 55°C. durante al menos una semana; y
 - b. capturar la forma polimórfica III del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina.
2. Un proceso para preparar la forma polimórfica III del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina que comprende:
 - a. añadir a una suspensión del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina en un disolvente orgánico seleccionado a partir de la lista de acetonitrilo, propionitrilo, acetona, metanol, etanol, tolueno y xilenos (*orto*, *meta* o *para*) o una mezcla de estos, en un rango de temperatura de 45°C a 55°C, un núcleo de cristalización de la forma polimórfica III del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina;
 - b. agitar dicha suspensión por al menos 2 días; y
 - c. capturar la forma polimórfica III del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina.
3. Un proceso para preparar la forma polimórfica III del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina que comprende:
 - a. añadir la forma polimórfica I, forma polimórfica II, forma amorfa o una mezcla de las formas del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina a un disolvente orgánico seleccionado a partir de la lista de acetonitrilo, propionitrilo, acetona, metanol, etanol, heptano, tolueno y xilenos (*orto*, *meta* o *para*) o una mezcla de estos, a una temperatura inferior a 60 °C para producir una suspensión;
 - b. añadir un núcleo de cristalización de la forma polimórfica III del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina en un rango de temperatura de 45°C a 55°C;

c. capturar la forma polimórfica III del clorhidrato de *N*-[2-(6-fluoro-1*H*-indol-3-il)etil]-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)bencilamina.

4. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 donde el disolvente orgánico es una mezcla de acetona y heptano en una proporción de 1:4.

5. El proceso de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 donde el disolvente orgánico es una mezcla de metanol y tolueno en una proporción de 1:4.