


REIVINDICACIONES:


1. Un método de tratamiento de un paciente humano con una lesión renal aguda que comprende administrarle al paciente por vía intravenosa una cantidad eficaz de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


2. El método de la reivindicación 1, que comprende administrarle al paciente por vía intravenosa una cantidad eficaz de la sal de meglumina del compuesto.

3. Un método de tratamiento de un paciente humano con una lesión renal aguda que comprende administrarle al paciente una cantidad eficaz de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. Un método de tratamiento de un paciente humano con una lesión renal aguda que comprende administrarle al paciente una cantidad eficaz de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. El método de la reivindicación 3 ó 4, en donde el compuesto es administrado por vía intravenosa.

6. El método de la reivindicación 3 ó 4, en donde el compuesto es administrado por vía oral.

7. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente es tratado por una lesión renal aguda debida a una nefritis intersticial aguda.

8. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente es tratado por una lesión renal aguda debida a una enfermedad renal glomerular.

9. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente es tratado por una lesión renal aguda debida a una enfermedad renal vasculítica aguda.

10. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente es tratado por una lesión renal aguda debida a una isquemia.

11. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente es tratado por una lesión renal aguda debida a lesiones tóxicas.

12. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente es tratado por una lesión renal aguda debida a una azotemia prerrenal.

13. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente es tratado por una lesión renal aguda debida a una nefropatía obstructiva postrenal aguda.


14. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente es tratado por una lesión renal aguda debida a diabetes, insuficiencia renal subyacente, síndrome nefrítico, enfermedad aterosclerótica, sepsis, hipotensión, hipoxia, mioglobinuria-hematuria o una enfermedad hepática.

15. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el paciente bajo tratamiento por una lesión renal aguda es una persona de edad avanzada, una mujer embarazada o que ha estado expuesto a un agente nefrotóxico.


16. El método de la reivindicación 15, en donde el paciente es un paciente quirúrgico.

17. El método de la reivindicación 15, en donde el paciente ha estado expuesto a un agente nefrotóxico y dicho agente nefrotóxico es un fármaco o una sustancia química capaz de causar una lesión renal aguda.


19. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:




20. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:



21. Un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:




22. Uso de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en la elaboración de un medicamento para tratar por vía intravenosa a un paciente humano con una lesión renal aguda.

23. Uso de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para el tratamiento de un paciente humano con una lesión renal aguda.

24. Uso de un compuesto representado por la siguiente fórmula estructural:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para el tratamiento de un paciente humano con una lesión renal aguda.