

REIVINDICACIONES

1. 2-(5-{1-[2-(Difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)propan-2-ol, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. 2-(5-{1-[2-(Difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)propan-2-ol, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para usarse en terapia.

3. 2-(5-{1-[2-(Difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)propan-2-ol, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para usarse en el tratamiento y/o prevención de trastornos para los cuales está indicada la administración de un modulador de la función de TNF α .

4. 2-(5-{1-[2-(Difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)propan-2-ol, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para usarse en el tratamiento y/o prevención de un trastorno inflamatorio o autoinmune, un trastorno neurológico o neurodegenerativo, dolor o un trastorno nociceptivo, un trastorno cardiovascular, trastorno metabólico, un trastorno ocular o trastorno oncológico.

5. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende 2-(5-{1-[2-(difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)propan-2-ol, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, está en

asociación con un portador farmacéuticamente aceptable.

6. Una composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada porque comprende además un ingrediente farmacéuticamente activo adicional.

7. El uso de 2-(5-{1-[2-(difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)propan-2-ol, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para la manufactura de un medicamento para el tratamiento y/o prevención de trastornos para los cuales está indicada la administración de un modulador de la función de $\text{TNF}\alpha$.

8. El uso de 2-(5-{1-[2-(difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)propan-2-ol, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para la manufactura de un medicamento para el tratamiento y/o prevención de un trastorno inflamatorio o autoinmune, un trastorno neurológico o neurodegenerativo, dolor o un trastorno nociceptivo, un trastorno cardiovascular, un trastorno metabólico, un trastorno ocular, o un trastorno oncológico.

9. Un método para el tratamiento y/o prevención de trastornos para los cuales está indicada la administración de un modulador de la función de $\text{TNF}\alpha$, caracterizado porque comprende administrar a un paciente en necesidad de tal tratamiento una cantidad eficaz de 2-(5-{1-[2-(difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)-propan-2-ol, o una sal farmacéuticamente

aceptable del mismo.

10. Un método para el tratamiento y/o la prevención de un trastorno inflamatorio o autoinmune, un trastorno neurológico o neurodegenerativo, dolor o un trastorno nociceptivo, un trastorno cardiovascular, un trastorno metabólico, un trastorno ocular o un trastorno oncológico, caracterizado porque comprende administrar a un paciente en necesidad de tal tratamiento una cantidad eficaz de 2-(5-{1-[2-(difluorometoxi)-6-fluorobencil]-2-metil-1H-bencimidazol-6-il}pirimidin-2-il)propan-2-ol, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.