


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Derivados de imidazol de la fórmula (I)



en donde

R¹ representa *terc*-butilo, isopropilo, 1-clorociclopropilo, 1-fluorociclopropilo o 1-metilciclopropilo;


R² representa H o alquilo C₁–C₈;

R³ representa halógeno; ciano; amino; alquil C₁–C₈-oxi; cicloalquilo C₃–C₇; alquinilo C₂–C₈; alquil C₁–C₈-sulfanilo; aril-alquil C₁–C₆-carbonilo o alcoxi C₁–C₈-carbonilo;


R⁴ representa hidrógeno;

R⁵ representa hidrógeno;


Q representa un ciclo aromático de 6 miembros de la fórmula (Q–I-1) a (Q–I-3)



(Q–I-1)



(Q–I-2)



(Q–I-3)

en donde

en donde X¹, X², X³, X⁴ o X⁵ independientemente entre sí representan hidrógeno, halógeno, alquilo C₁–C₈, cicloalquilo C₃–C₈, halogenoalquilo C₁–C₈ que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno, alcoxi C₁–C₈ o 4-clorofeniloxi;

y sus sales o N-óxidos.

2. Derivados de imidazol de la fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde

R^1 representa *terc*-butilo, isopropilo, 1-clorociclopropilo, 1-fluorociclopropilo o 1-metilciclopropilo;


R^2 representa H;

R^3 representa fluor, cloro, bromo, iodo o ciano;


R^4 representa hidrógeno;

R^5 representa hidrógeno;


Q representa un ciclo aromático de 6 miembros de la fórmula (Q-I-1) a (Q-I-3)



(Q-I-1)



(Q-I-2)




(Q-I-3)

en donde X^1 , X^2 , X^3 , X^4 o X^5 tienen, de modo independiente entre sí, la misma definición que la dada en la Reivindicación 1;


y sus sales o N-óxidos.

3. Derivados de imidazol de la fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1 ó 2, en donde


Q representa un fenilo, 3-piridilo o 4-piridilo de la fórmula (Q-I-1) a (Q-I-3)



(Q-I-1)



(Q-I-2)




(Q-I-3)

en donde X^1 , X^2 , X^3 , X^4 o X^5 representan, de modo independiente entre sí hidrógeno o halógeno;

y R^1 , R^2 , R^3 , R^4 y R^5 tienen la misma definición que la dada en la Reivindicación 1 ó 2;

y sus sales o N-óxidos.

4. Compuestos de la fórmula (XVII)



(XVII)

en donde

R¹ representa *terc*-butilo, isopropilo, 1-clorociclopropilo, 1-fluorociclopropilo o 1-metilciclopropilo;

R³ representa halógeno; ciano; amino; alquil C₁-C₈-oxi; cicloalquilo C₃-C₇; alquinilo C₂-C₈; alquil C₁-C₈-sulfanilo; aril-alquil C₁-C₆-carbonilo o alcoxi C₂-C₅-carbonilo;

y sus sales o N-óxidos.
