



### REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que es ácido 17-cloro-5,13,14,22-tetrametil-28-oxa-2,9-ditia-5,6,12,13,22-pentaazaheptaciclo[27.7.1.1<sup>4,7</sup>.0<sup>11,15</sup>.0<sup>16,21</sup>.0<sup>20,24</sup>.0<sup>30,35</sup>]octatriaconta-1(37),4(38),6,11,14,16,18,20,23,29,31,33,35-tridecaeno-23-carboxílico (fórmula I)




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

2. El compuesto según la reivindicación 1, en el que el compuesto de fórmula I tiene la estructura de ácido (*R<sub>a</sub>*)-17-cloro-5,13,14,22-tetrametil-28-oxa-2,9-ditia-5,6,12,13,22-pentaazaheptaciclo[27.7.1.1<sup>4,7</sup>.0<sup>11,15</sup>.0<sup>16,21</sup>.0<sup>20,24</sup>.0<sup>30,35</sup>]octatriaconta-1(37),4(38),6,11,14,16,18,20,23,29,31,33,35-tridecaeno-23-carboxílico (fórmula II)



o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

3. El compuesto según la reivindicación 1, en el que el compuesto de fórmula I tiene la estructura de ácido (*S<sub>a</sub>*)-17-cloro-5,13,14,22-tetrametil-28-oxa-2,9-ditia-5,6,12,13,22-pentaazaheptaciclo[27.7.1.1<sup>4,7</sup>.0<sup>11,15</sup>.0<sup>16,21</sup>.0<sup>20,24</sup>.0<sup>30,35</sup>]octatriacenta-1(37),4(38),6,11,14,16,18,20,23,29,31,33,35-tridecaeno-23-carboxílico (fórmula III)



o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

4. Forma Sólida A de ácido (*R*<sub>a</sub>)-17-cloro-5,13,14,22-tetrametil-28-oxa-2,9-ditia-5,6,12,13,22-pentaazaheptaciclo[27.7.1.1<sup>4,7</sup>.0<sup>11,15</sup>.0<sup>16,21</sup>.0<sup>20,24</sup>.0<sup>30,35</sup>]octatriacenta-1(37),4(38),6,11,14,16,18,20,23,29,31,33,35-tridecaeno-23-carboxílico monohidratado, en la que la forma sólida tiene un patrón DRXP que comprende al menos un pico expresado como 2θ (±0.2°) seleccionado entre 5.4°, 7.0°, 8.4°, 10.7°, 12.5°, 13.1°, 14.4°, 15.1°, 15.6°, 17.1° y 18.2°.

5. La forma sólida de la reivindicación 4, en la que la forma sólida tiene un patrón DRXP que comprende al menos un pico expresado como 2θ (±0.2°) seleccionado entre 7.0°, 8.4° y 12.5°.

6. La forma sólida de la reivindicación 4, en la que la forma sólida tiene un patrón DRXP que comprende al menos un pico expresado como 2θ (±0.2°) seleccionado entre 5.4°, 7.0°, 8.4°, 10.7°, 12.5°, 13.1°, 14.4°, 15.1°, 15.6°, 17.1° y 18.2°.

7. La forma sólida de la reivindicación 4, en la que la forma sólida tiene un termograma de DSC que comprende una endoterma con un comienzo de desolvatación a 121 °C y un pico a 152 °C.

8. La forma sólida de la reivindicación 4, en la que la forma sólida tiene un termograma de DSC que comprende una endoterma con un comienzo de fusión/descomposición a 181 °C y un pico a 194 °C.

9. La forma sólida de la reivindicación 4, en la que la forma sólida tiene un termograma de TGA que exhibe una pérdida de masa del 4.0% tras el calentamiento de 25 °C a 160 °C.

10. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un excipiente, portador o diluyente farmacéutico.