


REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar una fitoenfermedad causada por hongo resistente a múltiples fármacos de tipo eflujo, comprendiendo dicho método una etapa de aplicación de una cantidad eficaz de un compuesto de ditiíntetracarboxamida representado por la fórmula (1):



a una planta o suelo donde crece la planta.

2. El método para controlar una fitoenfermedad de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el hongo resistente a múltiples fármacos de tipo eflujo es un hongo en el que se adquiere una resistencia a un agente de control de fitoenfermedades por una sobreexpresión de uno o más transportadores de membrana seleccionados entre el grupo que consiste en un transportador ABC y un transportador MFS.


3. El método para controlar una fitoenfermedad de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que la fitoenfermedad es una o más fitoenfermedades seleccionadas entre el grupo que consiste en enfermedad del trigo y enfermedad de las uvas.

4. El método para controlar una fitoenfermedad de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que el hongo resistente a múltiples fármacos de tipo eflujo es uno o más hongos resistentes a múltiples fármacos de tipo eflujo seleccionados entre el grupo que consiste en hongo de la mancha de la hoja del trigo *Septoria* y hongo de moho gris de las uvas.

5. El método para controlar una fitoenfermedad de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el hongo resistente a múltiples fármacos de tipo eflujo es un hongo resistente a múltiples fármacos de tipo eflujo que tiene una resistencia derivada de una mutación de un gen que codifica la proteína diana del agente de control de fitoenfermedades y/o una resistencia derivada de una sobreexpresión de la proteína diana, donde dicha resistencia es contra uno o más agentes de control de fitoenfermedades seleccionados entre el grupo que consiste en un inhibidor de la respiración y un inhibidor de la biosíntesis de esterol.

6. El método para controlar una fitoenfermedad de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que la etapa de aplicación a una planta o suelo donde la planta crece es una etapa de aplicación a una semilla.

7. Uso de un compuesto de ditiíntetracarboxamida representado por la fórmula (1):



para controlar una fitoenfermedad causada por un hongo resistente a múltiples fármacos de tipo eflujo.