


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la Fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (I);

en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

R³ es hidrógeno o -C(O)R²⁰;

10 cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquenilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

15 cada uno de R⁶ y R⁷ es hidrógeno;

R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;

20 R⁹ y R¹⁰ junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo heteroarilo de 6 miembros que contiene nitrógeno sustituido o no sustituido;

R²⁰ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, y arilo sustituido o no sustituido;

25 cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;

30 en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;


en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en

donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (Ia):



Fórmula (Ia);

en el que:
cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido y
n es 0, 1, 2 o 3.

3. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la Fórmula (Ib):



Fórmula (Ib);


en el que:

cada R^{11} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo, heteroarilo, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)N(R^{13})R^{14}$;

5 cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 , o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido y
10 n es 0, 1, 2 o 3.

4. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (Ic):



15

Fórmula (Ic);

en el que:

cada R^{11} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo, heteroarilo, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)N(R^{13})R^{14}$;


20

cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 , o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido y
25

n es 0, 1, 2 o 3.

5. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (Id):
30



Fórmula (Id);

en el que:


cada R^{11} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 , o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido y

n es 0, 1, 2 o 3.

6. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (Ie):



Fórmula (Ie);

en el que:


cada R^{11} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 , o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido; y

n es 0, 1 o 2.


7. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (If):



en el que:

- 5 cada R^{11} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo, heteroarilo, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)N(R^{13})R^{14}$;
- 10 cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 ;
- cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 , o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido y
- 15 n es 0, 1 o 2.


8. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (Ig):



- 20 en el que:
- cada R^{11} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo, heteroarilo, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)N(R^{13})R^{14}$,
- 25 cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 ;
- cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 , o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido y
- 30 sustituido y

n es 0, 1 o 2.

9. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (Ih):



Fórmula (Ih);

en el que:


cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido; y

n es 0, 1 o 2.

10. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (Ii):



Fórmula (Ii);

en el que:


cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se

encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido; y
n es 0, 1 o 2.

- 5 11. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que tiene la estructura de Fórmula (Ij):



Fórmula (Ij);

en el que:

- 10 cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

- 15 cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido; y
n es 0, 1 o 2.

20

12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 2-11, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 0.

- 25 13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que cada uno de R⁴ y R⁵ es independientemente alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido.


14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R⁴ y R⁵ son metilo.

30

15. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-14, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R³ es -C(O)R²⁰.

16. El compuesto de la reivindicación 15, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R²⁰ es arilo sustituido o no sustituido.

17. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IIa), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (IIa);

en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

10 cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquenilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;


R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;

20 cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;


25 cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

30 cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;



- cada R^{31} es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;
- 5 cada R^{32} y R^{33} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;
- cada uno de R^{34} y R^{35} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o
- 10 R^{34} y R^{35} junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;
- n es 0, 1 o 2;
- p es 0, 1, 2, 3 o 4;
- r es 0, 1, 2, 3 o 4;
- 15 t es 2, 3 o 4;
- en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquileo C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;
- 20 en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;
- en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,
- 25 en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

18. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IIb), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:
- 30



Fórmula (IIb);

en el que:

R^1 es hidrógeno;

R^2 es $-C(O)OR^{25}$ o $-C(O)N(R^{25})R^{26}$;

cada uno de R^4 y R^5 se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alquenilo C_2-C_6 sustituido o no sustituido, y alquinilo C_2-C_6 sustituido o no sustituido; o R^4 y R^5 junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C_3-C_6 sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C_2-C_7 sustituido o no sustituido;

R^6 y R^7 es hidrógeno;


R^8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, y $-(alquileo\ C_1-C_2)-(arilo)$ sustituido o no sustituido;

cada R^{11} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, $-CN$, amino, alquilamino, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo, heteroarilo, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)N(R^{13})R^{14}$,

cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 , o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido;

cada uno de R^{25} y R^{26} es independientemente hidrógeno o alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido;



R^{30} es halógeno, , o ;

cada R^{31} es independientemente halógeno, $-OH$, $-CN$, $-NO_2$, $-NH_2$, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alquilamina C_1-C_6 sustituida o no sustituida, cicloalquilo C_3-C_8 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;

cada R^{32} y R^{33} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada uno de R^{34} y R^{35} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C_3-C_8 sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido, o R^{34} y R^{35} junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido;

n es 0, 1 o 2;

p es 0, 1, 2, 3 o 4;

r es 0, 1, 2, 3 o 4;

t es 2, 3 o 4;


en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquileo C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;

en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

19. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IIc), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (IIc);

en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquileo C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;

R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquileo C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;


cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo,

heteroarilo, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{13})\text{R}^{14}$,

cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$;

cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo $\text{C}_2\text{-C}_9$ sustituido o no sustituido;

cada uno de R^{25} y R^{26} es independientemente hidrógeno o alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ sustituido o no sustituido;



cada R^{31} es independientemente halógeno, $-\text{OH}$, $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{NH}_2$, alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ sustituido o no sustituido, alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$ sustituido o no sustituido, alquilamina $\text{C}_1\text{-C}_6$ sustituida o no sustituida, cicloalquilo $\text{C}_3\text{-C}_8$ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo $\text{C}_2\text{-C}_9$ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;

15 cada R^{32} y R^{33} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$;

cada uno de R^{34} y R^{35} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ sustituido o no sustituido, cicloalquilo $\text{C}_3\text{-C}_8$ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo $\text{C}_2\text{-C}_9$ sustituido o no sustituido, o

20 R^{34} y R^{35} junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo $\text{C}_2\text{-C}_9$ sustituido o no sustituido;

n es 0, 1 o 2;

p es 0, 1, 2, 3 o 4;

r es 0, 1, 2, 3 o 4;

25 t es 2, 3 o 4;

en donde cada alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ sustituido, $-(\text{alquileo } \text{C}_1\text{-C}_2)\text{-(arilo)}$, cicloalquilo $\text{C}_3\text{-C}_8$, arilo, y heterocicloalquilo $\text{C}_2\text{-C}_9$, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH , CN , alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, y alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$;


30 en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

35 en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al

menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

20. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IId), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (IId);

en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

10 cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquenilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;


R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;

20 cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴,

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

25 cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

30 cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;




R³⁰ es halógeno, , o ;

cada R³¹ es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆

sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;
 cada R³² y R³³ se selecciona independientemente del grupo que consiste en
 5 hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;
 cada uno de R³⁴ y R³⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o R³⁴ y R³⁵ junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman
 10 un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;
 n es 0, 1 o 2;
 p es 0, 1, 2, 3 o 4;
 r es 0, 1, 2, 3 o 4;
 t es 2, 3 o 4;
 15 en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquileo C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;
 en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a
 20 10 átomos de carbono;
 en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,
 en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al
 25 menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

21. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (Ile), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:




en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste

en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alqueno C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquino C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;
 5 R⁶ y R⁷ es hidrógeno;
 R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alqueno C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;
 cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en
 10 halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴,
 cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;
 15 cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;
 cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆
 20 sustituido o no sustituido;
 cada uno de R²⁷ y R²⁸ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;



cada R³¹ es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;
 cada R³² y R³³ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;
 30 cada uno de R³⁴ y R³⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o R³⁴ y R³⁵ junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;
 35 n es 0, 1 o 2;

p es 0, 1, 2, 3 o 4;

r es 0, 1, 2, 3 o 4;

t es 2, 3 o 4;


5 en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquileo C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;

en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

10 en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno
15 o más heteroátomos en el anillo.

22. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IIIf), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (IIIf);

20 en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

25 cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquileo C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;

30 R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquileo C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;


cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-

C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

- 5 cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

- 10 cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;



R³⁰ es halógeno, , o ;

- 15 cada R³¹ es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;

cada R³² y R³³ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;

- 20 cada uno de R³⁴ y R³⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o R³⁴ y R³⁵ junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

n es 0, 1 o 2;

p es 0, 1, 2, 3 o 4;

- 25 r es 0, 1, 2, 3 o 4;

t es 2, 3 o 4;


- 30 en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;

en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

- 35 en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

- 5 23. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IIg), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (IIg);

en el que:

R¹ es hidrógeno;

- 10 R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquenilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

15

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;

R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;

20

cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;


cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

25

cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

30

cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;



R³⁰ es halógeno, , o ;

cada R³¹ es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;

cada R³² y R³³ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;

cada uno de R³⁴ y R³⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o R³⁴ y R³⁵ junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

n es 0, 1 o 2;

p es 0, 1, 2, 3 o 4;

r es 0, 1, 2, 3 o 4;

t es 2, 3 o 4;


en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquileo C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;

en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

en donde cada hetocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

24. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IIh), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (IIh);

en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

- 5 cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquenilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo
10 heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;


R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;

- 15 cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

- 20 cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

- 25 cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;




R³⁰ es halógeno, , o ;

- 30 cada R³¹ es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;

cada R³² y R³³ se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;
- cada uno de R³⁴ y R³⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o
- 5 R³⁴ y R³⁵ junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;
- n es 0, 1 o 2;
- p es 0, 1, 2, 3 o 4;
- r es 0, 1, 2, 3 o 4;
- 10 t es 2, 3 o 4;
- en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquileo C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;
- 15 en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;
- en donde cada hetocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,
- 20 en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

25. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (Ili), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:
- 25



Fórmula (Ili);

- en el que:
- R¹ es hidrógeno;
- R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;
- 30 cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alqueno C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que

se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;


R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;

cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;



R³⁰ es halógeno, , o ;

cada R³¹ es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;

cada R³² y R³³ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;

cada uno de R³⁴ y R³⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o R³⁴ y R³⁵ junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

n es 0, 1 o 2;

p es 0, 1, 2, 3 o 4;

r es 0, 1, 2, 3 o 4;

t es 2, 3 o 4;

en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones

seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;


en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

- 5 en donde cada hetocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno

- 10 o más heteroátomos en el anillo.

26. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IIj), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (IIj);

- 15 en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquenilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido, y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;

- 25 R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;

cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, amino, alquilamino, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴;

- 30


cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;

cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en

hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

cada uno de R²⁵ y R²⁶ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;

5



R³⁰ es halógeno, , o ;

cada R³¹ es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;

10

cada R³² y R³³ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;

cada uno de R³⁴ y R³⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o R³⁴ y R³⁵ junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

15

n es 0, 1 o 2;

p es 0, 1, 2, 3 o 4;

r es 0, 1, 2, 3 o 4;

20

t es 2, 3 o 4;

en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;

25

en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

30

en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

27. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-26, o una sal

35

farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 0.

28. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-26, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 1 y R¹¹ se selecciona del grupo que consiste en halógeno, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆.


29. El compuesto de la reivindicación 28, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 1 y R¹¹ es halógeno.

30. El compuesto de la reivindicación 28, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 1 y R¹¹ es alquilo C₁-C₆.

31. El compuesto de la reivindicación 28, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 1 y R¹¹ es alcoxi C₁-C₆.

32. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-26, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 2 y cada R¹¹ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆.

33. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (III) o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (III);


en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquenilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido y alquinilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;

- R^8 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, y $-(alquileo\ C_1-C_2)-(arilo)$ sustituido o no sustituido;
- cada R^{12} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 ;
- 5 cada R^{13} y R^{14} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1-C_6 , o R^{13} y R^{14} , junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido;
- cada R^{15} se selecciona independientemente del grupo que consiste en
- 10 halógeno, $-OH$, $-CN$, $-NO_2$, $-NH_2$, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alquilamina C_1-C_6 sustituida o no sustituida, cicloalquilo C_3-C_8 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido, arilo, heteroarilo, $-C(O)OR^{12}$, $-C(O)N(R^{13})R^{14}$, $-OC(O)OR^{12}$, $-OC(O)N(R^{13})R^{14}$, $-N(R^{13})C(O)OR^{12}$ y $-N(R^{13})C(O)N(R^{13})R^{14}$;
- 15 cada uno de R^{25} y R^{26} es independientemente hidrógeno o alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido;
- R^{30} es halógeno, $-OH$, $-CN$, $-NO_2$, $-NH_2$, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alquilamina C_1-C_6 sustituida o no sustituida, cicloalquilo C_3-C_8 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C_2-C_9
- 20 sustituido o no sustituido, arilo, heteroarilo,  ;
- cada R^{31} es independientemente halógeno, $-OH$, $-CN$, $-NO_2$, $-NH_2$, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alcoxi C_1-C_6 sustituido o no sustituido, alquilamina C_1-C_6 sustituida o no sustituida, cicloalquilo C_3-C_8 sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;
- 25 cada R^{32} y R^{33} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C_1-C_6 ;
- cada uno de R^{34} y R^{35} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo C_3-C_8 sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido, o
- 30 R^{34} y R^{35} junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C_2-C_9 sustituido o no sustituido;
- n es 0, 1 o 2;
- p es 0, 1, 2, 3 o 4;
- r es 0, 1, 2, 3 o 4;
- 35 t es 2, 3 o 4;


en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;

5 en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

10 en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

34. Un compuesto que tiene la estructura de la Fórmula (IV), o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (IV);

en el que:

R¹ es hidrógeno;

R² es -C(O)OR²⁵ o -C(O)N(R²⁵)R²⁶;

20 cada uno de R⁴ y R⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilenilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido y alquínilo C₂-C₆ sustituido o no sustituido; o R⁴ y R⁵ junto con el átomo de carbono al que se unen forman un anillo cicloalquilo C₃-C₆ sustituido o no sustituido o un anillo heterocicloalquilo C₂-C₇ sustituido o no sustituido;

R⁶ y R⁷ es hidrógeno;

R⁸ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, y -(alquilenos C₁-C₂)-(arilo) sustituido o no sustituido;

30 cada R¹² se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆;


cada R¹³ y R¹⁴ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁-C₆, o R¹³ y R¹⁴, junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos, forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no

sustituido;

cada R^{15} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo, heteroarilo, -C(O)OR¹², -C(O)N(R¹³)R¹⁴, -OC(O)OR¹², -OC(O)N(R¹³)R¹⁴, -N(R¹³)C(O)OR¹² y -N(R¹³)C(O)N(R¹³)R¹⁴;

cada uno de R^{25} y R^{26} es independientemente hidrógeno o alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido;

R^{30} es halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉



sustituido o no sustituido, arilo, heteroarilo,

cada R^{31} es independientemente halógeno, -OH, -CN, -NO₂, -NH₂, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido, alquilamina C₁-C₆ sustituida o no sustituida, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido, heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, arilo o heteroarilo;

cada R^{32} y R^{33} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno y alquilo C₁-C₆;

cada uno de R^{34} y R^{35} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo C₃-C₈ sustituido o no sustituido y heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido, o R^{34} y R^{35} junto con el átomo de nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo heterocicloalquilo C₂-C₉ sustituido o no sustituido;

n es 0, 1 o 2;

p es 0, 1, 2, 3 o 4;

r es 0, 1, 2, 3 o 4;

t es 2, 3 o 4;

en donde cada alquilo C₁-C₆ sustituido, -(alquileo C₁-C₂)-(arilo), cicloalquilo C₃-C₈, arilo, y heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo tiene uno o más sustituciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, OH, CN, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;

en donde cada arilo es independientemente un anillo aromático formado por 5 a 10 átomos de carbono;

en donde cada heterocicloalquilo es independientemente un grupo cicloalquilo, en

donde hay 2 a 9 carbonos en el anillo y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo; y,

en donde cada heteroarilo es independientemente un anillo aromático con al menos 2 a 9 átomos de carbono en la cadena de esqueleto y con al menos uno o más heteroátomos en el anillo.

35. El compuesto de la reivindicación 33 o la reivindicación 34, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 0.

36. El compuesto de la reivindicación 33 o la reivindicación 34, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 1 y R¹⁵ se selecciona del grupo que consiste en halógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido y alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido.

37. El compuesto de la reivindicación 36, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 1 y R¹⁵ es halógeno.


38. El compuesto de la reivindicación 36, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 1 y R¹⁵ es alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido.

39. El compuesto de la reivindicación 36, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 1 y R¹⁵ es alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido.

40. El compuesto de la reivindicación 33 o la reivindicación 34, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que n es 2 y cada R¹⁵ se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido y alcoxi C₁-C₆ sustituido o no sustituido.


41. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-40, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R³⁰ es F.

42. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-40, o una sal



farmacéuticamente aceptable de este, en el que R³⁰ es

43. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-40, o una sal



farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^{30} es

44. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-43, o una sal
5 farmacéuticamente aceptable de este, en el que p es 1.

45. El compuesto de la reivindicación 44, o una sal farmacéuticamente
aceptable de este, en el que R^{31} es halógeno.

10 46. El compuesto de la reivindicación 45, o una sal farmacéuticamente
aceptable de este, en el que R^{31} es F.

47. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-46, o una sal
farmacéuticamente aceptable de este, en el que cada uno de R^4 y R^5 es
15 independientemente alquilo C_1 - C_6 sustituido o no sustituido.

48. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 17-46, o una sal
farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^4 y R^5 son metilo.

20 49. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-48, o una sal
farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^2 es $-C(O)OR^{25}$.

50. El compuesto de la reivindicación 49, o una sal farmacéuticamente
aceptable de este, en el que R^{25} es alquilo C_1 - C_6 sustituido o no sustituido.

25 51. El compuesto de la reivindicación 50, o una sal farmacéuticamente
aceptable de este, en el que R^{25} es metilo.

52. El compuesto de la reivindicación 50, o una sal farmacéuticamente
30 aceptable de este, en el que R^{25} es etilo.

53. El compuesto de la reivindicación 50, o una sal farmacéuticamente
aceptable de este, en el que R^{25} es isopropilo.

35 54. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-48, o una sal

farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^2 es $-C(O)N(R^{25})R^{26}$.

55. El compuesto de la reivindicación 54, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^{25} es alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido.

5

56. El compuesto de la reivindicación 55, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^{25} es metilo.

10

57. El compuesto de la reivindicación 55, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^{25} es etilo.

58. El compuesto de la reivindicación 55, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^{25} es isopropilo.

15

59. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 54-58, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^{26} es hidrógeno.


60. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-59, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^1 es hidrógeno.


20

61. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-60, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^8 es hidrógeno.

62. Un compuesto que tiene la estructura:


25






una sal farmacéuticamente aceptable de este.

10 63. Un compuesto que tiene la estructura:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


64. Un compuesto que tiene la estructura:



5

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

65. Un compuesto que tiene la estructura:



10

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

66. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^3 es $-C(O)R^{20}$.

15

67. El compuesto de la reivindicación 66, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^{20} es un anillo sustituido o no sustituido.

68. El compuesto de la reivindicación 34, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^3 es $-C(O)R^{20}$, R^2 es $-C(O)N(R^{25})R^{26}$, y R^1 es H.

20

69. El compuesto de la reivindicación 34, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^2 es $-C(O)N(R^{25})R^{26}$.

70. El compuesto de la reivindicación 69, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que cada R^{25} y R^{26} son independientemente alquilo C_1 - C_6 sustituido o no sustituido e hidrógeno.
- 5 71. El compuesto de la reivindicación 34, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que cada R^4 y R^5 son independientemente alquilo C_1 - C_6 sustituido o no sustituido.
72. El compuesto de la reivindicación 34, o una sal farmacéuticamente
10 aceptable de este, en el que cada R^4 y R^5 son alquilo C_1 - C_6 sustituido o no sustituido, cada R^6 y R^7 son hidrógeno y R^2 es $-C(O)N(R^{25})R^{26}$.
73. El compuesto de la reivindicación 34, o una sal farmacéuticamente
15 aceptable de este, en el que R^3 es $-C(O)R^{20}$, cada R^4 y R^5 son alquilo C_1 - C_6 sustituido o no sustituido, y cada R^6 y R^7 son hidrógeno.
74. El compuesto de la reivindicación 73, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^{20} es un arilo sustituido o no sustituido.
- 20 75. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^9 y R^{10} junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo heteroarilo de 6 miembros que contiene nitrógeno sustituido o no sustituido, en donde la sustitución opcional es un halógeno.
- 25 76. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 17-26, 33, 34 y 62-65, en el que la sal farmacéuticamente aceptable es clorhidrato.
77. Una composición farmacéutica que comprende un diluyente, excipiente o aglutinante farmacéuticamente aceptable y un compuesto de cualquiera de las
30 reivindicaciones 1-76; o una sal farmacéuticamente aceptable de este.