

1
REIVINDICACIONES

1. Una combinación de un desinfectante y un coccidiostático caracterizada porque:

5 incluyendo dicho desinfectante un derivado fenol, estando dicho derivado fenol presente en dicho desinfectante en el intervalo del cinco al treinta por ciento;

 incluyendo dicho desinfectante disolventes orgánicos, estando presentes dichos disolventes orgánicos en dicho
10 desinfectante en el intervalo del 10 al 30 por ciento;

 incluyendo dicho desinfectante ácidos orgánicos/inorgánicos, estando presentes dichos ácidos orgánicos/inorgánicos en dicho desinfectante en el intervalo del 20 al 40 por ciento;

15 incluyendo dicho desinfectante un tensioactivo aniónico, estando presente dicho tensioactivo aniónico en dicho desinfectante en el intervalo del 5 al 10 por ciento;

 teniendo dicho coccidiostático un extracto acuoso de *Salvia libanotica*, estando presente dicho extracto acuoso de
20 *Salvia libanotica* dentro del coccidiostático dentro del intervalo del 2 al 10 por ciento y

 en la que el coccidiostático incluye además aceite de eucalipto en el intervalo del 5 al 15 %;

 en el que el coccidiostático incluye además aceite de
25 menta, dicho aceite de menta estando presente en dicho coccidiostático en el intervalo del 4 al 12%.

2. La combinación de un desinfectante y un coccidiostático como se recita en la reivindicación 1, caracterizada porque el
30 coccidiostático está diluida en agua de beber en al menos una de las siguientes relaciones de dilución: 0,005 %, 0,010 % o

0,020 %.

3. La combinación de un desinfectante y un coccidiostático como se recita en la reivindicación 1, caracterizada porque el desinfectante está diluida en una solución en la que la relación de dilución del desinfectante varía del 3 al 5 %.

4. Un método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos caracterizado por comprender las etapas de::

- formular un desinfectante, incluyendo dicho desinfectante:

- un derivado fenol, estando dicho derivado fenol presente en dicho desinfectante entre los intervalos del cinco al treinta por ciento,

- disolventes orgánicos, estando presentes dichos disolventes orgánicos en dicho desinfectante entre los intervalos del diez al treinta por ciento,

- ácidos orgánicos e inorgánicos, estando presentes dichos ácidos orgánicos e inorgánicos dentro del intervalo del 20 al 40 %,

- un tensioactivo aniónico; dicho tensioactivo aniónico estando presente en dicho desinfectante dentro del intervalo del 5 al 10 por ciento;

- aplicar dicho desinfectante a un área en la que los pollos se crecerán;

- formular un coccidiostático, dicho coccidiostático incluyendo:

o un extracto acuoso de *Salvia libanotica*, estando presente dicho extracto acuoso de *Salvia libanotica* dentro del coccidiostático dentro del intervalo del

2 al 10 por ciento y

o aceite de eucalipto entre el intervalo del 5 al 15 %;

o aceite de menta, dicho aceite de menta estando presente en dicho coccidiodiostático entre el intervalo del 4 al 12%;

- diluir dicho coccidiodiostático en el agua de beber para proporcionar a los pollos;
- administrar el agua de beber a los pollos durante el proceso de crecimiento.

5. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 4, caracterizado porque el coccidiodiostático se diluye en el agua de beber en al menos una de las siguientes relaciones de dilución: 0,005%, 0,010% o 0,020%.

6. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 5, caracterizado porque el desinfectante se aplica a un área deseada y el desinfectante se diluye en una solución en el que la relación de dilución del desinfectante varía del 3 al 5%.

7. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 6, caracterizado porque comprende preparar el extracto acuoso de la Salvia libanotica utilizando una relación de hojas de plantas a agua dentro de un intervalo de 1:3 a 1:8.

8. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación

7, caracterizado porque el desinfectante se aplica a un área deseada a una tasa de aplicación de 200 a 400 ml de dilución por metro cuadrado.

5 9. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 8, caracterizado porque el agua de beber teniendo disuelto el coccidiostatato se proporciona a los pollos quince veces durante el plazo de crecimiento inicial, siendo preferiblemente
10 el plazo de crecimiento inicial treinta y cinco días.

10. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 8 o en la reivindicación 9, caracterizado porque la etapa de
15 administrar el agua de beber se inicia después de que los pollos alcancen 4 días de edad y se termina después de que los pollos alcancen 33 días de edad.

11. El método para proporcionar el potenciamiento del
20 crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 4, caracterizado porque dicho coccidiostático se diluye en el agua de beber ejecutándose de tal manera que el coccidiostático esté presente en el agua de beber en el intervalo del 0,005 % al 0,020 %; para proporcionarlo a los pollos durante el proceso
25 de crecimiento durante un plazo de crecimiento inicial, siendo el plazo de crecimiento inicial treinta y cinco días.