

REIVINDICACIONES

1. Método para inactivar esporas de moho, que comprende someter una bebida con un pH de 2.0 a 4.0 medido a $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, a una temperatura de 50°C a 90°C , en presencia de natamicina.
5
2. Método de conformidad con la reivindicación 1, en el que dicha temperatura es de 65°C a 85°C .
- 10 3. Método de conformidad con la reivindicación 1, en el que dicha temperatura es de 80°C a 90°C .
4. Método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que dicho sujeto a una temperatura de 50°C a 90°C , se lleva a cabo durante 10 segundos a 30 minutos.
15
5. Método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la cantidad de natamicina en la bebida es de 1 a 200 ppm, con base al peso total de dicha bebida.
20
6. Método de conformidad con la reivindicación 5, en el que la cantidad de natamicina en la bebida es de 5 a 100 ppm, con base al peso total de dicha bebida.
7. Método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que las esporas de moho no son *Talaromyces macrosporus* CBS 130.89.
25
8. Método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que las esporas de moho son de *Aspergillus*, o *Talaromyces*, o *Paecilomyces*.
- 30 9. Método de conformidad con la reivindicación 8, en el que las esporas de moho son *Aspergillus niger*, o *Talaromyces*, o *Paecilomyces*.

REIVINDICACIONES ENMENDADAS
recibidas por la Oficina Internacional, el 7 de enero de 2019
(07.01.2019)

5

- [Reivindicación 1] Método para inactivar esporas de moho, que comprende someter la bebida con un pH de 2.0 a 4.0, medido a 20 ± 2 °C, a una temperatura de 50 °C a 90 °C, en presencia de natamicina, en donde dichas esporas de moho provienen de *Aspergillus*.
- [Reivindicación 2] Método, de conformidad con la reivindicación 1, en donde dicha temperatura se encuentra entre 65 °C a 85 °C.
- [Reivindicación 3] Método, de conformidad con la reivindicación 1, en donde dicha temperatura se encuentra entre 80 °C a 90 °C.
- [Reivindicación 4] Método, de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho sometimiento a una temperatura de 50 °C a 90 °C, se lleva a cabo durante 10 segundos a 30 minutos.
- [Reivindicación 5] Método, de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la cantidad de natamicina en dicha bebida, se encuentra de 1 a 200 ppm, con base en el peso total de la bebida.
- [Reivindicación 6] Método, de conformidad con la reivindicación 5, en donde la cantidad de natamicina en dicha bebida, se encuentra de 5 a 100 ppm, con base en el peso de la bebida.
- [Reivindicación 7] Método, de conformidad con la reivindicación 6, en donde dichas esporas de moho, son *Aspergillus niger*.

10

15

20

25