


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula I



en donde

cada L es independientemente -C(R¹)(R²)- o X; con la condición de que, cuando t es 1, luego L es -C(R¹)(R²)-;

X es O, S, S(O) o S(O)₂;

cada R¹ y R² es independientemente H, deuterio, halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, heteroarilo mono- o bi-cíclico, -OR^a, -OC(O)R^a, -OC(O)R^a, -OC(O)NR^aR^b, -OS(O)R^a, -OS(O)₂R^a, -SR^a, -S(O)R^a, -S(O)₂R^a, -S(O)NR^aR^b, -S(O)₂NR^aR^b, -OS(O)NR^aR^b, -OS(O)₂NR^aR^b, -NR^aR^b, -NR^aC(O)R^b, -NR^aC(O)OR^b, -NR^aC(O)NR^aR^b, -NR^aS(O)R^b, -NR^aS(O)₂R^b, -NR^aS(O)NR^aR^b, -NR^aS(O)₂NR^aR^b, -C(O)R^a, -C(O)OR^a, -C(O)NR^aR^b, -PR^aR^b, -P(O)R^aR^b, -P(O)₂R^aR^b, -P(O)NR^aR^b, -P(O)₂NR^aR^b, -P(O)OR^a, -P(O)₂OR^a, -CN, o -NO₂, o R¹ y R² tomados juntos con el carbón o carbonos a los que se unen, forman un C₃-C₆ cicloalquilo o un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, heteroarilo mono- o bi-cíclico, o heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, -OR^e, -OC(O)R^e, -OC(O)NR^eR^f, -OC(=N)NR^eR^f, -OS(O)R^e, -OS(O)₂R^e, -OS(O)NR^eR^f, -OS(O)₂NR^eR^f, -SR^e, -S(O)R^e, -S(O)₂R^e, -

S(O)NR^eR^f, -S(O)₂NR^eR^f, -NR^eR^f, -NR^eC(O)R^f, -NR^eC(O)OR^f, -NR^eC(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)R^f, -NR^eS(O)₂R^f, -NR^eS(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)₂NR^eR^f, -C(O)R^e, -C(O)OR^e, -C(O)NR^eR^f, -PR^eR^f, -P(O)R^eR^f, -P(O)₂R^eR^f, -P(O)NR^eR^f, -P(O)₂NR^eR^f, -P(O)OR^e, -P(O)₂OR^e, -CN, o -NO₂;

M es CR³ o N;

M¹ es CR⁴;

cada R³, R⁴, y R⁵ es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -OR^c, -OC(O)R^c, -OC(O)NR^cR^d, -OC(=N)NR^cR^d, -OS(O)R^c, -OS(O)₂R^c, -OS(O)NR^cR^d, -OS(O)₂NR^cR^d, -SR^c, -S(O)R^c, -S(O)₂R^c, -S(O)NR^cR^d, -S(O)₂NR^cR^d, -NR^cR^d, -NR^cC(O)R^d, -NR^cC(O)OR^d, -NR^cC(O)NR^cR^d, -NR^cC(=N)NR^cR^d, -NR^cS(O)R^d, -NR^cS(O)₂R^d, -NR^cS(O)NR^cR^d, -NR^cS(O)₂NR^cR^d, -C(O)R^c, -C(O)OR^c, -C(O)NR^cR^d, -C(=N)NR^cR^d, -PR^cR^d, -P(O)R^cR^d, -P(O)₂R^cR^d, -P(O)NR^cR^d, -P(O)₂NR^cR^d, -P(O)OR^c, -P(O)₂OR^c, -CN, -NO₂, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo mono- o bi-cíclico, o R⁴ y R⁵ tomados juntos con el anillo a los que se unen, forman un C₅-C₈ cicloalquilo, o un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, heteroarilo mono- o bi-cíclico, C₅-C₈ cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, -OR^e, -OC(O)R^e, -OC(O)NR^eR^f, -OC(=N)NR^eR^f, -OS(O)R^e, -OS(O)₂R^e, -OS(O)NR^eR^f, -OS(O)₂NR^eR^f, -SR^e, -S(O)R^e, -S(O)₂R^e, -S(O)NR^eR^f, -S(O)₂NR^eR^f, -NR^eR^f, -NR^eC(O)R^f, -NR^eC(O)OR^f, -NR^eC(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)R^f, -NR^eS(O)₂R^f, -NR^eS(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)₂NR^eR^f, -C(O)R^e, -C(O)OR^e, -C(O)NR^eR^f, -PR^eR^f, -P(O)R^eR^f, -P(O)₂R^eR^f, -P(O)NR^eR^f, -P(O)₂NR^eR^f, -P(O)OR^e, -P(O)₂OR^e, -CN, o -NO₂;

R⁶ es H, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo mono- o bi-cíclico, en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo mono- o bi-cíclico se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, C₃-C₆ cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros, -OR^e, -OC(O)R^e, -OC(O)NR^eR^f, -

OC(=N)NR^eR^f, -OS(O)R^e, -OS(O)₂R^e, -OS(O)NR^eR^f, -OS(O)₂NR^eR^f, -SR^e, -S(O)R^e, -S(O)₂R^e, -S(O)NR^eR^f, -S(O)₂NR^eR^f, -NR^eR^f, -NR^eC(O)R^f, -NR^eC(O)OR^f, -NR^eC(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)R^f, -NR^eS(O)₂R^f, -NR^eS(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)₂NR^eR^f, -C(O)R^e, -C(O)OR^e, -C(O)NR^eR^f, -PR^eR^f, -P(O)R^eR^f, -P(O)₂R^eR^f, -P(O)NR^eR^f, -P(O)₂NR^eR^f, -P(O)OR^e, -P(O)₂OR^e, -CN, o -NO₂;

R⁷ y R⁸ se combinan para formar un C₃-C₇ cicloalquilo, un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo de 5 a 7 miembros; en donde cada átomo de hidrógeno en C₃-C₇ cicloalquilo, un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo de 5 a 7 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, -OR^e, -OC(O)R^e, -OC(O)NR^eR^f, -OC(=N)NR^eR^f, -OS(O)R^e, -OS(O)₂R^e, -OS(O)NR^eR^f, -OS(O)₂NR^eR^f, -SR^e, -S(O)R^e, -S(O)₂R^e, -S(O)NR^eR^f, -S(O)₂NR^eR^f, -NR^eR^f, -NR^eC(O)R^f, -NR^eC(O)OR^f, -NR^eC(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)R^f, -NR^eS(O)₂R^f, -NR^eS(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)₂NR^eR^f, -C(O)R^e, -C(O)OR^e, -C(O)NR^eR^f, -PR^eR^f, -P(O)R^eR^f, -P(O)₂R^eR^f, -P(O)NR^eR^f, -P(O)₂NR^eR^f, -P(O)OR^e, -P(O)₂OR^e, -CN, o -NO₂;

Y es O, S, NR⁹, o CR⁹R¹⁰;


R⁹ y R¹⁰ son cada uno independientemente H, deuterio, halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo mono- o bi-cíclico, en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo mono- o bi-cíclico se sustituye opcionalmente por un halógeno, -OR^e, -OC(O)R^e, -OC(O)NR^eR^f, -OC(=N)NR^eR^f, -OS(O)R^e, -OS(O)₂R^e, -OS(O)NR^eR^f, -OS(O)₂NR^eR^f, -SR^e, -S(O)R^e, -S(O)₂R^e, -S(O)NR^eR^f, -S(O)₂NR^eR^f, -NR^eR^f, -NR^eC(O)R^f, -NR^eC(O)OR^f, -NR^eC(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)R^f, -NR^eS(O)₂R^f, -NR^eS(O)NR^eR^f, -NR^eS(O)₂NR^eR^f, -C(O)R^e, -C(O)OR^e, -C(O)NR^eR^f, -PR^eR^f, -P(O)R^eR^f, -P(O)₂R^eR^f, -P(O)NR^eR^f, -P(O)₂NR^eR^f, -P(O)OR^e, o -P(O)₂OR^e;

cada R^a, R^b, R^c, R^d, R^e, y R^f se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, C₆-C₁₀ arilo, heteroarilo de 5 a 7 miembros;

cada uno de Z¹, Z², Z³, Z⁴, Z⁵, y Z⁶ es independientemente N, NH, C o CH;

p es 1, 2, 3, o 4; y

- t es 1, 2, 3, 4, o 5;
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde p es 1.
3. El compuesto de la reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde t es 3 o 4.
4. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la fórmula II



en donde

M es CR³ o N;

M¹ es CR⁴;

X es O, S, S(O), o S(O)₂;

cada R¹ y R² es independientemente H, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₆-C₁₀ arilo, -OR^a, -SR^a, -NR^aR^b, -C(O)OR^a, o -C(O)NR^aR^b; o R¹ y R² tomados juntos con el carbón o carbonos a los que se unen, forman un C₃-C₆ cicloalquilo o un heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros; en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo y C₆-C₁₀ arilo se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, -OH, -CN, -OC₁-C₆ alquilo, -NH₂, -OC(O)C₁-C₆ alquilo, -OC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(O)NH(C₁-C₆

alquilo), -OC(O)NH₂, -OC(=N)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(=N)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(=N)NH₂, -OS(O)C₁-C₆ alquilo, -OS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)C₁-C₆ alquilo, -NHC(O)NH₂, -NHC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)OC₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OC₁-C₆ alquilo, -NHC(O)OH, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OH, -NHS(O)C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)NH₂, -NHS(O)₂NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH₂, -NHS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -C(O)C₁-C₆ alquilo, -CO₂H, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)NH₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, SC₁-C₆ alquilo, -S(O)C₁-C₆ alquilo, -S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)NH₂, -S(O)₂NH₂, -OS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)NH₂, -OS(O)₂NH₂, -P(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)(C₁-C₆ alquilo)₂, C₃-C₆ cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros;

R³, R⁴, y R⁵ son cada uno independientemente H, fluoro, cloro, bromo, C₁-C₆ alquilo, -OH, -CN, -OC₁-C₆ alquilo, -NHC₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)₂ o -CF₃;

R⁶ es H, C₁-C₆ alquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por halógeno, -OH, -CN, -OC₁-C₆ alquilo, -NH₂, -NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)₂, -CO₂H, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)NH₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, C₃-C₆ cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico de 5 a 7 miembros;

R⁷ y R⁸ se combinan para formar un C₃-C₇ cicloalquilo, un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo de 5 a 7 miembros; en donde cada átomo de hidrógeno en C₃-C₇ cicloalquilo, un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, C₆-C₁₀ arilo, o heteroarilo de 5 a 7 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio,

halógeno, -OH, -OC₁-C₆ alquilo, -OC(O)C₁-C₆ alquilo, -OC(O)NH₂, -OC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(=N)NH₂, -OC(=N)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(=N)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)C₁-C₆ alquilo, -OS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -OS(O)NH₂, -OS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)₂NH₂, -OS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -SH, -SC₁-C₆ alquilo, -S(O)C₁-C₆ alquilo, -S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -S(O)NH₂, -S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)₂NH₂, -S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NH₂, -NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)C₁-C₆ alquilo, -NHC(O)OH, -NHC(O)OC₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OH, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OC₁-C₆ alquilo, -NHC(O)NH₂, -NHC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)NH₂, -NHS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)₂NH₂, -NHS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -C(O)C₁-C₆ alquilo, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)NH₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)₂(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)NH₂, -P(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -P(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)₂NH₂, -P(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -P(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)OH, -P(O)OC₁-C₆ alquilo, -P(O)₂OH, -P(O)₂OC₁-C₆ alquilo, -CN, o -NO₂;


Y es O, S, NR⁹, o CR⁹R¹⁰;

R⁹ y R¹⁰ son cada uno independientemente H, deuterio, halógeno, o C₁-C₆ alquilo, en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo se sustituye opcionalmente por un halógeno, -OH, -OC₁-C₆ alquilo, -OC(O)C₁-C₆ alquilo, -OC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(O)NH₂, -OC(=N)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(=N)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(=N)NH₂, -OS(O)C₁-C₆ alquilo, -OS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -OS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)NH₂, -OS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)₂NH₂, -SH, -SC₁-C₆ alquilo, -S(O)C₁-C₆ alquilo, -S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)NH₂, -

S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)₂NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NH(C₁-C₆ alquilo), -NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)C₁-C₆ alquilo, -NHC(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OC₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OH, -NHC(O)OC₁-C₆ alquilo, NHC(O)OH, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH₂, -NHC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHC(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH₂, -NHS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH₂, -NHS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)₂NH₂, -C(O)C₁-C₆ alquilo, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -C(O)NH₂, -P(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)₂(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)OC₁-C₆ alquilo, o -P(O)₂OC₁-C₆ alquilo;

cada uno de Z^1 , Z^2 , Z^3 , Z^4 , Z^5 , y Z^6 es independientemente N, NH, C o CH; y n es 1, 2 o 3.

5. El compuesto de la reivindicación 1, que tiene la fórmula III




en donde

n es 2 o 3;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. El compuesto de la reivindicación 1, que tiene la fórmula IV o V



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

- 13.El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R¹ es H, y R² es C₁-C₆ alquilo; o


R¹ es C₁-C₆ alquilo, y R² es H; o R¹ es H o C₁-C₆ alquilo, y R² es H; o R¹ es H, y R² es C₃-C₇ cicloalquilo; o R¹ es C₃-C₇ cicloalquilo, y R² es H.


14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R⁷ y R⁸ se combinan para formar un cicloalquilo de 4, 5 o 6 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en el cicloalquilo de 4, 5 o 6 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, -OH, -CN, -OC₁-C₆ alquilo, -OC₁-C₆ alquilo(C₆-C₁₀ arilo), -NH₂, -OC(O)C₁-C₆ alquilo, -OC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(O)NH₂, -OC(=N)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(=N)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(=N)NH₂, -OS(O)C₁-C₆ alquilo, -OS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)C₁-C₆ alquilo, -NHC(O)NH₂, -NHC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)OC₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OC₁-C₆ alquilo, -NHC(O)OH, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OH, -NHS(O)C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)NH₂, -NHS(O)₂NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH₂, -NHS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -C(O)C₁-C₆ alquilo, -CO₂H, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)NH₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, SC₁-C₆ alquilo, -S(O)C₁-C₆ alquilo, -S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)NH₂, -S(O)₂NH₂, -OS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)NH₂, -OS(O)₂NH₂, -P(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)(C₁-C₆ alquilo)₂, C₃-C₆ cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros; o R⁷ y R⁸ se combinan para formar un heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en el heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, -OH, -CN, -OC₁-C₆ alquilo, -


OC₁-C₆ alquilo(C₆-C₁₀ arilo), -NH₂, -OC(O)C₁-C₆ alquilo, -OC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(O)NH₂, -OC(=N)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(=N)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(=N)NH₂, -OS(O)C₁-C₆ alquilo, -OS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)C₁-C₆ alquilo, -NHC(O)NH₂, -NHC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)OC₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OC₁-C₆ alquilo, -NHC(O)OH, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OH, -NHS(O)C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)NH₂, -NHS(O)₂NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH₂, -NHS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -C(O)C₁-C₆ alquilo, -CO₂H, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)NH₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, SC₁-C₆ alquilo, -S(O)C₁-C₆ alquilo, -S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)NH₂, -S(O)₂NH₂, -OS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)NH₂, -OS(O)₂NH₂, -P(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)(C₁-C₆ alquilo)₂, C₃-C₆ cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros.


15. El compuesto de la reivindicación 14, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R⁷ y R⁸ se combinan para formar un anillo tetrahidrofurano, anillo ciclobutano, anillo ciclopentano, o anillo ciclohexano.

16. El compuesto de la reivindicación 1, seleccionado del grupo que consiste en









en donde

M es CR³ o N;

M¹ es CR⁴;

X es O, S, S(O), o S(O)₂;

R¹ y R² son cada uno independientemente H, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₆-C₁₀ arilo, -OR^a, -SR^a, -NR^aR^b, -C(O)OR^a, o -C(O)NR^aR^b; en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo y C₆-C₁₀ arilo se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, -OH, -CN, -OC₁-C₆ alquilo, -OC₁-C₆ alquilo(C₆-C₁₀ arilo), -NH₂, -OC(O)C₁-C₆ alquilo, -OC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(O)NH₂, -OC(=N)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(=N)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(=N)NH₂, -OS(O)C₁-C₆ alquilo, -OS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)C₁-C₆ alquilo, -NHC(O)NH₂, -NHC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)OC₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OC₁-C₆ alquilo, -NHC(O)OH, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OH, -NHS(O)C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)NH₂, -NHS(O)₂NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH₂, -NHS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -C(O)C₁-C₆ alquilo, -CO₂H, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)NH₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, SC₁-C₆ alquilo, -S(O)C₁-C₆

alquilo, $-S(O)_2C_1-C_6$ alquilo, $-S(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-S(O)_2NH(C_1-C_6$ alquilo), $-S(O)N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-S(O)_2N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-S(O)NH_2$, $-S(O)_2NH_2$, $-OS(O)N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-OS(O)_2N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-OS(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-OS(O)_2NH(C_1-C_6$ alquilo), $-OS(O)NH_2$, $-OS(O)_2NH_2$, $-P(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-P(O)(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, C_3-C_6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros;

R^3 , R^4 , y R^5 son cada uno independientemente H, fluoro, cloro, bromo, C_1-C_6 alquilo, $-OH$, $-CN$, $-OC_1-C_6$ alquilo, $-NHC_1-C_6$ alquilo, $-N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$ o $-CF_3$;

R^6 es H, C_1-C_6 alquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros, en donde cada átomo de hidrógeno en C_1-C_6 alquilo o heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por halógeno, $-OH$, $-CN$, $-OC_1-C_6$ alquilo, $-NH_2$, $-NH(C_1-C_6$ alquilo), $-N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-CO_2H$, $-C(O)OC_1-C_6$ alquilo, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-C(O)N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, C_3-C_6 cicloalquilo, o heterocicloalquilo monocíclico de 5 a 7 miembros;


R^7 y R^8 se combinan para formar un C_3-C_7 cicloalquilo, un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, C_6-C_{10} arilo, o heteroarilo de 5 a 7 miembros; en donde cada átomo de hidrógeno en C_3-C_7 cicloalquilo, un heterocicloalquilo de 5 a 8 miembros, C_6-C_{10} arilo, o heteroarilo de 5 a 7 miembros se sustituye independiente y opcionalmente por deuterio, halógeno, $-OH$, $-OC_1-C_6$ alquilo, $-OC(O)C_1-C_6$ alquilo, $-OC(O)NH_2$, $-OC(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-OC(O)N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-OC(=N)NH_2$, $-OC(=N)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-OC(=N)N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-OS(O)C_1-C_6$ alquilo, $-OS(O)_2C_1-C_6$ alquilo, $-OS(O)NH_2$, $-OS(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-OS(O)N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-OS(O)_2NH_2$, $-OS(O)_2NH(C_1-C_6$ alquilo), $-OS(O)_2N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-SH$, $-SC_1-C_6$ alquilo, $-S(O)C_1-C_6$ alquilo, $-S(O)_2C_1-C_6$ alquilo, $-S(O)NH_2$, $-S(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-S(O)(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-S(O)_2NH_2$, $-S(O)_2NH(C_1-C_6$ alquilo), $-S(O)_2N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-NH_2$, $-NH(C_1-C_6$ alquilo), $-N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-NHC(O)C_1-C_6$ alquilo, $-N(C_1-C_6$ alquilo) $C(O)C_1-C_6$ alquilo, $-NHC(O)OH$, $-NHC(O)OC_1-C_6$ alquilo, $-N(C_1-C_6$ alquilo) $C(O)OH$, $-N(C_1-C_6$ alquilo) $C(O)OC_1-C_6$ alquilo, $-NHC(O)NH_2$, $-NHC(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-NHC(O)N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-N(C_1-C_6$ alquilo) $C(O)NH_2$, $-N(C_1-C_6$ alquilo) $C(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-N(C_1-C_6$ alquilo) $C(O)N(C_1-C_6$ alquilo) $_2$, $-NHS(O)C_1-C_6$ alquilo, $-N(C_1-C_6$ alquilo) $S(O)C_1-C_6$ alquilo, $-NHS(O)_2C_1-C_6$ alquilo, $-N(C_1-C_6$ alquilo) $S(O)_2C_1-C_6$ alquilo, $-NHS(O)NH_2$, $-NHS(O)NH(C_1-C_6$ alquilo), $-$


NHS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)₂NH₂, -NHS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -C(O)C₁-C₆ alquilo, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)NH₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)₂(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)NH₂, -P(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -P(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)₂NH₂, -P(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -P(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)OH, -P(O)OC₁-C₆ alquilo, -P(O)₂OH, -P(O)₂OC₁-C₆ alquilo, -CN, o -NO₂; Y es O, S, NR⁹, o CR⁹R¹⁰; y

R⁹ y R¹⁰ son cada uno independientemente H, deuterio, halógeno, o C₁-C₆ alquilo, en donde cada átomo de hidrógeno en C₁-C₆ alquilo se sustituye opcionalmente por un halógeno, -OH, -OC₁-C₆ alquilo, -OC(O)C₁-C₆ alquilo, -OC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(O)NH₂, -OC(=N)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OC(=N)NH(C₁-C₆ alquilo), -OC(=N)NH₂, -OS(O)C₁-C₆ alquilo, -OS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -OS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)NH₂, -OS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -OS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -OS(O)₂NH₂, -SH, -SC₁-C₆ alquilo, -S(O)C₁-C₆ alquilo, -S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)NH₂, -S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -S(O)₂NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NH(C₁-C₆ alquilo), -NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)C₁-C₆ alquilo, -NHC(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OC₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)OH, -NHC(O)OC₁-C₆ alquilo, -NHC(O)OH, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)C(O)NH₂, -NHC(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHC(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHC(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂C₁-C₆ alquilo, -NHS(O)₂C₁-C₆ alquilo, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)NH₂, -NHS(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)NH₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -N(C₁-C₆ alquilo)S(O)₂NH₂, -NHS(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -NHS(O)₂NH(C₁-C₆ alquilo), -NHS(O)₂NH₂, -C(O)C₁-C₆ alquilo, -C(O)OC₁-C₆ alquilo, -C(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -C(O)NH(C₁-C₆ alquilo),

-C(O)NH₂, -P(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)₂(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)₂N(C₁-C₆ alquilo)₂, -P(O)OC₁-C₆ alquilo, o -P(O)₂OC₁-C₆ alquilo.

17. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en





o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

18. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y opcionalmente al menos un diluyente, portador o excipiente.