



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Bogotá D.C., 28 de julio de 2020

Señores
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. NC2016/0004908
TÍTULO: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-FENIL-5-(2,6-DIALCOXIFENIL) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA”
SOLICITANTE: RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE
TRÁMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 2531 de 21 de febrero de 2020.

CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS, Abogada, mayor y vecina de Bogotá D.C., identificada con cédula de Ciudadanía No. 51.663.741, con Tarjeta Profesional No. 43.307 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la sociedad **RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE**, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 2531 de 21 de febrero de 2020.

1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE

TÍTULO

El Examinador objeto el Título de la Invención porque:

“El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2016/0004908 el 21 de febrero de 2017, tituló la invención como: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-FENIL-5-(2,6-DIALCOXIFENIL)PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-FENIL-5-(2,6-



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

DIALCOXIFENIL)PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE APELINA (APJ)”.

R/: El solicitante **de acuerdo con las observaciones del Examinador**, modifica el **Título de la Invención** como sigue:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-FENIL-5-(2,6-DIALCOXIFENIL)PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE APELINA (APJ)”

2. REIVINDICACIONES (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El Examinador objeto el capítulo reivindicatorio porque:

“La reivindicación 2 no es clara por que presenta un error tipográfico “R2 esalquilo C1-8” se siguiere realizar las correcciones pertinentes.”.

R/: El solicitante **de acuerdo con las observaciones del Examinador**, manifiesta lo siguiente:

Se corrige el error tipográfico de “R2 esalquilo C1-8” en la **Reivindicación 2**, por **“R2 es alquilo C1-8”**.

Por lo expresado anteriormente, el solicitante considera que se corrigió el error tipográfico mencionado, que supera la objeción a las reivindicaciones. Por lo cual el solicitante pone a consideración del Examinador Técnico de Patentes un **NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO** el cual consta de trece **(13) nuevas reivindicaciones** en once folios.

3. ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad (Art. 16 D486)

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIP – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

El Examinador objeto la **novedad** de las Reivindicaciones 1 - 13 con el documento **D7 (US2007213302)** porque:

“De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de formula (I) de la reivindicación 1 ya habían sido divulgadas previamente en el documento D7 que divulga pirazoles útiles como antagonistas del receptor cannabinoide (resumen).”.

“Adicionalmente, el documento D7 menciona composiciones farmacéuticas que los contienen para su uso en el tratamiento de obesidad, diabetes y desordenes cardiometabólicos (resumen).”.

“Las reivindicaciones dependientes 1 a 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad.”.

R/: Nuestro poderdante se permite manifestar en cuanto a las objeciones de **falta de novedad de la invención** por parte del Examinador, lo siguiente:

El solicitante toma nota, con agradecimiento, de que las objeciones por falta de Novedad previamente planteadas, en vista de los documentos del estado de la técnica anteriormente considerados relevantes **D4, D5 y D6**, han sido superadas mediante la contestación al anterior oficio, presentada el 23 de diciembre de 2019, y la presentación de una enmienda voluntaria, presentada el pasado 4 de febrero de 2020.

Sin embargo, tras haber defendido la invención en un total de cuatro oficios previos al presente oficio, ahora, en un nuevo oficio, el Examinador **ha citado un nuevo documento del estado de la técnica, no citado ni considerado hasta este momento**, concretamente, documento **D7 (US2007213302)**. Es decir, el solicitante es la primera vez que tiene ocasión de defender su invención frente a este documento. Por lo tanto, si, a pesar de que el documento claramente no afecta a la Novedad de la presente invención, tal y como se expondrá y explicará en lo siguiente, el Examinador



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

todavía tuviera dudas, se ruega que se proporcione al solicitante una nueva oportunidad para expresarse al respecto, bien telefónicamente o mediante la emisión de un nuevo oficio. Consideramos que sería injusto que, tras una tramitación a lo largo de un elevado número de oficios, el solicitante tuviera ocasión de pronunciarse una sola vez con respecto a este último documento, citado *in extremis*.

Nos permitimos hacer notar que el documento **D7**, no solamente no había sido citado anteriormente en la presente tramitación, sino que de hecho no ha sido citado en ninguna otra de entre las solicitudes de patente paralelas, es decir, en otras jurisdicciones para la misma invención, lo cual es un claro reflejo de que no se trata de un documento relevante para determinar la patentabilidad de la invención, ni la novedad ni la actividad inventiva. Para esta invención se han presentado solicitudes en numerosas jurisdicciones, al menos en Australia, Canadá, China, Europa, Japón, Corea, México, Perú, Rusia, Estados Unidos Sudáfrica. En ninguna de ellas se ha considerado que el documento **D7** debiera ser considerado como estado de la técnica relevante. Se hace notar asimismo que hasta el momento se han **concedido patentes** para esta invención en al menos **Australia, Estados Unidos y Sudáfrica**.

NOVEDAD

En el apartado 4.1 **Novedad** del Oficio emitido con fecha 21 de febrero de 2020, el Examinador realiza una comparación, en una Tabla, de lo reivindicado según la presente invención (primera columna), con **la supuesta divulgación** realizada por el documento **D7** (columna 2).



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

No obstante, se hace notar que el Examinador **no ha tenido en cuenta la divulgación global** del documento **D7**, sino únicamente una parte de la **divulgación** realizada por el documento **D7**, ignorando por completo una serie de limitaciones adicionales que deben aplicarse a la fórmula Markush descrita y reivindicada, es decir, limitaciones que son también parte de la

provided that at least one of the following is satisfied:

- (a) at least one of X, Y, X', and Y' is other than H, halogen, C₁₋₆ alkyl, NO₂, —CN, CF₃, OR, and phenyl;
- (b) R' is selected from CH(A)-(CH₂)_mCO₂R, CH(A)-(CH₂)_mCONH₂, CH(A)-(CH₂)_mC(NH)NH₂, (CH₂)_m-phenyl-(CH₂)_mCO₂R, (CH₂)_m-pyridyl-(CH₂)_mCO₂R, (CH₂)_m-phenyl-(CH₂)_mCONH₂, (CH₂)_m-pyridyl-(CH₂)_mCONH₂, (CH₂)_m-phenyl-(CH₂)_mC(NH)NH₂, (CH₂)_m-pyridyl-(CH₂)_mC(NH)NH₂, (CH₂)_m-phenyl-(CH₂)_m-tetrazole, and (CH₂)_m-pyridyl-(CH₂)_m-tetrazole;
- (c) Z is present and is other than H, C₁₋₆ alkyl, aryl, NR₂, and OR;
- (d) Q is present and is CQ' where Q' is other than H; and/or
- (e) V is other than H, —CN, CF₃, C₂₋₆ alkenyl, aryl, and C₁₋₆ alkyl.

Reivindicación 1 del documento **D7** citado en el Oficio:

Párrafo cuya traducción al español sería:

“con la condición de que se cumpla al menos uno de lo siguiente:

- (a) al menos uno de X, Y, X', e Y' es distinta de H, halógeno, alquilo C1-6, NO₂, -CN, CF₃, OR, y fenilo;*
- (b) R' se selecciona de CH(A)-(CH₂)_mCO₂R, CH(A)-(CH₂)_mCONH₂, CH(A)-(CH₂)_mC(NH)NH₂, (CH₂)_m-phenyl-(CH₂)_mCO₂R, (CH₂)_m-pyridyl-(CH₂)_mCO₂R, (CH₂)_m-phenyl-(CH₂)_mCONH₂, (CH₂)_m-pyridyl-(CH₂)_mCONH₂, (CH₂)_m-phenyl-(CH₂)_mC(NH)NH₂, (CH₂)_m-pyridyl-*



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

(CH₂)_m(CN)NH₂, (CH₂)_m-phenyl-(CH₂)_m-tetrazole, and (CH₂)_m-pyridyl-(CH₂)_m-tetrazole;

c) Z is present and €s other than H, C1-6 alkyl, aryl, NR₂, and OR;

(d) Q is present and is CQ' where Q' is other than H; and/or

€ V is other than H, —CN, CF₃, C2-6 alkenyl, aryl, and C1-6 alkyl.”

Nótese que es condición *sine qua non* que **se cumpla al menos una de las condiciones (a) a (e) arriba listadas.**

Cuando la referencia citada se lee correctamente, es decir, de manera completa, incluyendo el lenguaje de condición arriba referido, la referencia citada **ya no describe compuestos comparables a la presente solicitud.** Por el contrario, la **presente solicitud proporciona compuestos que no cumplen el lenguaje de la condición.** El Examinador no debe, al leer la referencia citada, excluir partes relevantes de la divulgación a su libre albedrío y por conveniencia para atacar la presente solicitud, es decir, leer la referencia **sin tener en cuenta dicha condición necesaria.** El documento **D7** citado debe leerse en su totalidad, y las porciones no pueden leerse separadas unas de otras, sino que ha de considerarse el documento completo como divulgación.

En la citada Tabla del apartado 4.1 **Novedad** del Oficio, el Examinador omite, por lo tanto, parte de las limitaciones incluidas en la Reivindicación 1 del documento **D7**. Si se tiene en cuenta debidamente la divulgación completa de la Reivindicación 1, el documento **D7 no afecta a la Novedad** de la presente invención.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Las reivindicaciones de la presente invención requieren que los compuestos cumplan al menos todas y cada una de las siguientes condiciones:

n no puede ser cero;

el primer A está sustituido en posición orto con respecto al punto de enlace del pirazol;

los valores de R2 son dependientes del valor de n;

en el grupo –C(O)-NH-C(R4)(R5)(R6), R6 es necesariamente H.

Lo anterior requeriría que en el grupo -NR'R'' del documento **D7**, R'' fuera H, y entonces, el documento **D7** debería permitir que R' proporcionara el átomo carbono en negrita y subrayado en el grupo arriba indicado: –C(O)-NH-**C**(R4)(R5)(R6), y que dicho átomo de carbono tuviera a su vez dos sustituyentes, concretamente R4 y R5 en la presente invención. Es decir, -NH-CH-(R4)(R5). Por último, los valores para dichos sustituyentes dentro de R' tendrían que cumplir los requisitos de las reivindicaciones de la presente invención para ambos R4 **y** R5, **simultáneamente**. Este no es el caso, por lo que la invención es **NUEVA** frente a la divulgación del documento **D7**.

Adicionalmente a lo anterior, se hace notar que la divulgación del documento **D7** es enormemente amplia. Sin embargo, los ejemplos no hacen plausible que todos los compuestos abarcados hayan sido preparados, ni siquiera puedan ser preparados, en base a lo divulgado en el documento **D7**. Aún menos, se demuestra que dichos compuestos tengan actividad. Por lo tanto,



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

el documento **D7** no proporciona en absoluto una divulgación habilitante (“enabling disclosure” en su término anglosajón).

Se hace notar asimismo que los ejemplos concretos dados en las Reivindicaciones se apartan de los compuestos dentro del alcance de la

presente solicitud, prueba adicional de todo lo anteriormente indicado.

Por lo tanto, el solicitante respetuosamente indica que **la invención definida en la presente solicitud de patente cumple el requisito de NOVEDAD.**

NIVEL INVENTIVO

Además de lo indicado en el anterior apartado de Novedad, los compuestos del documento **D7** se describen en relación con el receptor canabinoide como diana farmacológica. Los compuestos provistos de una afinidad para el receptor de los cannabinoides tienen una utilidad para el tratamiento de la obesidad, la diabetes, y/o desórdenes cardiometabólicos.

Los **compuestos de la presente invención** se ha demostrado que **son agonistas del receptor de apelina**, pudiendo usarse para tratar un trastorno relacionado con dicho receptor, tal como por ejemplo el asma, la aterosclerosis, el cáncer, la cardiomiopatía, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, la inflamación, la enfermedad hepática, el trastorno metabólico, la enfermedad neurodegenerativa, la obesidad o la preeclampsia. El documento **D7 no se dirige al receptor de apelina**, ni sugiere qué modificaciones de la fórmula divulgada pudiera tener actividad sobre el receptor de apelina. Es decir, no hay ninguna indicación que motive a un



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

experto medio en la materia a aplicar determinadas modificaciones, a diversos sustituyentes, en la fórmula general divulgada en el documento **D7**, con el fin de llegar a los compuestos de la presente solicitud de patente, y así lograr actividad sobre el receptor de apelina. Por lo tanto, es inesperado que **los compuestos de la presente invención presenten dicha actividad**, y por lo tanto la **presente invención es también tiene NIVEL INVENTIVO** en vista del documento **D7**.

Por lo anteriormente mencionado, consideramos que con las **Reivindicaciones 1 a 13 modificadas**, el documento **D7** del estado de la técnica, mencionado por el Examinador, **no describe, ni revela, ni enseña las características técnicas de los Compuestos de la presente invención** de nuestro poderdante. Por lo tanto, la invención es **NOVEDOSA**, tiene **NIVEL INVENTIVO y APLICACIÓN INDUSTRIAL**, es decir cumple con los requisitos de exigidos por la Decisión 486 del Acuerdo de la Comisión de la Comunidad Andina; además, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 2531 de 21 de febrero de 2020.

Finalmente, solicito respetuosamente se proceda a **CONCEDER** la Patente de Invención titulada: **“COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-FENIL-5-(2,6-DIALCOXIFENIL) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE APELINA (APJ)”**.” a nombre de la sociedad **RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE**, para las nuevas Reivindicaciones 1 a 13 inclusive.



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Atentamente,


A handwritten signature in dark ink that reads 'Clemencia Delgado V.' in a cursive script.

CLEMENCIA DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 51.663.741 de Bogotá
T.P. No. 43.307 C.S.J.

Anexo: Nuevas Reivindicaciones (13) en once folios.

REIVINDICACIONES


1. Un compuesto representado por la Fórmula I:



o una sal farmacéuticamente aceptable,

en la que

R₁ se representa por la fórmula:



cada A es independientemente alcoxi C₁₋₈, -alcoxi C₁₋₈ (arilo C₅₋₁₂), halógeno o -O(CH₂)_xCO₂R₇;

n es 1, 2 o 4;

donde el primer A está sustituido en posición orto con respecto al punto de enlace del grupo pirazol;

cada x es independientemente 1, 2, 3, o 4;

cuando n es 4, R₂ es alquilo C₁₋₈ que puede estar sin sustituir o sustituido con uno o dos grupos alquilo C₁₋₈;

cuando n es 1 o 2, R₂ es arilo C₆ sustituido, alquilo C₁₋₈ sustituido, -alquilo C₃₋₈ sin sustituir, -alquil C₂₋₈ (arilo C₅₋₁₂) que puede estar sustituido o sin sustituir, -alquil C₂₋₈ (cicloalquilo C₃₋₈) que puede estar sustituido o sin sustituir, o cicloalquilo C₃₋₈ que puede estar sustituido o sin sustituir; donde sustituido se refiere a la sustitución con uno o dos grupos seleccionados de alquilo C₁₋₈, halógeno, haloalquilo C₁₋₈, alcoxi C₁₋₈, hidroxilo, carbonilo, CO₂R₉, arilo C₅₋₁₂, heteroarilo de 5 a 10 miembros, cicloalquilo C₃₋₈, alquilo C₁₋₈ (arilo C₅₋₁₂), alquilo C₁₋₈ (heteroarilo de 5 a 10 miembros), alquilo C₁₋₈ (cicloalquilo C₃₋₈), NO₂, N₃, NH₂, N(CH₃)₂, SO₍₁₋₃₎H, o SH;

R₃ está ausente;

R₄ es alquilo C₂₋₈, alquenilo C₂₋₈, cicloalquilo C₃₋₈, -alquil C₂₋₈ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₈ (cicloalquilo C₃₋₈), -alquil C₁₋₈ (heteroarilo de 5 a 7 miembros), o -(CH₂)_xNR₇R₈;

R₅ es arilo C₅₋₁₂, -alquil C₁₋₈ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₈ (cicloalquilo C₃₋₈), -alquil C₁₋₈ (heteroarilo de 5 a 7 miembros), cicloalquilo C₃₋₈, -(CH₂)_xNR₇R₈,

-(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉,

-(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇,

-(CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉ o -CONR₇R₈;

R₆ es H;

R₇ y R₈ son independientemente arilo C₅₋₁₂, alquilo C₁₋₈, cicloalquilo C₃₋₈, hidroxilo, o H; o

R₇ y R₈ juntos hacen un anillo de 3-8 miembros, que puede o no contener uno, dos, tres, o cuatro heteroátomos seleccionados de O, N o S;

R₉ es alcoxi C₁₋₈, alquilo C₁₋₈, H o hidroxilo;

cada y es independientemente 1, 2 o 3;

Z es O, donde la línea punteada representada hacia Z es un enlace doble.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que

n es 4;

cada A es independientemente alcoxi C₁₋₄, -alcoxi C₁₋₄ (arilo C₅₋₁₂) o halógeno;

R₂ es alquilo C₁₋₈;

R₄ es alquilo C₂₋₈, -alquil C₂₋₈ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₈ (cicloalquilo C₃₋₈) o

-(CH₂)_xNR₇R₈;

R₅ es -(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇, -(CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉, o -CONR₇R₈;

R₆ es H;

R₉ es alquilo C₁₋₈, o H;

cada x es independientemente 1, 2, 3 o 4;

cada y es independientemente 1, 2 o 3; y

Z es =O.

3. El compuesto de la reivindicación 2, en el que
- n es 4;
- cada A es independientemente alcoxi C₁, -alcoxi C₁ (arilo C₅₋₁₂) o halógeno;
- R₂ es alquilo C₄;
- R₄ es alquilo C₂₋₄, -alquil C₂₋₈ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₈ (cicloalquilo C₃₋₈) o -
(CH₂)_xNR₇R₈;
- R₅ es -(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉, -
(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇, -
(CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉, o -CONR₇R₈;
- R₆ es H;
- R₈ es alquilo C₁₋₄ o H;
- R₉ es alquilo C₁₋₈, o H;
- cada x es independientemente 1, 2, 3 o 4;
- cada y es independientemente 1, 2 o 3; y
- Z es =O.
4. El compuesto de la reivindicación 3, en el que
- n es 4;
- cada A es independientemente alcoxi C₁, -alcoxi C₁ (arilo C₅₋₁₂) o flúor;
- R₂ es alquilo C₄;
- R₄ es alquilo C₂₋₄, -alquil C₂₋₄ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₄ (cicloalquilo C₅₋₈) o -
(CH₂)_xNR₇R₈;
- R₅ es -(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉, -
(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇, -
(CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉, o -CONR₇R₈;
- R₆ es H;
- R₈ es alquilo C₁₋₄ o H;
- R₉ es alquilo C₁₋₈, o H;
- cada x es independientemente 1, 2, 3 o 4; y
- cada y es independientemente 1, 2 o 3.

5. El compuesto de la reivindicación 4, en el que
- n es 4;
 - cada A es independientemente alcoxi C₁, -alcoxi C₁ (arilo C₅₋₁₂) o flúor;
 - R₂ es alquilo C₄;
 - R₄ es alquilo C₂₋₄, -alquil C₂₋₄ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₄ (cicloalquilo C₅₋₈) o - (CH₂)_xNR₇R₈;
 - R₅ es -(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉, - (CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇, - (CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉, o -CONR₇R₈;
 - R₆ es H;
 - R₈ es H;
 - R₉ es alquilo C₁₋₈, o H;
 - cada x es independientemente 1, 2, 3 o 4; y
 - cada y es independientemente 1, 2 o 3.
6. El compuesto de la reivindicación 1, en el que
- n es 2;
 - cada A es independientemente alcoxi C₁₋₄, o -alcoxi C₁₋₄ (arilo C₅₋₁₂);
 - R₂ es arilo C₆ sustituido, alquilo C₃₋₈ o cicloalquilo C₃₋₈;
 - R₄ es alquilo C₂₋₈, -alquil C₂₋₈ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₈ (cicloalquilo C₃₋₈) o - (CH₂)_xNR₇R₈;
 - R₅ es -(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉, - (CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇, - (CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉, o -CONR₇R₈;
 - R₆ es H;
 - R₉ es alquilo C₁₋₈, o H;
 - cada x es independientemente 1, 2, 3 o 4;
 - cada y es independientemente 1, 2 o 3; y
 - Z es =O.

7. El compuesto de la reivindicación 6, en el que
- n es 2;
- cada A es independientemente alcoxi C₁, o -alcoxi C₁ (arilo C₅₋₁₂);
- R₂ es arilo C₆ sustituido, alquilo C₄ o cicloalquilo C₆;
- R₄ es alquilo C₂₋₈, -alquil C₂₋₈ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₈ (cicloalquilo C₃₋₈) o -
(CH₂)_xNR₇R₈;
- R₅ es -(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉, -
(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇, -
(CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉, o -CONR₇R₈;
- R₆ es H;
- R₈ es alquilo C₁₋₄ o H;
- R₉ es alquilo C₁₋₈, o H;
- cada x es independientemente 1, 2, 3 o 4;
- cada y es independientemente 1, 2 o 3; y
- Z es =O.
8. El compuesto de la reivindicación 7, en el que
- n es 2;
- cada A es independientemente alcoxi C₁, o -alcoxi C₁ (arilo C₅₋₁₂);
- R₂ es arilo C₆ sustituido, alquilo C₄ o cicloalquilo C₆;
- R₄ es alquilo C₂₋₄, -alquil C₂₋₄ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₄ (cicloalquilo C₅₋₈) o -
(CH₂)_xNR₇R₈;
- R₅ es -(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉, -
(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇, -
(CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉, o -CONR₇R₈;
- R₆ es H;
- R₈ es alquilo C₁₋₄ o H;
- R₉ es alquilo C₁₋₈, o H;
- cada x es independientemente 1, 2, 3 o 4;
- cada y es independientemente 1, 2 o 3; y
- Z es =O.

9. El compuesto de la reivindicación 8, en el que
- n es 2;
 - cada A es independientemente alcoxi C₁, -alcoxi C₁ (arilo C₅₋₁₂);
 - R₂ es arilo C₆ sustituido, alquilo C₄ o cicloalquilo C₆;
 - R₄ es alquilo C₂₋₄, -alquil C₂₋₄ (arilo C₅₋₁₂), -alquil C₁₋₄ (cicloalquilo C₅₋₈) o - (CH₂)_xNR₇R₈;
 - R₅ es -(CH₂)_xNHCO₂R₇, -(CH₂)_xCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCO₂R₉, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yCONR₇R₈, -(CH₂)_xCONR₇(CH₂)_yR₉, -(CH₂)_xCOR₇, -(CH₂)_xCO₂R₇, -CHR₇COR₉, -CHR₇CONHCHR₈COR₉, or -CONR₇R₈;
 - R₆ es H;
 - R₈ es H;
 - R₉ es alquilo C₁₋₈, o H;
 - cada x es independientemente 1, 2, 3 o 4;
 - cada y es independientemente 1, 2 o 3; y
 - Z es =O.
10. El compuesto de la reivindicación 1, en el que R₅ es -alquil C₁₋₈ (heteroarilo de 5 a 7 miembros) y el -alquil C₁₋₈ (heteroarilo de 5 a 7 miembros) es un -alquil C₁₋₈ (tetrazol).
11. Un compuesto seleccionado de:
- ácido (2S)-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-4-metilpentanoico
 - ácido (3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanoico
 - (3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamida
 - ácido (3R)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanoico
 - ácido 2-(2-ciclohexil-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]acetamido)acético
 - ácido (2S-2-ciclohexil-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]acético

ácido 2-[(3S)-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamido]acético

ácido (3S)-3-{{1-ciclohexil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanoico

ácido 2-[(3S)-3-{{1-ciclohexil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamido]acético

ácido (3S)-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-metilhexanoico

ácido (3S)-3-{{1-(4-fluorofenil)-5-[2-metoxi-6-(2-metoxi-2-oxoetoxi)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanoico

ácido 2-ciclohexil-2-{{1-ciclohexil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}acético

ácido (3S)-3-{{1-(ciclohexilmetil)-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanoico

acetato de metil 2-[(3S)-3-{{1-ciclohexil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamido]

ácido (3S)-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanoico

ácido (3S)-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil]-ciclohexil-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanoico

acetato de metil 2-[(3S)-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil]-ciclohexil-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamido]

ácido 2-[(3S)-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil]-1-ciclohexil-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamido]acético

acetato de metil 2-[(3S)-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamido]

(3S)-N-bencil-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil]-ciclohexil-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamida

(3S)-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil]-1-ciclohexil-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-butil-5-metilhexanamida

(3S)-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil]-1-ciclohexil-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-metil-N-(1,3-oxazol-2-ilmetil)hexanamida

(3S)-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil]-ciclohexil-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-[(dimetilcarbamoil)metil]-5-metilhexanamida

acetato de metil 2-[(3S)-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamido]

propanoato de etil 3-[(3S)-3-{{5-[2-(benciloxi)-6-metoxifenil]-ciclohexil-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metilhexanamido]

(3S)-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-metil-N-(1,3-oxazol-2-ilmetil)hexanamida

(3S)-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-N,5-dimetilhexanamida

(3S)-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-N-(2-hidroxi-etil)-5-metilhexanamida

(3S)-N-butil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamida

(3R)-N-butil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamida

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-hexil-5-metilhexanamida

(3S)-N-(ciclohexilmetil)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamida

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metil-N-pentilhexanamida

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metil-N-propilhexanamida

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-etil-5-metilhexanamida

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metil-N-(propan-2-il)hexanamida

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(4-fluorofenil)-5-metilhexanamida

metil (3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanoato

ácido (3S)-3-[[5-(3,5-difluoro-2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanoico

(3S)-N-butil-3-[[5-(3,5-difluoro-2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamida

ácido (2S)-2-ciclohexil-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]acético

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N,5-dimetil-N-propilhexanamida

(3S)-N-ciclopropil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamida

(3S)-N-ciclobutil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamida

ácido 2-[(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamido]acético

(3S)-N-(carbamoilmetil)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamida

(3S)-3-[[5-(2,6-[[dimetoxifenil]-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metil-N-(metilcarbamoil)metil]hexanamida

ácido (3S)-3-[[1-(ciclopropilmetil)-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanoico

ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanoico

acetato de metil 2-[(3S)-3-[[1-(ciclopropilmetil)-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-metilhexanamido]

acetato de metil 2-[(3S)-3-{[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-metilhexanamido]

(3S)-N-ciclopentil-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-metilhexanamida

acetato de metil 2-[(3S)-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-propil-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-metilhexanamido]

acetato de metil 2-[(3S)-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2,2-dimetilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-metilhexanamido]

acetato de metil 2-[(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-4-metilpentanamido]

acetato de metil 2-[(2S)-2-{[1-ciclohexil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-metilpentanamido]

propanoato de etil 2-[(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-4-metilpentanamido]

acetato de metil 2-[(2S)-3-ciclohexil-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}propanamido]

ácido (2S)-3-ciclohexil-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}propanoico

acetato de metil 2-[(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-3-fenilpropanamido]

acetato de metil 2-[(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}hexanamido]

acetato de metil 2-[(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-4-fenilbutanamido]

ácido (3S)-5-ciclohexil-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico

acetato de metil 2-[(3S)-5-ciclohexil-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanamido]

acetato de metil 2-[(2S)-3-ciclohexil-2-{[5-(2,5-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}propanamido]

acetato de metil 2-[(3S)-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-N,5-dimetilhexanamido]

acetato de metil 2-[(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-N,4-dimetilpentanamido]

ácido 2-[(3S)-5-ciclohexil-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanamido]acético

(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-4-fenil-N-propilbutanamida

5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-N-[(2S)-1-oxo-4-fenil-1-(pirrolidin-1-yl)butan-2-yl]-1H-pirazol-3-carboxamida

acetato de metil 2-[(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-N-metil-4-fenilbutanamido]

(2S)-2-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-N-(2-metoxietil)-4-fenilbutanamida

(3S)-N-ciclobutil-5-ciclohexil-5-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]pentanamida

(3S)-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]pentanamida

(3S)-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-hidroxibutil)pentanamida

(2S)-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-hidroxibutil)-4-fenilbutanamida

(2S)-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-oxobutil)-4-fenilbutanamida

(3S)-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-oxobutil)pentanamida

acetato de metil 2-[(3S)-3-{1-[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]-N-5-metilhexanamido}]

(3S)-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-metoxietil)pentanamida

acetato de metil 2-[(3S)-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-metilpentanamido]

(2S)-N-ciclobutil-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-4-fenilbutanamida

acetato de metil 2-[(3S)-6-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]hexanamido]

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-hidroxibutil)-5-(piperidin-1-il)pentanamida

(3S)-N-ciclobutil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida

(3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-metoxietil)-5-(piperidin-1-il)pentanamida

ácido (3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanoico

ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil]-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanoico

(3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil]-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida

(2S)-4-ciclohexil-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-metoxietil)-N-metilbutanamida

ácido (3R)-3-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]propanoico

acetato de metil 2-(3-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]propanamido]

(3S)-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-[(2R)-2-hidroxibutil]pentanamida

(3R)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil]-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]pent-4-enamida; o

N-[(2S)-4-ciclohexil-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butan-2-il]-5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-carboxamida,

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

12. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

13. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 11 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.