



REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de la fórmula general (I):



en donde


R¹ representa un grupo de la fórmula



en donde

#¹ representa el punto de unión al átomo de nitrógeno,

Ar representa un grupo de la fórmula



en donde

#² representa el punto de unión al átomo de nitrógeno,


R^{2A} representa un grupo que se selecciona de un átomo de cloro, un átomo de bromo, trifluorometilo, trifluorometoxi, etoxycarbonilo y C(=O)NH₂,

R^{2B} representa un grupo que se selecciona de un átomo de cloro, trifluorometilo, y etoxycarbonilo,

o una sal, hidrato y/o solvato farmacéuticamente aceptables de esta.

2. Un compuesto de fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1, en donde


R¹ representa un grupo de la fórmula



en donde

#¹ representa el punto de unión al átomo de nitrógeno,

Ar representa un grupo de la fórmula



en donde


#² representa el punto de unión al átomo de nitrógeno,

R^{2A} representa un grupo que se selecciona de un átomo de cloro, un átomo de bromo, trifluorometilo, trifluorometoxi, etoxycarbonilo y C(=O)NH₂,

o una sal, hidrato y/o solvato farmacéuticamente aceptables de esta.

3. Un compuesto de fórmula general (I) de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde


R¹ representa un grupo de la fórmula



en donde

#¹ representa el punto de unión al átomo de nitrógeno,

Ar representa un grupo de la fórmula




en donde

#² representa el punto de unión al átomo de nitrógeno,

R^{2A} representa un grupo que se selecciona de un átomo de cloro, trifluorometilo, y trifluorometoxi,


o una sal, hidrato y/o solvato farmacéuticamente aceptables de esta.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho compuesto es 3-({3-(4-clorofenil)-5-oxo-4-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il} metil)-1-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida de la siguiente fórmula




o una sal, hidrato y/o solvato farmacéuticamente aceptable de esta.

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 4, en donde dicho compuesto es 3-({3-(4-clorofenil)-5-oxo-4-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il} metil)-1-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]-1H-1,2,4-triazol-5-carboxamida de la siguiente fórmula



6. Un método para preparar un compuesto de fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de 1 a 5, dicho método comprende el paso de


[A] de permitir un compuesto intermedio de fórmula (II):



en donde R¹ es como se define para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,

R³ representa un grupo alquilo-(C₁-C₄), en particular un grupo metilo,


para reaccionar en un primer paso en presencia de una base y opcionalmente una sal de cobre, con un compuesto de fórmula general (III):



donde


R^4 representa un grupo alquilo-(C_1 - C_4), en particular un grupo metilo,

para proporcionar un compuesto intermedio, que luego se deja reaccionar en presencia de una base, en un segundo paso con un compuesto de hidrazina de la fórmula general (IV) o una respectiva sal de este



en donde Ar es como se define para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,

proporcionando así un compuesto de la fórmula general (V):




en donde R^1 y Ar son como se define para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, y

R^4 representa un grupo alquilo-(C_1 - C_4), en particular un grupo metilo,

seguido por un paso posterior


[B] de permitir que el compuesto de fórmula (V) obtenido en el paso [A] reaccione con amoníaco proporcionando así un compuesto de la fórmula general (I):




en donde R^1 y Ar son como se define para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, y

opcionalmente seguido por el paso

[C] conversión de los alcoholes de la fórmula general (I-A):



en donde Ar es como se define para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, a las cetonas de la fórmula general (I-B):



en donde Ar es como se define para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,

usando métodos de oxidación conocidos,

cada [A], [B] y [C] opcionalmente seguidos, si corresponde, por (i) separar los compuestos de fórmula (I) así obtenidos en sus respectivos enantiómeros, y/o (ii) convertir los compuestos de fórmula (I) en sus respectivos hidratos, solvatos, sales y/o hidratos o solvatos de las sales por el tratamiento con los correspondientes solventes y/o ácidos o bases.

7. Composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
8. Composición farmacéutica de la reivindicación 7 que comprende un primer ingrediente activo, en particular compuestos de fórmula general (I) de acuerdo con cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y un ingrediente activo adicional, en particular un agente terapéutico adicional que se selecciona del grupo que consiste en diuréticos, antagonistas de angiotensina AII, inhibidores de ACE, bloqueadores del receptor beta, antagonistas del receptor mineralocorticoide, antidiabéticos, nitratos orgánicos y donantes de NO, activadores y estimuladores de la guanilato ciclasa soluble (sGC), agentes antiinflamatorios, agentes inmunosupresores, aglutinantes de fosfato y/o compuestos que modulan el metabolismo de vitamina D.