REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica en forma de polvo para suspensión caracterizada porque comprende:

a) el compuesto de fórmula I en cantidades entre 30.0 y 50.0 mg



I

b) Polivinilpirrolidona (Kollidon K-30) en cantidades entre 40.00 y 60.00 mg

c) Crospovidona (Kollidon CL-M) en cantidades entre 130 y 135 mg

d) Óxido de magnesio pesado en cantidades entre 200.00 y 250.00 mg

e) Sacarina Sódica entre 14.00 y 18.00 mg

f) Menta Sabor Polvo entre 10.00 y 15.00 mg

g) Fresa Sabor Polvo entre 17.00 y 23.00 mg; y

h) Sacarosa entre 1150.00 y 1200.00 mg.

2. Una composición farmacéutica en forma de tabletas caracterizada porque comprende:

a) Compuesto de Fórmula I en cantidades entre 30.0 y 50.0 mg

b) Almidón de maíz entre 20.00 y 25.00 mg

c) Polivinilpirrolidona K-25 entre 2.5 y 5.00 mg

d) Lactosa monohidratada entre 47 y 53.50 mg

e) Estearato de magnesio entre 1.00 y 2.00 mg

f) Dióxido de silicio coloidal entre 0.50 y 2.00 mg

g) Etanol entre 10 y 15 µL

h) y agua desionizada entre 10.00 y 15.00 µL.

3. Una composición farmacéutica en forma inyectable caracterizada porque comprende:

a) Compuesto de fórmula I en cantidad de 5.0 mg/mL

b) Cremophor ELP 527.0 mg/mL

c) Ácido clorhídrico 1N c.s.p
d) Alcohol deshidratado c.s.p 1.0 mL; y
e) Nitrógeno.

4. Una composición farmacéutica en forma de tabletas caracterizada porque comprende:
a) Al compuesto de fórmula I en cantidades entre 15.00 y 25.00 mg
b) 3-etoxicarbonil-2-metil-4-(2-nitrofenil)-4,11-dihidro-1H-pirido[2,3-b][1,5] benzodiacepina en forma de racemato o en forma de su enantiómero dextrógiro o levógiro en cantidades entre 15.00 y 25.00 mg
c) Almidón de maíz entre 18 y 28 mg
d) Polivinilpirrolidona K-25 entre 2.0 y 6.0 mg
e) Lactosa monohidratada entre 45 y 55 mg
f) Estearato de magnesio entre 0.5 y 2.0 mg
g) Dióxido de silicio coloidal entre 0.5 y 2.0 mg
h) Etanol clase C entre 10.00 y 15.00 µL
i) Agua desionizada entre 10.00 y 15.00 µL.

5. Una composición farmacéutica en forma de gotas orales caracterizada porque cada mL comprende:
a) Al compuesto de fórmula I en cantidades entre 15.00 y 25.00 mg
b) 3-etoxicarbonil-2-metil-4-(2-nitrofenil)-4,11-dihidro-1H-pirido[2,3-b][1,5] benzodiacepina en forma de racemato o en forma de su enantiómero dextrógiro o levógiro en cantidades entre 15.00 y 25.00 mg
c) Propilenglicol entre 275.00 y 315.00 mg
d) Kollidon 25 entre 125.00 y 175.00 mg
e) Sacarina sódica entre 10.0 y 15.0 mg
f) Rojo Ponceaux 0.05 mg
g) Ácido Cítrico entre 5.0 y 6.0 mg
h) Sodio citrato dihidratado entre 15.0 y 25.0 mg
i) Alcohol etílico entre 50.0 y 150 mg
j) Metilparabeno 1.8 mg
k) Propilparabeno 0.2 mg
l) Fresa sabor líquida (soluble) entre 17.0 y 23.0 mg
m) Agua purificada c.s.p 1.0 mL

6. Una composición farmacéutica en forma inyectable caracterizada porque cada mL comprende:
a) Al compuesto de fórmula I en cantidades entre 1.5 y 3.5 mg
b) 3-etoxicarbonil-2-metil-4-(2-nitrofenil)-4,11-dihidro-1H-pirido[2,3-b][1,5] benzodiacepina en forma de racemato o en forma de su enantiómero dextrógiro o levógiro en cantidades entre 1.5 y 3.50 mg
c) Cremofor ELP 527.0 mg
d) Ácido clrohídrico 1 N c.s.p.
e) Alcohol deshidratado c.s.p. 1.0 mL
f) Nitrógeno c.s.p.