




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Concentración en el tiempo de 200 mg/mL de la Fórmula Ib, en forma de ácido libre suspendido en 2% de poloxámero 188 en solución salina, después de administrar subcutáneamente en perros a 6 mg/kg




FIG. 4

Concentración en el tiempo de 100 mg/mL de la Fórmula Ib, en forma de ácido libre suspendido en poloxámero 188 al 2% en solución salina, después de administrar subcutáneamente en perros a 6 mg/kg




FIG. 5

**Concentración el tiempo de 200 mg/mL de la Fórmula Ib,
en forma de sal de sodio en poloxámero 188 al 2% en
solución salina, después de administrar subcutáneamente
en perros a 6 mg/kg.**




FIG. 6

Concentración en el tiempo de 100 mg/mL de la Fórmula Ib, en forma de ácido libre disuelto en NMP, después de administrar subcutáneamente en perros a 6 mg/kg.




FIG. 7

Concentración en el tiempo de 200 mg/mL de la Fórmula Ib, en forma de ácido libre disuelto en NMP, después de administrar subcutáneamente en perros a 6 mg/kg.




FIG. 8

Concentración en el tiempo de 200 mg/mL de la Fórmula Ib, sal de sodio disuelto en NMP, después de administrar subcutáneamente en perros a 6mg/kg.




FIG. 9

Concentración en el tiempo de 200 mg/mL de la Fórmula Ib disuelta en 10% de etanol, 12% de agua y 78% de PEG 200, después de administrar subcutáneamente en perros a 6 mg/kg




FIG. 10

**Concentración en el tiempo de 200 mg/mL de la Fórmula Ib
disuelta en 10% de etanol, 12% de agua y 77% de PEG 200, con 1,2
eq. mol de hidróxido de sodio, después de administrar
subcutáneamente en perros a 6 mg/kg**




FIG. 11

Concentración en el tiempo de 200 mg/mL de la Fórmula Ib disuelta en 10% de etanol, 13% de agua y 77% de glicofurol, con 1,2 eq. mol de NaOH, después de administrar en perros a 6 mg/kg




FIG. 12

Concentración en el tiempo de una dosis oral fijada de 7,5 mg de la Fórmula Ib, en forma de ácido libre disuelto en 10% de etanol, 20% de Vitamina E TPGS, 70% de MIGLYOL 812, después de la administración oral en perros




FIG. 13