


CAPÍTULO REIVINDICARORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)


1. Un compuesto de Fórmula (I):



(I)

o un estereoisómero del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o dicho estereoisómero, en la que

el anillo A es un resto seleccionado de:



R^2 se selecciona de H, ciclopropilo, -alquilo (C_1-C_4), -alquil (C_1-C_4)-OH, -alquil (C_1-C_4)-OCH₃, -halogenoalquilo (C_1-C_4), -alquil (C_1-C_4)-O-halogenoalquilo (C_1-C_4), -CH(CH₃)₂, -CH₂-O-halogenoalquilo (C_1-C_4), -CH(CH₃)-O-halogenoalquilo (C_1-C_4), -CH₂-NH-halogenoalquilo (C_1-C_4) y -CH₂-N(CH₃)-halogenoalquilo (C_1-C_4),

R^{2A} se selecciona de H y metilo;

R^3 se selecciona de H y metilo;

R^{3A} se selecciona de H y metilo;


el anillo B es un resto seleccionado del grupo que consiste en fenilo, heteroarilo, cicloalquilo -(C₅-C₆) y cicloalqueno -(C₅-C₆);

n es 0, 1, 2 o 3, con la condición de que el valor de n no supere el número máximo de átomos de hidrógeno sustituibles en el anillo B; y

cada R^1 (cuando está presente) se selecciona independientemente del grupo consistente en halógeno, -CN, -OH, alquilo -(C₁-C₆), -O--alquilo (C₁-C₆), -halogenoalquilo (C₁-C₆), -O-halogenoalquilo (C₁-C₆), ciclopropilo,

ciclobutilo, $-\text{NH}_2$, $-\text{NH}$ -alquilo ($\text{C}_1\text{-C}_6$), $-\text{N}$ -alquilo ($\text{C}_1\text{-C}_6$)₂, $-\text{C}(\text{O})\text{O}$ -alquilo ($\text{C}_1\text{-C}_6$) y fenilo.

2. El compuesto de la Reivindicación 1 de Fórmula (IA):



(IA).

en la que B, n, R^1 , R^2 , R^{2A} , R^3 y R^{3A} son como de definen en la Reivindicación1.

3. El compuesto de la Reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que:

R^2 se selecciona de H, ciclopropilo, $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{-OH}$, $-\text{CH}_2\text{-OCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{F}$, $-\text{CHF}_2$, $-\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{F}$, $-\text{CH}_2\text{CHF}_2$, $-\text{CH}_2\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{F}$, $-\text{CH}_2\text{-O-CHF}_2$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-O-CH}_2\text{F}$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-O-CHF}_2$, $-\text{CH}_2\text{-NH-CH}_2\text{CF}_3$ y $-\text{CH}_2\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{CF}_3$;

R^{2A} se selecciona de H y metilo;

R^3 se selecciona de H y metilo; y


R^{3A} se selecciona de H y metilo.

4. El compuesto de la Reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^2 y R^{2A} son ambos metilo; y

R^3 y R^{3A} son ambos H.


5. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de la Fórmula (IB):



(IB)

en el que B, n y R¹, son como de definen en la Reivindicación 1.


6. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo de la Fórmula (IC):



(IC)

en el que, B, n y R¹, son como de definen en la Reivindicación 1.

7. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, de Fórmula (ID):



(ID)

en el que B, n y R¹, son como se definen en la Reivindicación 1.

8. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

el anillo B es un resto seleccionado del grupo consistente en fenilo, ciclopentilo, ciclohexilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazolilo, tienilo, tiazolilo, tiadiazolilo, isoxazolilo, oxadiazolilo y oxazolilo;

n es 0, 1, 2 o 3, con la condición de que el valor de n no supere el número máximo de átomos de hidrógeno sustituibles en el anillo B; y

cada R¹, cuando está presente, se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, -CN, -OH, alquilo (C₁-C₆), -O-alquilo(C₁-C₆), -halogenoalquilo(C₁-C₆), -O-halogenoalquilo (C₁-C₆), ciclopropilo, ciclobutilo, -NH₂, -NH-alquilo(C₁-C₆), -N-alquilo(C₁-C₆)₂, -C(O)O-alquilo(C₁-C₆) y fenilo.


9. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

el anillo B es un resto seleccionado del grupo consistente en: fenilo, pirazolilo, piridinilo, tienilo, isoxazolilo, oxadiazolilo y oxazolilo;

n es 0, 1 o 2; y

cada R¹, cuando está presente, se selecciona independientemente del grupo que consiste en fluoro, cloro, -CH₃ y -CHCF₂.

10. El compuesto de la Reivindicación 1, que tiene la Fórmula (IA-1):



(IA-1),

o un estereoisómero del mismo o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o dicho estereoisómero, en la que:



R^2 se selecciona de H, ciclopropilo, $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{-OH}$, $-\text{CH}_2\text{-OCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{F}$, $-\text{CHF}_2$, $-\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{F}$, $-\text{CH}_2\text{CHF}_2$, $-\text{CH}_2\text{CF}_3$, $-\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{F}$, $-\text{CH}_2\text{-O-CHF}_2$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-O-CH}_2\text{F}$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-O-CHF}_2$, $-\text{CH}_2\text{-NH-CH}_2\text{CF}_3$ y $-\text{CH}_2\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{CF}_3$;



R^{2A} se selecciona de H y CH_3 ;



R^3 se selecciona de H y CH_3 ; y



R^{3A} se selecciona de H y CH_3 .



11. El compuesto de la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, seleccionándose dicho compuesto del grupo consistente en:




















12. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




13. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




en la que dicho compuesto está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

14. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




15. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




en la que dicho compuesto está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

16. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




17. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




en la que dicho compuesto está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

18. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




19. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




en la que dicho compuesto está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

20. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




21. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




en la que dicho compuesto está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

22. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




23. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:




en la que dicho compuesto está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

24. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:



25. El compuesto de la Reivindicación 10, en el que dicho compuesto tiene una estructura:



en la que dicho compuesto está en forma de una sal farmacéuticamente aceptable.

26. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, 14, 16, 18, 20, 22 o 24 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
