

1
REIVINDICACIONES

1. Una combinación que consiste en un desinfectante y un coccidiostático caracterizada porque:

5 dicho desinfectante comprende:

un derivado fenol, estando presente en el intervalo del 5 al 30%;

un disolvente orgánico, estando presente en el intervalo del 10 al 30%;

10 un ácido orgánico y un ácido inorgánico, estando presentes en el intervalo del 20 al 40%;

un tensioactivo aniónico, estando presente en el intervalo del 5 al 10%;

dicho coccidiostático comprende:

15 un extracto acuoso de *Salvia libanotica*, estando presente dentro del intervalo del 2 al 10%;

aceite de eucalipto en el intervalo del 5 al 15%; y

aceite de menta, estando presente en el intervalo del 4 al 12%.

20

2. La combinación de un desinfectante y un coccidiostático como se recita en la reivindicación 1, caracterizada porque el coccidiostático se diluye en agua de beber en una de las siguientes relaciones de dilución: 0,005 %, 0,010 % o 0,020 %.

25

3. La combinación de un desinfectante y un coccidiostático como se recita en la reivindicación 1, caracterizada porque el desinfectante se diluye en una solución en la que la relación de dilución del desinfectante varía del 3 al 5%.

30

4. Un método para proporcionar el potenciamiento del

crecimiento de los pollos caracterizado por comprender las etapas de:

- formular un desinfectante, que comprende:
 - o un derivado fenol, estando presente entre los intervalos del 5 al 30%,
 - o un disolvente orgánico, estando presente entre los intervalos del 10 al 30%,
 - o un ácido orgánico y un ácido inorgánico, estando presentes dentro del intervalo del 20 al 40%,
 - o un tensioactivo aniónico; estando presente dentro del intervalo del 5 al 10%;
- aplicar dicho desinfectante a un área en la que los pollos se crecerán;
- formular un coccidiostático, que comprende:
 - o un extracto acuoso de *Salvia libanotica*, estando presente dentro del intervalo del 2 al 10%;
 - o aceite de eucalipto entre el intervalo del 5 al 15%;
 - o aceite de menta, estando presente entre el intervalo del 4 al 12%;
- diluir dicho coccidiostático en el agua de beber para proporcionar a los pollos;
- administrar el agua de beber a los pollos durante el proceso de crecimiento;
- en donde el coccidiostático se diluye en el agua de beber en el intervalo del 0,005 % al 0,020 % para proporcionarlo a los pollos durante el proceso de crecimiento durante un plazo de crecimiento inicial de treinta y cinco días;
- en donde el desinfectante se aplica a un área deseada y el desinfectante se diluye en una solución en el que la relación de dilución del desinfectante varía del 3 al 5%;
- en donde el método no es un método terapéutico.

5. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 4, caracterizado porque el coccidistático se diluye en el agua de beber en una de las siguientes relaciones de dilución: 0,005%, 0,010% o 0,020%.
6. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 4, caracterizado porque el desinfectante se aplica a un área deseada a una tasa de aplicación de 200 a 400 ml de dilución por metro cuadrado.
7. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 6, caracterizado porque el agua de beber teniendo disuelto el coccidistático se proporciona a los pollos quince veces durante el plazo de crecimiento inicial.
8. El método para proporcionar el potenciamiento del crecimiento de los pollos como se recita en la reivindicación 6 o en la reivindicación 7, caracterizado porque la etapa de administrar el agua de beber se inicia después de que los pollos alcancen 4 días de edad y se termina después de que los pollos alcancen 33 días de edad.