

REIVINDICACIONES

1. Una combinación farmacéutica que contiene un agonista de FXR no derivado de ácido biliar y uno o varios agentes terapéuticos adicionales, para la administración simultánea, secuencial o separada, en donde el agente terapéutico adicional es cenicriviroc, y en donde el agonista de FXR es ácido 2-[3-({5-ciclopropil-3-[2-(trifluorometoxi)fenil]-1,2-oxazol-4-il}metoxi)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il]-4-fluoro-1,3-benzotiazol-6-carboxílico, un estereoisómero, un enantiómero, una sal farmacéuticamente aceptable, profármaco y/o éster de este o un conjugado de aminoácidos de este.
2. Una combinación de acuerdo con la reivindicación 1, para utilizar en el tratamiento o la prevención de una enfermedad o trastorno fibrótico o cirrótico, una enfermedad o trastorno hepático, una enfermedad o trastorno hepático crónico.
3. Combinación de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el agonista de FXR ha de ser administrado a una dosis en un intervalo de aproximadamente 3 µg a aproximadamente 100 µg.
4. Combinación de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 3, en donde cenicriviroc en forma libre o como una sal farmacéuticamente aceptable, solvato, profármaco o éster de este, ha de ser administrado a una dosis en un intervalo de aproximadamente 50 mg a aproximadamente 250 mg.
5. Combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que es una combinación de dosis fija.
6. Combinación de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que es una combinación libre.
7. La combinación de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, para su uso en el tratamiento o prevención de una enfermedad o trastorno fibrótico, cirrótico, una enfermedad o trastorno hepático, una enfermedad hepática crónica, una enfermedad o trastorno hepático seleccionado del grupo que consiste en colestasis, colestasis intrahepática, colestasis inducida por estrógenos, colestasis inducida por fármacos, colestasis del embarazo, colestasis asociada a nutrición parenteral, cirrosis biliar primaria (CBP), colangitis esclerosante primaria (CEP), colestasis familiar progresiva (PFIC), enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), esteatohepatitis no alcohólica (NASH), lesión de las vías

biliares inducida por fármacos, cálculos biliares, cirrosis hepática, cirrosis inducida por alcohol, enfermedad hepática asociada a fibrosis quística (CFLD)), obstrucción del conducto biliar, colelitiasis, fibrosis hepática, fibrosis renal, dislipidemia, aterosclerosis, diabetes, nefropatía diabética, colitis, ictericia del recién nacido, prevención del kernicterus, enfermedad oclusiva venosa, hipertensión portal, síndrome metabólico, hipercolesterolemia, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, disfunción eréctil, fibrosis progresiva del hígado causada por cualquiera de las enfermedades anteriores o por hepatitis infecciosa; NAFLD, NASH, fibrosis hepática o PBC.