

© Damien Boilley
from suburbs of
Paris, France

Annona muricata L. ⓘ

[RESUMEN](#)

[DETALLES](#)

[MULTIMEDIA](#)

Nomenclaruta y clasificación

Descripción taxonómica

Historia natural I

Historia natural II

Invasividad

Hábitat y distribución

Dinámica poblacional y
Amenazas

Usos, Manejos y
Conservación

Partes asociadas

Referencias

Información adicional

Taxonomía

Reino	Plantae
Filo	Magnoliophyta
Clase	Magnoliopsida
Orden	Magnoliales
Familia	Annonaceae
Género	Annona
Categoría del taxón	SPECIES

Descripción General

El guanábano es un árbol que alcanza hasrta los 10m de altura. En Colombia se distribuye en zonas cálidas y en zonas cafeteras hasta los 1500 msnm. Su uso además del consumo de sus frutos en diferentes formas, es de tipo medicinal, usándolo en cataplasmas, sus frutos son usados también como vomitivos y purgantes. Su propagación es por semillas.

Sinónimos

NOMBRE CANÓNICO	AUTORÍA	FUENTE
Annona bonplandiana	Kunth	
Annona cearaensis	Barb. Rodr.	

NOMBRE CANÓNICO	AUTORÍA	FUENTE
Annona muricata mirabilis	L.	
Annona muricata borinquensis	L.	
Annona portoricensis		
Guanabanus muricatus		

Nombres comunes

IDIOMA	NOMBRE COMÚN	REGIÓN	GRUPO HUMANO
	Atti		
	Cachiman épineux		
Francés	Cachiman épineux		
	Corossolier		
Francés	Corossolier		
Francés	Grand corossol		
	Guanabana		

IDIOMA	NOMBRE COMÚN	REGIÓN	GRUPO HUMANO
Alemán	Sauersack		
	Sinini		
Alemán	Stachelannone		
Español	anona		
Francés	anone		
	araticum- grande		
	araticum- manso		
	babána		
	bayubána		
Francés	cachiman épineux		
	coração-de- rainha		
	corossol		
Francés	corossol épineux		
Español	Anón	Santander (Colombia)	

IDIOMA	NOMBRE COMÚN	REGIÓN	GRUPO HUMANO
Español	Guanábana	Antioquia, Tolima (Colombia), Panamá	
Español	Guanábano	Antioquia, Santander (Colombia)	
Español	Nejo	Panamá	
Español	Suiti	Panamá	

Descripción completa

Este árbol que alcanza hasta 10 metros de altura y 20 cm de diámetro en su tronco es fuertemente aromático. Su corteza es de color castaño o gris y es amarilla en el interior, posee pequeños gránulos (lenticelas) al extraerla se desprende en tiras largas. Su madera es fibrosa, blanda y de color amarillento. Sus hojas son simples y se disponen de manera alterna miden 15 cm de largo por 6 de ancho aproximadamente. Sus flores son de color verde claro a blanquecino miden 3 cm de ancho aproximadamente, son carnosas y presentan tres pétalos exteriores. Se disponen sobre el tronco o sobre las ramas principales. Su fruto puede alcanzar 50 cm de largo por 20 de ancho, tiene una cubierta con púas (equinado) y es de color verde oscuro brillante. En su interior tiene una

pulpa jugosa de color blanco que contiene numerosas semillas duras de hasta 2 cm de largo aplanadas, de color negro castaño que contienen una almendra blanca en su interior.

Forma de vida

Árbol (Mendoza y Ramírez 2000).

TIPO	VALOR
CONABIO	Árbol

Referencias ▼

Ciclo de vida

Es una especie de crecimiento lento y requiere de abundante luz solar (Mendoza y Ramírez 2000, Mahecha et al. 2004).

Referencias ▼

Reproducción

Los frutos se recolectan al madurar, se extraen las semillas, se lavan y se siembran en bolsas a 1 cm de profundidad. Cuando las plántulas alcanzan entre 15 y 25 cm de altura se transplantan a su lugar definitivo. Sus épocas de floración y fructificación ocurren durante casi todo el año. Pierde parcialmente su follaje (Mahecha et al. 2004).

Referencias ▼

Dispersión

Se propaga por semillas (Mahecha et al. 2004).

Referencias ▼

Invasividad

Tiene origen en Las Antillas.

Hábitat

Bosque secundario y maduro (Mendoza y Ramírez 2000).
Bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, bosque húmedo premontano y bosque muy húmedo premontano (Mahecha et al. 2004).

Referencias ▼

Distribución

Alcance:

Se presenta en zonas cálidas y en zonas cafeteras hasta los 1500 msnm (Mahecha et al. 2004). Se reporta en Floridablanca por el Jardín Botánico Eloy Valenzuela en una altitud de 980 msnm y en Palmira, Valle del Cauca en la granja experimental; por el Jardín Botánico San Jorge de Ibagué en el barrio Veinte de Julio en una altitud de 1200 msnm, y en en Ibagué, Tolima en una altitud de 1248 msnm.

Referencias ▼

Estado de amenaza

Aplica para
CITES
Valor
Tipo

País: GLOBAL
LC
UICN

Usos Manejo y Conservación

useNotes

Tiene un uso medicinal. La pulpa de su fruto es aplicada en cataplasmas para aliviar contusiones; los frutos verdes, secos y pulverizados son utilizados como vomitivo y purgante; sus hojas y sus yemas foliares tienen propiedades antiespasmódicas y también son usados contra la inflamación del vientre. Su madera es poco utilizada aunque ha servido en la fabricación de duelas de pipas. También es utilizado para conformar cercas vivas y su madera es usada en artesanías (Mahecha et al. 2004). Según los Jardines Botánicos Eloy Valenzuela, San Jorge y Joaquín Antonio Uribe es una especie alimenticia consumida en forma de batidos, sorbetes, dulces, helados y como fruta fresca. Es alimento también para la avifauna. Según Los jardines botánicos San Jorge y Joaquín Antonio Uribe es una especie medicinal vermífuga, descongestionante pectoral, antibiliosa, antiescorbútica y analgésica gastrointestinal; la decocción de sus semillas tostadas y molidas, se ha administrado como antihelmíntico, antidiarréico y para tratar las úlceras estomacales. El Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe menciona además su utilidad en la industria para la producción de pulpa para jugos y como insecticida por su alto contenido de taninos. Consulte YOSCUA - Usos y saberes locales sobre la Biodiversidad para obtener más información sobre usos de esta especie.

Manejo y conservación

Partes asociadas

Germán Alexander
Trujillo Pérez

alexandertrujillop
@gmail.com

Referencias


1. G., GÓMEZ RESTREPO M. 2011. *Fenología reproductiva de especies forestales nativas presentes Un paso hacia su conservación en la jurisdicción de CORANTIOQUIA*. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA
2. Mahecha, G. et al. 2004. *Vegetación del Territorio CAR: 450 Especies de sus Llanuras y Montañas*. Panamaamericana Formas e Impresos, S.A.
3. Mendoza H., Ramírez B. 2000. *Plantas y Flores de La Planada, Guía ilustrada de familias y géneros*.
4. Missouri Botanical Garden 2008. *Tropicos.org* <<http://www.tropicos.org>>.. Disponible en: <http://www.tropicos.org>
5. The Plant List 2010. *The plant list*. Disponible en: <http://www.theplantlist.org/>
6. Vargas, W. 2002. *Guía Ilustrada de las Plantas de las Montañas del Quindío y los Andes Centrales*.

Información adicional

- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annona_muricata_1.jpg




Fichas relacionadas



Guatteria narinensis

Maas &



Guatteria araracuarae

Xylopia venezue.



VER MÁS



[Sobre el portal](#)



[Condiciones de uso](#)