

REIVINDICACIONES

1.- Una composición que comprende un compuesto de sulfonamida y un portador farmacéuticamente aceptable,

en donde

el compuesto de sulfonamida se selecciona del grupo que consiste en:

ácido 4-({(1-ciclopropil-4-metilisoquinolin-3-il)[4-

(trifluorometoxi)bencil]amino}sulfonil)benzoico,

ácido 4-({(1-isopropil-4-metilisoquinolin-3-il)[4-

(trifluorometoxi)bencil]amino}sulfonil)benzoico,

ácido 4-{{[3-cloro-4-[ciclopropil(difluoro)metil]bencil}(4-metilisoquinolin-3-il)amino}sulfonil}benzoico,

ácido 4-({(4-ciclopropilisoquinolin-3-il)[4-(trifluorometoxi)bencil]amino}sulfonil)benzoico,

ácido 4-{{[3-cloro-4-[ciclopropil(difluoro)metil]bencil}(1-ciclopropil-4-metilisoquinolin-3-il)amino}sulfonil}benzoico,

ácido 4-{{[4-[ciclopropil(difluoro)metil]-3-fluorobencil}(4-metilisoquinolin-3-il)amino}sulfonil}benzoico,

ácido 4-({[4-(trifluorometoxi)bencil][4-(trifluorometil)isoquinolin-3-il]amino}sulfonil)benzoico,

ácido 4-[(4-ciclopropilisoquinolin-3-il){[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil}amino)sulfonil]benzoico, y

ácido 4-{{[4-[ciclopropil(difluoro)metil]-3-fluorobencil}(4-ciclopropilisoquinolin-3-il)amino}sulfonil}benzoico, y

la dosis del compuesto de sulfonamida es de 50 mg.

2.- Una composición que comprende un compuesto de sulfonamida y un portador farmacéuticamente aceptable,

en donde

el compuesto de sulfonamida se selecciona del grupo que consiste en:

ácido 4-({(1-ciclopropil-4-metilisoquinolin-3-il)[4-

(trifluorometoxi)bencil]amino}sulfonil)benzoico,

ácido 4-({(1-isopropil-4-metilisoquinolin-3-il)[4-

(trifluorometoxi)bencil]amino}sulfonil)benzoico,

ácido 4-{{3-cloro-4-[ciclopropil(difluoro)metil]bencil}(4-

metilisoquinolin-3-il)amino}sulfonil}benzoico,

ácido 4-({(4-ciclopropilisoquinolin-3-il)[4-

(trifluorometoxi)bencil]amino}sulfonil)benzoico,

ácido 4-{{3-cloro-4-[ciclopropil(difluoro)metil]bencil}(1-ciclopropil-4-

metilisoquinolin-3-il)amino}sulfonil}benzoico,

ácido 4-{{4-[ciclopropil(difluoro)metil]-3-fluorobencil}(4-

metilisoquinolin-3-il)amino}sulfonil}benzoico,

ácido 4-({[4-(trifluorometoxi)bencil][4-(trifluorometil)isoquinolin-3-

il]amino}sulfonil)benzoico,

ácido 4-(((4-ciclopropilisoquinolin-3-il){[5-(trifluorometil)piridin-2-

il]metil}amino)sulfonil]benzoico, y

ácido 4-{{4-[ciclopropil(difluoro)metil]-3-fluorobencil}(4-

ciclopropilisoquinolin-3-il)amino}sulfonil}benzoico,

la dosis del compuesto de sulfonamida es de 50 mg, y

el sujeto es una mujer.

3.- Una composición que comprende un compuesto de sulfonamida y un portador farmacéuticamente aceptable,

en donde

el compuesto de sulfonamida es ácido 4-({(4-ciclopropilisoquinolin-3-il)[4-(trifluorometoxi)bencil]amino}sulfonil)benzoico,

la dosis del compuesto de sulfonamida es de 50 mg, y el sujeto es una mujer.