


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la Fórmula (Ib):



(Ib);

o una sal, solvato, clatrato o profármaco de este farmacéuticamente aceptable; en donde:

Z es un N-heterocíclico puenteado de 6 a 12 miembros opcionalmente sustituido;

cada uno de R_1 y R_2 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido;

cada uno de R_{3b} y R_{3c} se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, halo, N_3 , OR_c , NR_dR_d , $C(O)OR_c$, NO_2 , CN , $C(O)R_c$, $C(O)C(O)R_c$, $C(O)NR_dR_d$, $NR_dC(O)R_c$, $NR_dS(O)_nR_c$, $N(R_d)(COOR_c)$, $NR_dC(O)C(O)R_c$, $NR_dC(O)NR_dR_d$, $NR_dS(O)_nNR_dR_d$, $NR_dS(O)_nR_c$, $S(O)_nR_c$, $S(O)_nNR_dR_d$, $OC(O)OR_c$, $(C=NR_d)R_c$, $OC(O)R_c$, heterocíclico opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido;

R_4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, halo, N_3 , OR_c , NR_dR_d , $C(O)OR_c$, NO_2 , CN , $C(O)R_c$, $C(O)C(O)R_c$, $C(O)NR_dR_d$, $NR_dC(O)R_c$, $NR_dS(O)_nR_c$, $N(R_d)(COOR_c)$, $NR_dC(O)C(O)R_c$, $NR_dC(O)NR_dR_d$, $NR_dS(O)_nNR_dR_d$, $NR_dS(O)_nR_c$, $S(O)_nR_c$, $S(O)_nNR_dR_d$, $OC(O)OR_c$, $(C=NR_d)R_c$, $OC(O)R_c$, heterocíclico opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido;

R₅ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquenilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquinilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, cicloalquilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, halo, N₃, OR_c, NR_dR_d, C(O)OR_c, NO₂, CN, C(O)R_c, C(O)C(O)R_c, C(O)NR_dR_d, NR_dC(O)R_c, NR_dS(O)_nR_c, N(R_d)(COOR_c), NR_dC(O)C(O)R_c, NR_dC(O)NR_dR_d, NR_dS(O)_nNR_dR_d, NR_dS(O)_nR_c, S(O)_nR_c, S(O)_nNR_dR_d, OC(O)OR_c, (C=NR_d)R_c, OC(O)R_c, heterocíclico opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido;

en donde los sustituyentes de Z, R₁, R₂, R_{3b}, R_{3c}, R₄ y R₅ opcionalmente sustituidos se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en alquilo C₁-C₁₀, alquenilo C₂-C₁₀, alquinilo C₂-C₁₀, cicloalquilo C₃-C₁₂, cicloalquenilo C₃-C₁₂, arilo, halo, N₃, OR_c, NR_dR_d, C(O)OR_c, NO₂, CN, C(O)R_c, C(O)C(O)R_c, C(O)NR_dR_d, NR_dC(O)R_c, NR_dS(O)_nR_c, N(R_d)(COOR_c), NR_dC(O)C(O)R_c, NR_dC(O)NR_dR_d, NR_dS(O)_nNR_dR_d, NR_dS(O)_nR_c, S(O)_nR_c, S(O)_nNR_dR_d, OC(O)OR_c, (C=NR_d)R_c, OC(O)R_c, heterocíclico y heteroarilo;

cada R_c se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquenilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquinilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, cicloalquilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, heterocíclico opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido;

cada R_d se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquenilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquinilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alcoxi C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, cicloalquilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, heterocíclico opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; o dos grupos geminales R_d se toman juntos con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterocíclico opcionalmente sustituido o un heteroarilo opcionalmente sustituido;


cada n es independientemente 0, 1 o 2.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde los sustituyentes de E, Z, R₁, R₂, R_{3a}, R_{3b}, R_{3c}, R_{3d} y R₅ opcionalmente sustituidos se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en alquilo C₁-C₄, halo, OR_c, CN, S(O)_nR_c, heterocíclico y heteroarilo.
3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde cada uno de R₁ y R₂ es hidrógeno.
4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R₄ es halo.

5. El compuesto de la reivindicación 4, en donde R_4 es Cl.
6. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_5 es hidrógeno o alquilo C_1-C_{10} .
7. El compuesto de la reivindicación 6, en donde R_5 es metilo.
8. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_{3b} es hidrógeno.
9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde
cada uno de R_1 y R_2 es hidrógeno;
 R_4 es Cl;
 R_5 es metilo; y
 R_{3b} es hidrógeno.
10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_{3c} se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, halo, N_3 , OR_c , NR_dR_d , $C(O)OR_c$, NO_2 , CN , $C(O)R_c$, $C(O)C(O)R_c$, $C(O)NR_dR_d$, $NR_dC(O)R_c$, $NR_dS(O)_nR_c$, $N(R_d)(COOR_c)$, $NR_dC(O)C(O)R_c$, $NR_dC(O)NR_dR_d$, $NR_dS(O)_nNR_dR_d$, $NR_dS(O)_nR_c$, $S(O)_nR_c$, $S(O)_nNR_dR_d$, $OC(O)OR_c$, $(C=NR_d)R_c$, $OC(O)R_c$, heterocíclico opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido, en donde cada R_c se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, heterocíclico opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido;
cada R_d se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alcoxi C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, heterocíclico opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; o dos grupos geminales R_d se toman juntos con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterocíclico opcionalmente sustituido o un heteroarilo opcionalmente sustituido; y
cada n es independientemente 0, 1 o 2.
11. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_{3c} se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo C_1-C_{10} sustituido con CN ; $S(O)_nR_c$, en donde R_c es alquilo

C₁-C₁₀ o cicloalquilo C₃-C₁₂ y n es 2; heterocíclico opcionalmente sustituido; o y heteroarilo opcionalmente sustituido.

12. El compuesto de la reivindicación 1, en donde Z es:



en donde R_t se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquenilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquinilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, cicloalquilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, halo, N₃, OR_c, NR_dR_d, C(O)OR_c, NO₂, CN, C(O)R_c, C(O)C(O)R_c, C(O)NR_dR_d, NR_dC(O)R_c, NR_dS(O)_nR_c, N(R_d)(COOR_c), NR_dC(O)C(O)R_c, NR_dC(O)NR_dR_d, NR_dS(O)_nNR_dR_d, NR_dS(O)_nR_c, S(O)_nR_c, S(O)_nNR_dR_d, OC(O)OR_c, (C=NR_d)R_c, OC(O)R_c, heterocíclico opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; en donde

cada R_c se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquenilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquinilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, cicloalquilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, heterocíclico opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido;


cada R_d se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquenilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquinilo C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alcoxi C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, cicloalquilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, heterocíclico opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; o dos grupos geminales R_d se toman juntos con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterocíclico opcionalmente sustituido o un heteroarilo opcionalmente sustituido; y







cada n es independientemente 0, 1 o 2; y







R_v se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_1 - C_{10} opcionalmente sustituido.







13. El compuesto de la reivindicación 12, en donde R_t se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1 - C_{10} y OR_c , en donde R_c es hidrógeno o alquilo C_1 - C_{10} ; y R_v es hidrógeno o alquilo C_1 - C_4 .







14. El compuesto de la reivindicación 1, dicho compuesto se selecciona del grupo que consiste en:




5A		6A	
8A		10 A	
11 A		12 A	

13 A		15 A	
16 A		17 A	
18 A		19 A	


20 A		21 A	
22 A		23 A	
24 A		25 A	

26 A		27 A	
28 A		29 A	
30 A		31 A	



o una sal, solvato, clatrato o profármaco de este farmacéuticamente aceptable;

15. Un compuesto de Fórmula (III):



o una sal, solvato, clatrato o profármaco de este farmacéuticamente aceptable; en donde:

R₁ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₄ opcionalmente sustituido y halo;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en alquilo C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, alqueno C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, alquino C₂-C₁₀ opcionalmente sustituido, cicloalquilo C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, cicloalqueno C₃-C₁₂ opcionalmente sustituido, heterocíclico de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido, halo y CN;

R_{3a}, R_{3b}, R_{3c} y R_{3d} se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ opcionalmente sustituido, CN y halo;

R₄ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₁₀ opcionalmente sustituido, halo y CN;

R₆ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ opcionalmente sustituido, CN y halo; y

Z es un N-heterocíclico puenteado de 6 a 12 miembros opcionalmente sustituido;
en donde los sustituyentes de Z, R_1 , R_2 , R_{3a} , R_{3b} , R_{3c} , R_{3d} , R_4 y R_6 opcionalmente sustituidos se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en alquilo C_1 - C_{10} , alquenilo C_2 - C_{10} , alquinilo C_2 - C_{10} , cicloalquilo C_3 - C_{12} , cicloalquenilo C_3 - C_{12} , arilo, halo, N_3 , OR_c , NR_dR_d , $C(O)OR_c$, NO_2 , CN , $C(O)R_c$, $C(O)C(O)R_c$, $C(O)NR_dR_d$, $NR_dC(O)R_c$, $NR_dS(O)_nR_c$, $N(R_d)(COOR_c)$, $NR_dC(O)C(O)R_c$, $NR_dC(O)NR_dR_d$, $NR_dS(O)_nNR_dR_d$, $NR_dS(O)_nR_c$, $S(O)_nR_c$, $S(O)_nNR_dR_d$, $OC(O)OR_c$, $(C=NR_d)R_c$, $OC(O)R_c$, $Si(R_c)_3$, heterocíclico y heteroarilo;

cada R_c se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1 - C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2 - C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2 - C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3 - C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3 - C_{12} opcionalmente sustituido, heterocíclico opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido;

cada R_d se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1 - C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2 - C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2 - C_{10} opcionalmente sustituido, alcoxi C_1 - C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3 - C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3 - C_{12} opcionalmente sustituido, heterocíclico opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido y heteroarilo opcionalmente sustituido; o dos grupos geminales R_d se toman juntos con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un heterocíclico opcionalmente sustituido o un heteroarilo opcionalmente sustituido; y

cada n es independientemente 0, 1 o 2.

16. El compuesto de la reivindicación 15, en donde los sustituyentes de E, Z, R_1 , R_2 , R_{3a} , R_{3b} , R_{3c} , R_{3d} y R_5 opcionalmente sustituidos se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en alquilo C_1 - C_4 , halo, OR_c , CN , $S(O)_nR_c$, $Si(R_c)_3$, heterociclilo y heteroarilo.

17. El compuesto de la reivindicación 15, en donde R_1 es hidrógeno o alquilo C_1 - C_{10} .

18. El compuesto de la reivindicación 15, en donde R_1 es metilo.

19. El compuesto de la reivindicación 15, en donde R_{3a} , R_{3b} , R_{3c} y R_{3d} es cada uno hidrógeno.

20. El compuesto de la reivindicación 15, en donde R_4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, cloro y CN .

21. El compuesto de la reivindicación 15, en donde R_6 es CN o halo.

22. El compuesto de la reivindicación 15, en donde R_6 es Cl .

23. El compuesto de la reivindicación 15, en donde


R_1 es metilo;

R_{3a} , R_{3b} , R_{3c} y R_{3d} es cada uno hidrógeno;

R_4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, cloro y CN; y

R_6 es CN o cloro.

24. El compuesto de la reivindicación 15, en donde Z se selecciona del grupo que consiste en



R_t se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_4 opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_4 opcionalmente sustituido, OR_{c2} y $C(O)OR_{e2}$, en donde cada uno de R_{c2} y R_{e2} se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, heterocíclico de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido, arolo opcionalmente sustituido y heteroarilo de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido; y

R_v es hidrógeno o alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido.


25. El compuesto de la reivindicación 24, en donde R_t es hidroxilo y R_v se selecciona de hidrógeno.







26. El compuesto de la reivindicación 24, en donde R_t se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, metanol, metilo, trifluorometilo, $O-CF_3$ y metoxi.







27. El compuesto de la reivindicación 15, en donde R_2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C_1-C_{10} opcionalmente sustituido, alquenilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, alquinilo C_2-C_{10} opcionalmente sustituido, cicloalquilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, cicloalquenilo C_3-C_{12} opcionalmente sustituido, heterocíclico de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo de 4 a 12 miembros opcionalmente sustituido, halo y CN.







28. El compuesto de la reivindicación 27, en donde los sustituyentes de R_2 opcionalmente sustituido se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en alquilo C_1-C_4 , halo, OR_c , CN, $S(O)_nR_c$, $Si(R_c)_3$, heterociclilo y heteroarilo.







29. El compuesto de la reivindicación 15, dicho compuesto se selecciona del grupo que consiste en:










5B		6B	
7B		8B	
9B		10B	







11B		12B	
13B		14B	
15B		16B	







17B		18B	
19B		20B	
21B		22B	







23B		24B	
25B		26B	
27B		28B	







29B		30B	
31B		32B	
33B		34B	















41B		42B	
43B		44B	
45B		46B	







47B		50B	
51B		52B	
53B		54B	







55B		56B	
57B		63B	
64B		66B	







67B		68B	
69B		70B	
71B		72B	







73B		74B	
75B		76B	
77B		78B	







79B		80B	
81B		82B	
83B		84B	







85B		86B	
87B		88B	
89B		90B	







91B		92B	
94B		95B	
96B		97B	







98B		99B	
100B		101B	
102B		103B	







104B		105B	
106B		107B	
108B		109B	







110B		111B	
112B		113B	
114B		115B	







116B		117B	
118B		119B	
120B		121B	





122B		124B	
125B		126B	
127B		128B	

129B		130B	
131B		132B	
133B		134B	

135B		136B	
137B		138B	
139B		140B	

141B		142B	
143B		144B	
145B		146B	

147B		148B	
149B		150B	
151B		153B	

155B		156B	
157B		158B	

o una sal, solvato, clatrato o profármaco de este farmacéuticamente aceptable.

30. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-29 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

31. Un método para tratar a un paciente que padece de una afección asociada con una disfunción en la proteostasis que comprende administrar a dicho paciente una cantidad eficaz de un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29.

32. Un método para la preparación de un compuesto de la reivindicación 1.

33. Un método para la preparación de un compuesto de la reivindicación 15.