

REIVINDICACIONES

1. Un método que comprende adicionar 0,1 a 3% p/p de un depurador de formaldehído a una composición farmacéutica que comprende N-(3,5-dimetoxifenil)-N'-(1-metiletil)-N-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]etan-1,2-diamina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en donde el depurador de formaldehído se selecciona de glicina, alanina, serina, treonina, cisteína, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, ácido aspártico, ácido glutámico, arginina, lisina, ornitina, citrulina, taurina, pirrolisina, histidina, aspartamo, prolina, triptófano, citrulina, pirrolisina, asparagina, glutamina y una mezcla de los mismos; o, siempre que sea posible, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.
2. El método de conformidad con la reivindicación 1, donde la composición farmacéutica es una tableta o una cápsula.
3. El método de conformidad con la reivindicación 1 o 2, donde la composición farmacéutica comprende base de N-(3,5-dimetoxifenil)-N'-(1-metiletil)-N-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]etan-1,2-diamina.
4. Un método para evitar, posponer, ralentizar o disminuir la transformación de N-(3,5-dimetoxifenil)-N'-(1-metiletil)-N-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]etan-1,2-diamina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, contenida en una composición farmacéutica, en 6,8-dimetoxi-4-(1-metiletil)-1-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1,4-benzodiazepina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, caracterizado porque comprende agregar un depurador de formaldehído a dicha composición, en donde el depurador de formaldehído se selecciona de glicina, alanina, serina, treonina, cisteína, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, ácido aspártico, ácido glutámico, arginina, lisina, ornitina, citrulina, taurina, pirrolisina, histidina, aspartamo, prolina, triptófano, citrulina, pirrolisina, asparagina, glutamina y una mezcla de los mismos; o, siempre que sea posible, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.
5. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque la composición farmacéutica es una tableta o una cápsula.

6. El método de conformidad con la reivindicación 4 o 5, caracterizado porque la composición comprende base de N-(3,5-dimetoxifenil)-N'-(1-metiletil)-N-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]etan-1,2-diamina.
7. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende N-(3,5-dimetoxifenil)-N'-(1-metiletil)-N-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]etan-1,2-diamina, una sal farmacéuticamente aceptable de la misma; un depurador de formaldehído; y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables seleccionados de desintegrantes, diluyentes, rellenos, aglutinantes, agentes amortiguadores, lubricantes, deslizantes, agentes espesantes, agentes edulcorantes, saborizantes, colorantes, y conservadores, en donde el depurador de formaldehído se selecciona de glicina, alanina, serina, treonina, cisteína, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, ácido aspártico, ácido glutámico, arginina, lisina, ornitina, citrulina, taurina, pirrolisina, histidina, aspartamo, prolina, triptófano, citrulina, pirrolisina, asparagina, glutamina y una mezcla de los mismos; o, siempre que sea posible, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos; y en donde la composición comprende entre 0,1 y 3 % p/p del depurador de formaldehído.
8. Una composición farmacéutica según la reivindicación 7, que comprende de 0,1 a 2% p/p de depurador de formaldehído.
9. Una composición farmacéutica según la reivindicación 8, que comprende de 0,1 a 1,5% p/p de depurador de formaldehído.
10. Una composición farmacéutica según la reivindicación 9, que comprende de 0,1 a 1% p/p de depurador de formaldehído.
11. Una composición farmacéutica según la reivindicación 7 que comprende de 0,5 a 3% p/p de depurador de formaldehído.
12. Una composición farmacéutica según la reivindicación 11, que comprende de 0,5 a 2% p/p de depurador de formaldehído.
13. Una composición farmacéutica según la reivindicación 12, que comprende de 0,5 a 1,5% p/p de depurador de formaldehído.

14. Una composición farmacéutica según la reivindicación 13, que comprende de 0,5 a 1% p/p de depurador de formaldehído.
15. Una composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 14, caracterizada porque la composición es una tableta o una cápsula.
16. Una composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 15, caracterizada porque la composición comprende entre 0–2 % p/p de 6,8–dimetoxi–4–(1–metiletil)–1–[3–(1–metil–1H–pirazol–4–il)quinoxalin–6–il]–2,3,4,5–tetrahidro–1H–1,4–benzodiazepina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma.
17. Una composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 16, caracterizada porque la composición comprende entre 0–0.05 % p/p de 6,8–dimetoxi–4–(1–metiletil)–1–[3–(1–metil–1H–pirazol–4–il)quinoxalin–6–il]–2,3,4,5–tetrahidro–1H–1,4–benzodiazepina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma.
18. Una composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 17, en donde la N–(3,5–dimetoxifenil)–N'–(1–metiletil)–N–[3–(1–metil–1H–pirazol–4–il)quinoxalin–6–il]etan–1,2–diamina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma está presente en una cantidad de 2 mg a 6 mg de equivalente de base.
19. Una composición farmacéutica según la reivindicación 18, en donde la N–(3,5–dimetoxifenil)–N'–(1–metiletil)–N–[3–(1–metil–1H–pirazol–4–il)quinoxalin–6–il]etano–1,2–diamina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma está presente en una cantidad de 3 mg equivalentes de base.
20. Una composición farmacéutica según la reivindicación 18, en donde la N–(3,5–dimetoxifenil)–N'–(1–metiletil)–N–[3–(1–metil–1H–pirazol–4–il)quinoxalin–6–il]etano–1,2–diamina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma está presente en una cantidad de 4 mg equivalentes de base.
21. Una composición farmacéutica según la reivindicación 18, en donde la N–(3,5–dimetoxifenil)–N'–(1–metiletil)–N–[3–(1–metil–1H–pirazol–4–il)quinoxalin–6–il]etano–1,2–diamina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma está presente

en una cantidad de 5 mg equivalentes de base.

22. Una composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 21, en donde la N-(3,5-dimetoxifenil)-N'-(1-metiletil)-N-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]etan-1,2-diamina o sal farmacéuticamente aceptable de la misma es la base de N-(3,5-dimetoxifenil)-N'-(1-metiletil)-N-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]etan-1,2-diamina.
23. Una composición farmacéutica según la reivindicación 7, que está recubierta con una película con un recubrimiento de película a base de agua.
24. Una composición farmacéutica según la reivindicación 23, en donde el revestimiento de película a base de agua es un sistema de liberación inmediata basado en PVA, sin polietilenglicol.
25. Un proceso de preparación de una composición farmacéutica caracterizado por mezclar de 0,1 a 3% p/p de un depurador de formaldehído y N-(3,5-dimetoxifenil)-N'-(1-metiletil)-N-[3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)quinoxalin-6-il]etano-1,2-diamina o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, con un portador farmacéuticamente aceptable y comprimiendo dicha mezcla en tabletas o llenando dicha mezcla en cápsulas; donde el depurador de formaldehído se selecciona entre glicina, alanina, serina, treonina, cisteína, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, tirosina, ácido aspártico, ácido glutámico, arginina, lisina, ornitina, citrulina, taurina, pirrolisina, histidina, aspartame, prolina, triptófano, citrulina, pirrolisina, asparagina, glutamina y una mezcla de los mismos; o, siempre que sea posible, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.