


REIVINDICACIONES MODIFICADAS-DICIEMBRE 2020**Solicitud de patente NC2019/0005824**

1. Un compuesto de formula:




en donde:

X es un alquileo C_{1-6} sustituido con 0, 1 o 2 R^{7b} ;

r es un entero de 0, 1, 2 o 3;

R^1 es una porción mimética de arginina seleccionada a partir del grupo que consiste de



uno de los asteriscos en cada una de las porciones


miméticas de arginina es un punto de unión a X, y los otros dos asteriscos son hidrógeno;

R^2 es hidrógeno o alquilo C_{1-6} ;

R^3 es heterociclilo de 3 a 14 elementos, o heteroarilo de 5 a 14 elementos, en donde el heterociclilo o heteroarilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, son cada uno independientemente sustituidos con 0, 1, 2 o 3 R^8 ;

R^4 es hidrógeno;

R^5 es H, R^{5a} o una porción estructural seleccionada de



L^1 y L^2 son, cada uno independientemente, alquilenos C_{1-4} ;

R^{5a} y R^{5b} son, cada uno independientemente, alquilo C_{1-6} , fenilo o heterociclilo de 5 a 7 elementos; en donde el alquilo, fenilo y heterociclilo son cada uno independientemente sustituidos con 0 a 3 R^{5d} ;

R^{5c} es alquilo C_{1-6} o carbociclilo de 5 a 7 elementos, en donde el alquilo y carbociclilo son cada uno independientemente sustituidos con 0 a 3 R^{5d} ;

R^{5d} , en cada caso, es independientemente halo, OH, alcoxi, oxo o alquilo; o alternativamente, dos R^{5d} adyacentes, junto con los átomos a los que están unidos, forman una porción de carbociclilo;

R^{7b} son, cada uno independientemente, halo, ciano, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-6} , haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato o sulfonamida;

R^8 es cada uno independientemente halo, ciano, oxo, nitro, OH, NR^aR^b , alquilo C_{1-6} , alcoxi, alquilamino, haloalquilo, haloalcoxi, haloaminoalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alquilsulfonilo, sulfonamida, carbociclilo de 3 a 6 elementos, heterociclilo de 3 a 6 elementos, arilo de 6 a 10 elementos o heteroarilo de 5 a 10 elementos; o alternativamente, dos R^8 en posiciones adyacentes, junto con los átomos a los que están unidos, forman un carbociclilo o heterociclilo; en donde el arilo y heteroarilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, son cada uno independientemente sustituidos con uno o más grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-6} , haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato y sulfonamida; y el carbociclilo y heterociclilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, son cada uno independientemente sustituidos con uno o más grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, amino, oxo, alquilo C_{1-6} , haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato y sulfonamida;

R^{12} y R^{14} , en cada caso, son independientemente halo, ciano, nitro, OH, amino, alquilo C_{1-6} , alcoxi, aminoalquilo,


haloalquilo, haloalcoxi, haloaminoalquilo, carbociclilo de 3 a 6 elementos, o heterociclilo de 3 a 6 elementos, arilo de 6 a 10 elementos, o heteroarilo de 5 a 10 elementos; en donde el arilo y heteroarilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, son cada uno independientemente sustituidos con uno o más grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, amino, alquilo C₁₋₆, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato y sulfonamida; y el carbociclilo y heterociclilo, en sí mismos o como parte de otro grupo, son cada uno independientemente sustituidos con uno o más grupos seleccionados independientemente de halo, ciano, hidroxilo, amino, oxo, alquilo C₁₋₆, haloalquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, alcoxi, haloalcoxi, amido, carbamato y sulfonamida.

R^a y R^b, en cada caso, son independientemente hidrógeno, alquilo C₁₋₁₀, carbociclilo de 3 a 10 elementos, o heterociclilo de 3 a 10 elementos; en donde el alquilo, carbociclilo, heterociclilo son cada uno independientemente sustituidos con 0, 1, 2 o 3 R¹⁴;

R^e es OH, alquilo C₁₋₄, halo, haloalquilo, cicloalquilo C₁₋₄, amino, amido, carbamato o sulfonamida;


R^f es H, Me, Et o COOEt; y

R^g se selecciona de CH₃, CH₂CH₃, CH₂CCl₃, fenilo, 4-fluorofenilo, 4-metoxifenilo, bencilo,




o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable.


2. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R^1 se selecciona del grupo que consiste de:




3. Un compuesto de conformidad con la


reivindicación 1, caracterizado porque R^3 se selecciona del grupo que consiste de







4. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R^5 es H o R^{5a} ; y R^{5a} es metilo, etilo, isopropilo, *n*-butilo, isopentilo o una porción estructural seleccionada de



5. Un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste de:

Ácido $(\pm)$ -3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido $(\pm)$ - 3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(3-

(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico.

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(1-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-4-il)propanoico

Ácido (S)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(1-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-4-il)propanoico;

Ácido (R)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(1-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-4-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(1-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-1H-pirazol-4-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(6-hidroxipiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(4-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido -3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(5-(4-(5,6,7,8-

tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido (3S)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)pirrolidin-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-etoxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(quinoxalin-2-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(quinolin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2,3-dihidrobenzofuran-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(pirido[2,3-b]pirazin-7-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1*H*-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-b]piridin-7-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1*H*-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1*H*-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)fenil)-1*H*-pirazol-1-il)propanoico;

(S)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1*H*-pirazol-1-il)propanoato de etilo;

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propoxi)-1*H*-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-(azetidin-1-il)pirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1*H*-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-b]piridin-7-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1*H*-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (R)-3-(2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-b]piridin-7-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-

il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-(azetidin-1-il)pirimidin-5-il)-3-(5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (R)-3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2-etoxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridazin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridazin-3-il)-3-(5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(5-metoxipirazin-2-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(5-metoxipirazin-2-il)-3-(5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(4-(4-

(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(5-metoxipiridin-3-il)-3-(5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-[5-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]-3-{3-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}propanoico;

Ácido 3-[5-(morfolin-4-il)piridin-3-il]-3-{3-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}propanoico;

Ácido 3-(5-metilpiridin-3-il)-3-{3-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}propanoico;

Ácido (±)-3-[5-(dimetilcarbamoil)piridin-3-il]-3-{5-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}propanoico;

Ácido (±)-3-(2-metoxipiridin-4-il)-3-{5-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}propanoico;

Ácido (±)-3-[5-(dimetilcarbamoil)piridin-3-il]-3-{3-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-

pirazol-1-il}propanoico;

Ácido (±)-4-{[4-(2-carboxi-1-{3-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}etil)piridin-2-il]amino}butanoico;

Ácido (±)-3-(5-fluoro-6-metoxipiridin-3-il)-3-{5-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}propanoico;

Ácido (±)-3-(5-metilpiridin-3-il)-3-{5-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}propanoico;

Ácido (±)-4-{[4-(2-carboxi-1-{5-[3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil]-1H-pirazol-1-il}etil)piridin-2-il]amino}butanoico;

Ácido 3-(5-(2-metoxietoxi)piridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (R)-3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(pirimidin-5-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2-hidroxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-

(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(3-(3-((S)-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(5-(3-((S)-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(3-(3-((R)-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-((S)-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-((R)-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(5-(3-((R)-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(5-(3-((S)-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(5-(3-((R)-1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(5-morfolinopiridin-3-il)-3-(5-(3-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(3-(3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-pirido[2,3-b]azepin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(5-(3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-pirido[2,3-b]azepin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(3-(3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-pirido[2,3-b]azepin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(3-(3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-pirido[2,3-b]azepin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (±)-3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(5-(3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-pirido[2,3-b]azepin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(1-bencil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

(S)-3-(6-(benciloxi)piridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoato de etilo;

Ácido (S)-3-(1-(ciclopropilmetil)-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-

naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido (S)-3-(6-(ciclopropilmetoxi)piridin-3-il)-3-(3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)propanoico;

Ácido 3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(1-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-3-il)propanoico;

Ácido (R)-3-(4-fluoro-3-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-1H-pirazol-1-il)-3-(2-metilpirimidin-5-il)propanoico;

Ácido 3-(quinoxalin-6-il)-3-(4-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(6-(dimetilamino)piridin-3-il)-3-(4-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(2-etoxipirimidin-5-il)-3-(4-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(6-(dimetilamino)piridin-3-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(4-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(2-metilpirimidin-5-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(5-metilpiridin-3-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido (3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(4-(3-(1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)tiazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(1-metil-5-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-1H-imidazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(6-metoxipiridin-3-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(quinolin-3-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)propanoico;

Ácido 3-(2-metoxipirimidin-5-il)-3-(4-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)propanoico;

o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable.

11. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, y un portador.