

REIVINDICACIONES

1. Un método para tratar un sujeto diagnosticado con un deterioro cognitivo, caracterizado porque el método comprende administrar una cantidad efectiva de una fracción de plasma usando un régimen de dosificación de dosis por pulsos.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la fracción de plasma es una fracción de proteína de plasma.

3. El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque la fracción de proteína de plasma comprende entre 83% y 95% de albúmina.

4. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque la fracción de proteína de plasma es una fracción de proteína de plasma comercialmente disponible.

5. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la fracción de plasma es un producto de proteínas de plasma enriquecido en proteínas.

6. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la fracción de plasma se deriva del plasma de un grupo de individuos jóvenes.

7. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la fracción de plasma se produce de un producto de sangre de mamífero.

8. El método de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque el producto de sangre de mamífero es un producto de sangre humana.

9. Un método para tratar un sujeto diagnosticado con un deterioro cognitivo, caracterizado porque el método comprende administrar una cantidad efectiva de plasma joven usando un régimen de dosificación de dosis por pulsos.

10. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende además monitorear al sujeto en busca de una función cognitiva mejorada.

11. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el sujeto es un mamífero.

12. El método de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque el mamífero es un humano.

13. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones

anteriores, caracterizado porque la fracción de plasma o plasma joven se deriva de un grupo de individuos jóvenes.

14. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el régimen de dosificación de dosis por pulsos comprende administrar la fracción de plasma o plasma joven durante cinco a siete días consecutivos.

15. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la cantidad efectiva es 100 mL.

16. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque la cantidad efectiva es 250 mL.

17. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el sujeto sigue un régimen de ejercicio después que el régimen de dosificación de dosis por pulsos se ha administrado completamente.

18. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque la administración aumenta el número de sinapsis en el sujeto.

19. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque la administración aumenta la integridad sináptica del sujeto.

20. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque la administración aumenta la integridad de red neuronal del sujeto.

21. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque la administración aumenta la conectividad neuronal del sujeto.

22. Un kit para uso en el tratamiento de un sujeto para un trastorno cognitivo, caracterizado porque el kit comprende un recipiente que comprende una fracción de plasma de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 y 13.