


REIVINDICACIONES

1. Una forma I de oxalato de (R)-(1-metilpirrolidina-3-il)metil(3'-cloro-4'-fluoro-[1,1'-bifenil]-2-il)carbamato representado por la siguiente fórmula 1, en donde un patrón de difracción de polvo de rayos X (XRPD) comprende picos de difracción en unos ángulos de difracción 2θ de $13,402 \pm 0,2^\circ$, $14,300 \pm 0,2^\circ$, $18,519 \pm 0,2^\circ$, $19,577 \pm 0,2^\circ$ y $21,499 \pm 0,2^\circ$:

[Fórmula 1]



2. La forma I de oxalato de (R)-(1-metilpirrolidina-3-il)metil(3'-cloro-4'-fluoro-[1,1'-bifenil]-2-il)carbamato, de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el patrón de XRPD comprende adicionalmente al menos un pico de difracción que se selecciona de entre el grupo que consiste en unos ángulos de difracción 2θ de $7,182 \pm 0,2^\circ$, $8,379 \pm 0,2^\circ$, $8,679 \pm 0,2^\circ$, $11,180 \pm 0,2^\circ$, $16,320 \pm 0,2^\circ$, $16,659 \pm 0,2^\circ$, $17,321 \pm 0,2^\circ$, $17,861 \pm 0,2^\circ$, $20,632 \pm 0,2^\circ$, $22,180 \pm 0,2^\circ$, $22,922 \pm 0,2^\circ$, $23,339 \pm 0,2^\circ$, $24,019 \pm 0,2^\circ$, $24,297 \pm 0,2^\circ$, $24,699 \pm 0,2^\circ$, $25,441 \pm 0,2^\circ$, $27,239 \pm 0,2^\circ$ y $29,880 \pm 0,2^\circ$.

3. La forma I de oxalato de (R)-(1-metilpirrolidina-3-il)metil(3'-cloro-4'-fluoro-[1,1'-bifenil]-2-il)carbamato, de acuerdo con la reivindicación 1, en donde tal forma I tiene una temperatura inicial de $121,85^\circ\text{C}$ ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) y un pico endotérmico de $126,96^\circ\text{C}$ ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) durante un análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC), si una tasa de calentamiento es de $20^\circ\text{C} / \text{min}$.