


REIVINDICACIONES

1. Una forma II de oxalato de (R)-(1-metilpirrolidina-3-il)metil(3'-cloro-4'-fluoro-[1,1'-bifenil]-2-il)carbamato representado por la siguiente fórmula 1, en donde el patrón de XRPD comprende picos de difracción en unos ángulos de difracción 2θ de $13,439 \pm 0,2^\circ$, $14,481 \pm 0,2^\circ$, $18,501 \pm 0,2^\circ$, $21,779 \pm 0,2^\circ$ y $23,358 \pm 0,2^\circ$:

[Fórmula 1]



2. La forma II de oxalato de (R)-(1-metilpirrolidina-3-il)metil(3'-cloro-4'-fluoro-[1,1'-bifenil]-2-il)carbamato, de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el patrón de XRPD comprende adicionalmente al menos un pico de difracción que se selecciona de entre el grupo que consiste en unos ángulos de difracción 2θ de $8,360 \pm 0,2^\circ$, $11,340 \pm 0,2^\circ$, $16,401 \pm 0,2^\circ$, $16,739 \pm 0,2^\circ$, $17,360 \pm 0,2^\circ$, $17,938 \pm 0,2^\circ$, $22,179 \pm 0,2^\circ$, $24,299 \pm 0,2^\circ$, $24,641 \pm 0,2^\circ$, $25,500 \pm 0,2^\circ$, $26,422 \pm 0,2^\circ$, $27,260 \pm 0,2^\circ$, $28,201 \pm 0,2^\circ$ y $29,878 \pm 0,2^\circ$.

3. La forma II de oxalato de (R)-(1-metilpirrolidina-3-il)metil(3'-cloro-4'-fluoro-[1,1'-bifenil]-2-il)carbamato, de acuerdo con la reivindicación 1, en donde tal forma II tiene la temperatura inicial de $127,39^\circ\text{C}$ ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) y el pico endotérmico de $130,20^\circ\text{C}$ ($\pm 0,5^\circ\text{C}$) durante el análisis de DSC, si la tasa de calentamiento es de $20^\circ\text{C} / \text{min}$.