

REIVINDICACIONES

1. Una forma cristalina de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, en donde la forma cristalina
5 es sal monohidrocloreto de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, Forma 2, que tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo (XRPD) con picos característicos en 8.6 ° 2-Theta, 9.2 ° 2-Theta, 9.5 ° 2-Theta, 11.7 ° 2-Theta, 12.6 ° 2-Theta, 14.3 ° 2-Theta, 15.6 ° 2-Theta, 16.2 ° 2-Theta, 16.7 °
10 2-Theta, 17.2 ° 2-Theta, 18.5 ° 2-Theta, 19.0 ° 2-Theta, 19.6 ° 2-Theta, 19.8 ° 2-Theta, 20.4 ° 2-Theta, 20.7 ° 2-Theta, 21.6 ° 2-Theta, 22.5 ° 2-Theta, 23.5 ° 2-Theta, y 27.7° 2-Theta.
2. Una forma cristalina de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo, en donde la forma cristalina
15 es sal de fumarato de 4-(2-(pirrolidin-1-il)-4-(trifluorometil)bencil)piperazin-1-carboxilato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ilo que tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo (XRPD) con picos característicos en 7.1 ° 2-Theta, 8.0 ° 2-Theta, 12.2 ° 2-Theta, 12.8 ° 2-Theta, 14.2 ° 2-Theta, 14.4 ° 2-Theta, 17.2 ° 2-Theta, 17.7 ° 2-Theta, 18.0 ° 2-Theta, 18.4 ° 2-Theta, 18.8 ° 2-Theta, 20.0 ° 2-Theta, 20.2 ° 2-Theta, 20.7 ° 2-Theta, 21.3 ° 2-Theta, 23.4 ° 2-Theta, 24.4 ° 2-Theta, 26.0 ° 2-Theta, 27.6 ° 2-Theta, 29.5° 2-Theta.
3. Una composición farmacéutica que comprende la forma cristalina de
25 cualquiera de las reivindicaciones 1-2, y al menos un ingrediente inactivo seleccionado de vehículos, diluyentes y excipientes farmacéuticamente aceptables.