


REIVINDICACIONES

1. Un método para preparar una formulación oral de rápida acción que comprende:
- 5 añadir
- (i) un cannabinoide descarboxilado con una solubilidad acuosa de menos de 0,1 mg/ml;
- (ii) una molécula de restauración del séquito; y
- (iii) *N*-[8-(2-hidroxibenzoil) amino] caprilato (SNAC)
- 10 a la formulación oral.
2. El método de la reivindicación 1, en donde el cannabinoide descarboxilado y la molécula de restauración del séquito son añadidos en una relación de 1000:1, 500:1, 200:1, 100:1, 50:1, 20:1, 10:1, 1:1, 0,2:1 o 0,1:1, y el
- 15 cannabinoide descarboxilado y el SNAC son añadidos en una relación de entre 1:2000 y 100:1.
3. El método de la reivindicación 1, en donde el cannabinoide descarboxilado comprende tetrahidrocannabinol descarboxilado (THC) y/o cannabinodiol
- 20 descarboxilado (CBD).
4. El método de la reivindicación 1, en donde la molécula de restauración del séquito comprende un cannabinoide adicional; un terpeno; un flavonoide; y/o un compuesto volátil que confiere aroma y sabor derivado del cannabis.
- 25 5. Un método para preparar una formulación oral de rápida acción que comprende:
- añadir
- (i) un cannabinoide con una solubilidad acuosa de menos de 0,1 mg/ml;
- 30 (ii) una molécula de restauración del séquito; y
- (iii) un aminoácido graso *N*-acilado o una sal de estos que comprende la fórmula:



a la formulación oral

en donde X y Z son independientemente H, un catión monovalente, un catión


metálico divalente o un catión orgánico.

6. El método de la reivindicación 5, en donde el cannabinoide y la molécula de restauración del séquito son añadidos en una relación de 1000:1, 500:1, 200:1, 100:1, 50:1, 20:0, 10:1, 1:1, 0,2:1 o 0,1:1, y el cannabinoide y el aminoácido graso *N*-acilado o sal de estos son añadidos en una relación de entre 1:2000 y 100:1.
7. El método de la reivindicación 5, en donde el aminoácido graso *N*-acilado comprende *N*-[8-(2-hidroxibenzoil) amino] caprilato (SNAC).
8. El método de la reivindicación 5, en donde el cannabinoide comprende tetrahidrocannabinol (THC) y/o cannabinodiol (CBD).
9. El método de la reivindicación 8, en donde el THC comprende delta-9-THC.
10. El método de la reivindicación 5, en donde la molécula de restauración del séquito comprende un cannabinoide adicional; un terpeno; un flavonoide; y/o un compuesto volátil que confiere aroma y sabor derivado del cannabis.
11. El método de la reivindicación 10, en donde el cannabinoide adicional comprende Δ 8-tetrahidrocannabinol (Δ 8-THC), Δ 11-tetrahidrocannabinol (Δ 11-THC), cannabigerol (CBG), cannabicromeno (CBC), cannabinol (CBN), cannabinodiol (CBDL), cannabiciolol (CBL), cannabivarina (CBV), tetrahidrocannabivarina (THCV), cannabidivarina (CBDV), cannabicromevarina (CBCV), cannabigerovarina (CBGV), éter monometílico de cannabigerol (CBGM), ácido cannabinerólico, ácido cannabidiólico (CBDA), variante de propilo de cannabinol (CBNV), cannabitriol (CBO), ácido tetrahidrocannabinólico (THCA) y/o ácido tetrahidrocannabivarínico (THCVA).
12. El método de la reivindicación 10, en donde el terpeno comprende β -mirceno, α -pineno, β -pineno, linalool, d-limoneno, β -cariofileno, óxido cariofileno, nerolidol, fitol, ocimeno, terpinoleno, terpineno, humuleno, careno, bisabolol, valenceno, elemeno, farneseno, mentol, geraniol, guaíol, camfeno, camfor, eucaliptol, pulegono, sabineno y/o felandreno.
13. El método de la reivindicación 10, en donde el flavonoide comprende cannaflavina A, cannaflavina B, cannaflavina C, vitexina, isovitexina,

apigenina, kaempferol, quercetina, luteolina, cinnamaldehído y/o orientina.

14. El método de la reivindicación 10, en donde el compuesto volátil comprende
2-heptanona, heptanoato de metilo, salicilato de metilo, antranilato de metilo
y/o hexanal.

15. Una formulación oral que comprende un cannabinoide descarboxilado con
una solubilidad acuosa de menos de 0,1 mg/ml; una molécula de restauración
del séquito; y un aminoácido graso *N*-acilado o una sal de estos que
comprende la fórmula:



en donde X y Z son independientemente H, un catión monovalente, un catión
metálico divalente o un catión orgánico.

16. La formulación oral de la reivindicación 15, en donde el cannabinoide
descarboxilado y la molécula de restauración del séquito están presentes en
una relación de 1000:1, 500:1, 200:1, 100:1, 50:1, 20:0, 10:1, 1:1, 0,2:1 o
0,1:1, y el cannabinoide descarboxilado y el aminoácido graso *N*-acilado o sal
de estos están presentes en una relación de entre 1:2000 y 100:1.

17. La formulación oral de la reivindicación 15,
en donde X es H, un catión monovalente que comprende sodio o potasio, un
catión metálico divalente que comprende calcio o magnesio, o un catión
orgánico que comprende amonio o tetrametilamonio; y
en donde Z es H, un catión monovalente que comprende sodio o potasio, o
un catión divalente que comprende calcio o magnesio.

18. La formulación oral de la reivindicación 15, en donde el aminoácido graso *N*-
acilado comprende *N*-[8-(2-hidroxibenzoil) amino] caprilato (SNAC).

19. La formulación oral de la reivindicación 15, en donde el cannabinoide
descarboxilado comprende tetrahidrocannabinol descarboxilado (THC) y/o
cannabinodiol descarboxilado (CBD).

20. La formulación oral de la reivindicación 15, en donde la molécula de restauración del séquito comprende
- un cannabinoide adicional seleccionado de Δ 8-tetrahidrocannabinol (Δ 8-THC), Δ 11-tetrahidrocannabinol (Δ 11-THC), cannabigerol (CBG),
5 cannabicromeno (CBC), cannabinol (CBN), cannabinodiol (CBDL),
cannabiciolol (CBL), cannabivarina (CBV), tetrahidrocannabivarina (THCV),
cannabidivarina (CBDV), cannabicromevarina (CBCV), cannabigerovarina (CBGV), éter monometílico de cannabigerol (CBGM), ácido cannabinerólico, ácido cannabidiólico (CBDA), variante de propilo de cannabinol (CBNV),
10 cannabitriol (CBO), ácido tetrahidrocannabinólico (THCA) y/o ácido tetrahidrocannabivarínico (THCVA);
- un terpeno seleccionado de β -mirceno, α -pineno, β -pineno, linalool, d-limoneno, β -cariofileno, óxido cariofileno, nerolidol, fitol, ocimeno, terpinoleno, terpineno, humuleno, careno, bisabolol, valenceno, elemeno, farneseno,
15 mentol, geraniol, guaiol, camfeno, camfor, eucaliptol, pulegono, sabineno y/o felandreno;
- un flavonoide seleccionado de cannaflavina A, cannaflavina B, cannaflavina C, vitexina, isovitexina, apigenina, kaempferol, quercetina, luteolina, cinnamaldehído y/o orientina; y/o
- 20 un compuesto volátil seleccionado de 2-heptanona, heptanoato de metilo, salicilato de metilo, antranilato de metilo y/o hexanal.