


REIVINDICACIONES

1. Letermovir según la fórmula (I),



Fórmula (I),

que está en el estado amorfo y adecuado para su uso en formas de dosificación oral sólida, en el que dicho letermovir se **caracteriza por:**

- i) un área superficial específica de al menos 1 m²/g cuando se somete a un análisis del área superficial específica BET y/o
 - ii) una mediana del valor de la distribución del tamaño de partícula de no más de 10 µm cuando se somete a un análisis de la distribución del tamaño de partícula.
2. Formulación farmacéutica sólida, que comprende letermovir en el estado amorfo como se define en la reivindicación 1, que comprende adicionalmente povidona, croscarmelosa sódica, celulosa microcristalina, sílice anhidra coloidal y estearato de magnesio, en la que dicho letermovir en el estado amorfo está comprendido en una cantidad del 20,0 % al 70,0 % (peso/peso), dicha povidona está comprendida en una cantidad del 1,0 % al 30,0 % (peso/peso), dicha croscarmelosa sódica está comprendida en una cantidad del 1,0 % al 30,0 % (peso/peso), dicha celulosa microcristalina está comprendida en una cantidad del 10,0 % al 90,0 % (peso/peso), dicha sílice anhidra coloidal está comprendida en una cantidad del 0,1 % al 10,0 % (peso/peso) y dicho estearato de magnesio está comprendido en una cantidad del 0,01 % al 10,0 % (peso/peso).
3. Formulación farmacéutica sólida según la reivindicación 2, en la que dicho letermovir en el estado amorfo está comprendido en una cantidad del 30,0 % al 50,0 % (peso/peso), dicha povidona está comprendida en una cantidad del

2,0 % al 10,0 % (peso/peso), dicha croscarmelosa sódica está comprendida en una cantidad del 2,0 % al 10,0 % (peso/peso), dicha celulosa microcristalina está comprendida en una cantidad del 20,0 % al 70,0 % (peso/peso), dicha sílice anhidra coloidal está comprendida en una cantidad del 0,5 % al 5,0 % (peso/peso) y dicho estearato de magnesio está comprendido en una cantidad del 0,1 % al 5,0 % (peso/peso).

4. Formulación oral farmacéutica sólida según las reivindicaciones 2 o 3, que comprende al menos 5 mg de letermovir en el estado amorfo.