

REIVINDICACIONES

1. Un comprimido que comprende 25% de metanosulfonato de 2-metil-1-[(4-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]-6-{[2-(trifluorometil)piridin-4-il]amino}-1,3,5-triazin-2-il)amino] propan-2-ol; excipientes intragranulares que comprenden 39.50% de celulosa microcristalina, 2% de hidroxipropilcelulosa, 6% de glicolato de almidón de sodio, 1% de laurilsulfato de sodio, 1% de succinato de acetato de hipromelosa, 1.5% de dióxido de silicio coloidal y 0.75% de estearato de magnesio; y excipientes extragranulares que comprenden 20% de celulosa microcristalina, 2% de glicolato de almidón de sodio, 0.5% de dióxido de silicio coloidal y 0.75% de estearato de magnesio, todo basado en el peso total del comprimido.
2. El comprimido de la reivindicación 1 que comprende 25, 50, 100, 150 o 200 mg de concentración de metanosulfonato de 2-metil-1-[(4-[6-(trifluorometil) piridin-2-il]-6-{[2-(trifluorometil)piridin-4-il]amino}-1,3,5-triazin-2-il)amino] propan-2-ol. .
3. El comprimido de la reivindicación 1, en donde el comprimido comprende ≤ 10 % de metanosulfonato de 2-metil-1-[(4-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]-6-{[2(trifluorometil)piridin-4-il]amino}-1,3,5-triazin-2-il)amino]propan-2-ol amorfo, 2-metil-1[(4-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]-6-{[2-(trifluorometil)piridin-4-il]amino}-1,3,5-triazin-2-il)amino] propan-2-ol o una mezcla de estos.
4. El comprimido de la reivindicación 1, en donde el comprimido es un comprimido recubierto con alcohol polivinílico.