


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con la fórmula IA o una de sus sales farmacéuticamente aceptables:



en donde

10 R^A se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alcoxi C1-C6, carbociclo C3-C14, (carbociclo C3-C14)-alquilo C1-C6, heterociclo de 3 a 14 miembros o heterociclo-alquilo C1-C6 (en donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S), (heterociclo de 3 a 14 miembros)oxi-, arilo C6-C14, (aril C6-C14)-alquilo C1-C6, aril C6-C14-oxi-, $-(CH_2)_{0-6}NR^1(CH_2)_{0-6}C(O)R^2$, NR^1R^2 , $C(O)NR^1R^2$, $NR^1C(NR^2)NR^1R^2$, $NR^1C(NR^2)(=NR^1)$, SR^1 , -CN y -OH;

20 en donde cada alquilo, alquenilo, alcoxi, arilo y heterociclo puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en R^1 , OR^1 , halo, $-N=N-R^1$, NR^1R^2 , $-(alquil\ C1-C6)NR^1R^2$, $-C(O)OR^1$, $-C(O)NR^1R^2$, $-OC(O)R^1$, -CN, $-OP(O)(OR^1)_{1-2}$ y oxo;

R^B se selecciona del grupo que consiste en H, alquenilo C2-C6 y alquilo C1-C6, en donde R^B puede estar sustituido con uno o más R¹;

R^C, R^D y R^E se seleccionan, de modo independiente, del grupo que consiste en carbociclo C3-C14, arilo C6-C14 y heterociclo de 3 a 14 miembros (en donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S),

en donde R^C, R^D y R^E pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en R¹, -OR¹, halo, -NR¹R², -(alquil C1-C6)-NR¹R², -C(O)OR¹, -C(O)NR¹R², -NO₂, -CN y oxo; y

R¹ y R² se seleccionan, de modo independiente, del grupo que consiste en H, D (²H), -CN, -OH, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, NH₂, -S(O)₀₋₂-(alquilo C1-C6), -S(O)₀₋₂-(arilo C6-C14), -C(O)(alquilo C1-C6), -C(O)(carbociclo C3-C14), -carbociclo C3-C14, arilo C6-C14, y heterociclo de 3 a 14 miembros o heterociclo(alquil C1-C6)-(en donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S),

en donde cada resto de alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, carbociclo y heterociclo de R¹ y R² puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste

en hidroxilo, halo, $-NH_2$, $-NHC(O)(Oalquilo\ C1-C6)$,
 $-NO_2$, $-CN$, oxo, $-C(O)OH$, $-C(O)O(alquilo\ C1-C6)$, $-$
alquil $C1-C6-(alcoxi\ C1-C6)$, $-C(O)NH_2$, alquilo $C1-$
 $C6$, $-C(O)alquilo\ C1-C6$, $-Oalquilo\ C1-C6$, $-$
5 $Si(alquil\ C1-C6)_3$, arilo $C6-C14$, $-(alquil\ C1-$
 $C6)(arilo\ C6-C14)$, heterociclo de 3 a 14 miembros
o heterociclo(alquil $C1-C6)$ -(en donde 1 a 4
miembros del anillo heterociclo son heteroátomos
seleccionados de N, O y S) y $-O(arilo\ C6-C14)$,

10 en donde cada alquilo, arilo y heterociclo en
 R^1 y R^2 puede estar sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo que
consiste en hidroxilo, $-Oalquilo\ C1-C6$, halo, $-$
 NH_2 , $-(alquil\ C1-C6)NH_2$, $-C(O)OH$, CN y oxo;

15 en donde el compuesto no es 4-(3-adamantil-7-oxo-2-
ciclopropil-5-(4-(trifluorometil)fenil)-4,7-
dihidropirazolo[1,5-a]pirimidin-6-il)benzonitrilo).

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o
20 una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en
donde R^E se selecciona de carbociclo $C3-C14$ y arilo
 $C6-C14$.

3. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las
25 reivindicaciones 1 o 2, o una de sus sales

farmacéuticamente aceptables, en donde R^D y R^E se seleccionan, de modo independiente, de carbociclo C5-C7 y arilo C6-C10.

5 4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^D y R^E se seleccionan, de modo independiente, de ciclopentilo, ciclopentenilo, ciclohexilo, ciclohexenilo y fenilo.

10

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde uno de R^D y R^E es ciclohexilo o ciclohexenilo y el otro es fenilo.

15

6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde

20 R^A se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alcoxi C1-C6, carbociclo C3-C14, (carbociclo C3-C14)-alquilo C1-C6, heterociclo de 3 a 14 miembros o heterociclo(alquilo C1-C6)- (en donde 1 a 4
25 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos

seleccionados de N, O y S), arilo C6-C14, (aril C6-C14)-alquilo C1-C6, aril C6-C14-oxi, $-(CH_2)_{0-6}NR^1(CH_2)_{0-6}C(O)R^2$, NR^1R^2 , $NR^1C(NR^2)NR^1R^2$, -CN y -OH.

- 5 7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^A se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-C6, $-(CH_2)_{0-6}NR^1(CH_2)_{0-6}C(O)R^2$, NR^1R^2 y $NR^1C(NR^2)NR^1R^2$.

10

8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^A es alquilo C1-C6 o NR^1R^2 .

15

9. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 8, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^A es NR^1R^2 .

20


10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 9, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^1 es H.

25

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en

donde el compuesto es uno de acuerdo con la fórmula

IB:



en donde

5 R^C es un carbociclo C3-C14 o un heterociclo de 3 a 14 miembros (en donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S),

10 cada uno puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, $-NH_2$, arilo C6-C14, (aril C6-C14)-alquilo C1-C6, carboxi, $-CN$, oxo, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y $-NH$ (alquilo C1-C6),

15 en donde el alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y NH (alquil C1-C6) están sustituidos, de modo independiente y opcional, con uno o más de hidroxilo, halógeno, $-NH_2$, carboxi, $-CN$ u oxo;

20 R^D y R^E son, de modo independiente, un carbociclo C3-C14 o un heterociclo de 3 a 14 miembros (en donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S),

 cada uno puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste

en hidroxilo, halógeno, -NH₂, arilo C6-C14, (arilo C6-C14)-alquilo C1-C6, carboxi, -CN, oxo, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y -NH(alquilo C1-C6),

en donde el alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y NH(alquilo C1-C6) están sustituidos, de modo independiente y opcional, con uno o más de hidroxilo, halógeno, -NH₂, carboxi, -CN u oxo; y

R₁ se selecciona del grupo que consiste en H, alquilo C1-C6, carbociclo C3-C14 y heterociclo de 3 a 14 miembros (en donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S),

cada uno puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste

en hidroxilo, halógeno, -NH₂, -NO₂, -CN, oxo, carboxi, -C(O)Oalquilo C1-C6, (alquilo C1-C6)Oalquilo C1-C6, -C(O)NH₂, alquilo C1-C6, -C(O)H, alcoxi C1-C6, (alquilo C1-C6)N(H)-arilo-, (arilo C6-C14)alquilo C1-C6, heteroarilo de 5 a 7 miembros, (heteroarilo de 5 a 7 miembros)-alquilo C1-C6, arilo C6-C14-oxi, (arilo C6-C14)(alcoxi C1-C6)-, (heteroarilo de 5 a 7 miembros)oxi- y (heteroarilo de 5 a 7 miembros)(alcoxi C1-C6)-,

en donde el alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, (alquilo C1-C6)N(H)-, -C(O)Oalquilo C1-C6, (alquilo C1-

C6)Oalquilo C1-C6, -C(O)NH₂, arilo C6-C14, (aril C6-C14)alquilo C1-C6, heteroarilo de 5 a 7 miembros, (heteroarilo de 5 a 7 miembros)-alquilo C1-C6, aril C6-C14-oxi, (aril C6-C14)(alcoxi C1-C6)-, (heteroarilo de 5 a 7 miembros)oxi- y (heteroarilo de 5 a 7 miembros)(alcoxi C1-C6)-, pueden estar sustituidos con uno o más de hidroxil, halógeno, -NH₂, (alquil C1-C6)N(H)-, -COOH, -CN u oxo, en donde cada heteroarilo en R¹ tiene 1 a 4 miembros del anillo heteroarilo que son heteroátomos seleccionados de N, O y S.

12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^D es carbociclo C3-C14 que puede estar sustituido con uno o más miembros del grupo que consiste en hidroxil, halógeno, -NH₂, -C(O)OH, -CN, oxo, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y (alquil C1-C6)N(H)-,

en donde el alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y (alquil C1-C6)N(H)- pueden estar sustituidos con uno o más de hidroxil, halógeno, -NH₂, -C(O)OH, -CN u oxo.

13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^D es fenilo.

5 14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^D es ciclohex-1-en-1-ilo.

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o
10 una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^E es carbociclo C3-C14 que puede estar sustituido con uno o más miembros del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, -NH₂, -C(O)OH, -CN, oxo, alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y (alquil C1-C6)N(H)-,
15 C6)N(H)-,

en donde el alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y (alquil C1-C6)N(H)- pueden estar sustituidos con uno o más de hidroxilo, halógeno, -NH₂, -C(O)OH, -CN u oxo.

20

16. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^E se selecciona del grupo que consiste en ciclohex-1-en-1-ilo, (2H₉)ciclohex-1-en-1-ilo, ciclohexan-1,3-dien-1-ilo, 4,4-difluorociclohex-1-
25

en-1-ilo, ciclopent-1-en-1-ilo, ciclopentilo,
piridin-3-ilo, piridin-2-ilo, 4-metoxipiridin-3-
ilo, piridin-2-ilo, 1H-pirazol-4-ilo, 1H-pirrol-3-
ilo, 4,4-difluoropiperidin-1-ilo, 5,6-dihidro-2H-
5 piran-3-ilo, 3,6-dihidro-2H-piran-4-ilo, 1H-pirrol-
3-ilo, 1H-pirrol-1-ilo, tetrahidrofuran-3-ilo, 3,3-
difluoropirrolidin-1-ilo y 3,6-dihidro-2H-piran-4-
ilo.


10 17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en
donde R^E es fenilo.

15 18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en
donde R^D es ciclohex-1-en-1-ilo.


20 19. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en
donde R^C es carbociclo C3-C14 o heterociclo de 3 a
14 miembros (en donde 1 a 4 miembros del anillo
heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O
y S) y que puede estar sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste


en hidroxilo, halógeno, $-NH_2$, $-C(O)OH$, $-CN$, oxo,
 alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, y (alquil C1-C6)N(H)-,
 en donde el alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6 y (alquil
 C1-C6)N(H)- pueden estar sustituidos con
 5 hidroxilo, halógeno, $-NH_2$, $-C(O)OH$, $-CN$ y oxo.

20. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o
 una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en
 donde R^C se selecciona del grupo que consiste en 4-
 10 hidroxifenilo, 4-clorofenilo, 4-fluorofenilo, 4-
 metoxifenilo, 4-etoxifenilo, 4-
 trifluorometoxifenilo, 4-hidroxio-2-metilfenilo, 4-
 hidroxio-2-metoxifenilo, 3,4-dihidroxifenilo, 4-
 (2,2,2-trifluoroetoxi)fenilo, 4-(2-
 15 (dimetilamino)etoxi)fenilo, 3-fluoro-4-
 hidroxifenilo, 3-fluoro-4-metoxifenilo, 2-cloro-4-
 hidroxifenilo, 2-fluoro-4-metoxifenilo, 3-amino-4-
 hidroxifenilo, 3-amino-4-fluorofenilo, 3-(N,N-
 dimetilaminoetoxi)-4-hidroxifenilo, 3-cloro-2-
 20 hidroxifenilo, 3-hidroxietoxi-4-hidroxifenilo



21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^C se selecciona del grupo que consiste en 6-metoxipiridin-3-ilo, 2-metoxipiridin-4-ilo, 1H-pirazol-4-ilo, quinolin-6-ilo, 2-metilquinolin-6-ilo, 2-metoxiquinolin-6-ilo, 2-hidroximatilquinolin-6-ilo, 3-hidroxi-2-metilquinolin-6-ilo, 2-aminoquinazolin-6-ilo, 4-aminoquinazolin-6-ilo, cinnolin-6-ilo, quinoxalin-6-ilo, 2-cloroquinoxalin-6-ilo, 3-cloroquinoxalin-6-ilo, 3-aminoquinoxalin-6-ilo, 3-hidroxiquinoxalin-6-ilo, 3-metoxiquinoxalin-6-ilo, 1,8-naftiridin-3-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-6-ilo,









- 5 22. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en
donde R^C es 4-metoxifenilo.
- 10 23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o
una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en
donde R^1 es un heterociclo de 3 a 14 miembros que
puede estar sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo que consiste en hidroxilo,
halógeno, $-NH_2$, $-NO_2$, $-C(O)OH$, $-C(O)O$ alquilo C1-C6,
15 (alquil C1-C6) $N(H)C(O)-$, $-CN$, oxo, alquilo C1-C6, $-C(O)H$,
alcoxi C1-C6 y (alquil C1-C6) $N(H)-$,
en donde el alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, (alquil
C1-C6) $N(H)-$, $-C(O)O$ alquilo C1-C6 y (alquil C1-
C6) $N(H)C(O)-$ pueden estar sustituidos con uno o

más de hidroxilo, halógeno, $-NH_2$, (alquil C1-C6) $N(H)-$, $-C(O)H$, $-CN$ u oxo.



24. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^1 se selecciona del grupo que consiste en piridin-2-ilo, pirazin-2-ilo, pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, pirimidin-5-ilo, piridazin-3-ilo, 1,3,5-triazin-2-ilo, y 1,2,4-triazin-3-ilo, cada uno de los cuales puede estar sustituido con uno o más de F, Cl, CN, OH, $-NO_2$, $-NH_2$, $-NHMe$, $-C(O)NH_2$ o metoxi.

25. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^1 se selecciona del grupo que consiste en:









5




26. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en donde R^1 se selecciona del grupo que consiste en:




5





27. Un compuesto de la fórmula (I), o una de sus sales farmacéuticamente aceptables:



en donde:









anillo A y anillo B son, de modo independiente, un carbociclo o un heterociclo de 3 a 14 miembros, (donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S), y donde cada uno puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, amino, carboxi, CN, oxo, alquilo, alcoxi y alquilamino en donde dicho alquilo, alcoxi y alquilamino pueden estar sustituidos con hidroxilo, halógeno, amino, carboxi, CN y oxo;











el anillo C es un carbociclo o un heterociclo de 3 a 14 miembros (donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S), donde cada uno puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, amino, carboxi, CN, oxo, alquilo, alcoxi y alquilamino en donde dicho alquilo, alcoxi y alquilamino pueden estar sustituidos con hidroxilo, halógeno, amino, carboxi, CN y oxo; y











R₁ es H o alquilo, un carbociclo o un heterociclo de 3 a 14 miembros (donde 1 a 4 miembros del anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados de N, O y S), donde cada uno puede estar sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en hidroxilo, halógeno, amino, NO₂, CN, oxo, carboxi, alcóxicarbonilo, alcóxialquilo, aminocarbonilo, alquilo, acilo, alcoxi, alquilamino arilo, aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo, ariloxi, aralcoxi, heteroariloxi y heteroaralcoxi en donde dicho alquilo, alcoxi, alquilamino, alcóxicarbonilo, alcóxialquilo, aminocarbonilo, arilo, aralquilo, heteroarilo, heteroaralquilo, ariloxi, aralcoxi, heteroariloxi y heteroaralcoxi











pueden estar sustituidos con hidroxilo, halógeno, amino, alquilamino, carboxi, CN u oxo.











28. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 27, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, que es:











101		102	
103		104	
105		106	
107		108	











109		110	
111		112	
113		114	
115		116	
117		118	











119		120	
121		122	
123		124	
125		126	
127		128	











129		130	
131		132	
133		134	
135		136	
137		138	











139		140	
141		142	
143		144	
145		146	
147		148	





149		150	
151		152	
153		154	
155		156	
157		158	

159		160	
161		162	
163		164	
165		166	
167		168	




169		170	
171		172	
173		174	
175		176	
177		178	










179		180	
181		182	
183		184	
185		186	
187		188	











189		190	
191		192	
193		194	
195		196	
197		198	











199		200	
201		203	











29. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, que es:

		204	
205		206	

207		208	
209		210	
211		212	
213			
215		216	










217		218	
219		220	
221		222	
223		224	
225		226	










227		228	
229		230	
231		232	
233		234	
235		236	

237		238	
239		240	
241		242	
243		244	
245		246	











247		248	
249		250	
251		252	
253		254	
255		256	
257		258	











259		260	
261		262	
263		264	
265		266	
267		268	










269			
271		272	
273		274	
275		276	
277		278	

279		280	
281		282	
283			
285		286	
287		288	











		290	
		292	
		294	
297		298	
299		300	
301		302	


303		304	
305		306	
307		308	
309		310	
311		312	

313		314	
315		316	
317		318	
319		320	
321		322	


323		324	
325		326	
327		328	
329		330	
331			

333		334	
335		336	
337		338	
339		340	
		346	

347		348	
349		350	
351		352	
353		354	
355		356	


		358	
--	--	-----	---

30. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque es




5 , o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

31. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque es




10 , o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

32. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque es




, o una de sus sales
farmacéuticamente aceptables.

33. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1,
5 caracterizado porque es




, o una de sus sales
farmacéuticamente aceptables.

34. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1,
10 caracterizado porque es





, o una de sus sales
farmacéuticamente aceptables.

35. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1,
15 caracterizado porque es





, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

36. Un compuesto caracterizado porque es:



5



, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.