

REIVINDICACIONES

1. Un kit que comprende:

a) un inhibidor de BRAF que es metil N-[(2S)-1-({-4-[3-(5-cloro-2-fluoro-3-metanosulfonamidofenil)-1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]pirimidin-2il}amino)propan-2-il]carbamato (Compuesto A) o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos,

b) un inhibidor de MEK (Compuesto B) el cual es 6-(4-bromo-2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y

c) un anticuerpo anti-EGFR (Compuesto C) el cual es cetuximab.

2. Un kit de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el inhibidor de BRAF es metil N-[(2S)-1-({-4-[3-(5-cloro-2-fluoro-3-metanosulfonamidofenil)-1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]pirimidin-2-il}amino)propan-2-il]carbamato amorfo o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

3. Un kit de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, en la que dicho inhibidor de MEK es 6-(4-bromo-2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada.

4. Un kit de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicha 6-(4-bromo-2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada se caracteriza por tener los picos de difracción de XRPD (2 θ grados) a 20,38 y 28,39.

5. Un kit de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicha 6-(4-bromo-2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada se caracteriza por tener picos de difracción de XRPD (2 θ grados) a 20,38, 28,39 y 11,18.

6. Un kit de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicha 6-(4-bromo-2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada se caracteriza por tener picos de difracción XRPD (2 θ grados) a 20,38, 28,39, 11,18 y 29,18.

7. Un kit de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicha 6-(4-bromo2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada se caracteriza por tener picos de difracción XRPD (2 θ grados) a 20,38, 28,39, 11,18, 29,18, 22,43 y 22,75.

8. Un kit de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicha 6-(4-bromo2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada se caracteriza por tener picos de difracción XRPD (2 θ grados) a 20,38, 28,39, 11,18, 29,18, 22,43, 22,75, 25,23, 16,05 y 11,82.

9. Un kit de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicha 6-(4-bromo2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada se caracteriza se caracteriza por tener picos de difracción XRPD (2 θ grados) a 20,38, 28,39, 11,18, 29,18, 22,43, 22,75, 25,23, 16,05, 11,82, 23,74, 16,33 y 19,00.

10. Un kit de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicha 6-(4-bromo2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada se caracteriza por tener picos de difracción XRPD (2 θ grados) a 20,38, 28,39, 11,18, 29,18, 22,43, 22,75, 25,23, 16,05, 11,82, 23,74, 16,33, 19,00, 30,01, 25,98, 37,34, 6,79, 9,46, 34,20, 30,42 y 31,40.

11. Un kit de acuerdo con la reivindicación 3, en la que dicha 6-(4-bromo2-fluorofenilend amino)-7-fluoro-3-metil-3H-benzoimidazol-5-ácido carboxílico (2-hidroxi etoxi)-amida cristalizada tiene un patrón XRPD sustancialmente como se muestra en la Figura 8:




Figura 8.

12. Un kit de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en la que el inhibidor de BRAF (Compuesto A), el inhibidor de MEK (COMPUESTO B) y el anticuerpo anti-EGFR (Compuesto C) son cada una formulada como formas de dosis única.
13. Un kit de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en la que el inhibidor de BRAF (Compuesto A) esta formulado para la administración oral.
14. Un kit de acuerdo con la reivindicación 13, en la que el inhibidor de BRAF (Compuesto A) esta formulado como una cápsula.
15. Un kit de acuerdo con la reivindicación 14, en la que dicha cápsula comprende 75 mg de Compuesto A.
16. Un kit de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-15, en la que el inhibidor de MEK (Compuesto B) esta formulado para la administración oral.
17. Un kit de acuerdo con la reivindicación 16, en la que el inhibidor de MEK (Compuesto B) esta formulado como tableta.
18. Un kit de acuerdo con la reivindicación 17, en la que la tableta comprende 15 mg de COMPUESTO B.
19. Un kit de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-18, en la que el anticuerpo anti-EGFR (Compuesto C) esta formulado para administración intravenosa.