


REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una forma sólida cristalina del Compuesto 1:




Compuesto 1,

que tiene un patrón XRPD que comprende picos entre y que incluyen 9.7 a 10.1 grados en 2θ , entre y que incluyen 11.6 a 12.0 grados en 2θ , entre y que incluyen 13.2 a 13.6 grados en 2θ , entre y que incluyen 14.2 a 14.6 grados en 2θ , entre y que incluyen 14.6 a 15.0 grados en 2θ , entre y que incluyen 16.8 a 17.2 grados en 2θ , entre y que incluyen 20.5 a 20.9 grados en 2θ , entre y que incluyen 21.3 a 21.7 grados en 2θ , entre y que incluyen 21.4 a 21.8 grados en 2θ , y entre y que incluyen 22.4 a 22.8 grados en 2θ .

2. La forma sólida cristalina de la reivindicación 1, en donde el pico entre y que incluyen 9.7 a 10.1 es 9.9 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 11.6 a 12.0 es 11.8 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 13.2 a 13.6 es 13.4 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 14.2 a 14.6 es 14.4 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 14.6 a 15.0 es 14.8 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 16.8 a 17.2 es 17.0 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 20.5 a 20.9 es 20.7 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 21.3 a 21.7 es 21.5 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 21.4 a 21.8 es 21.6 grados en 2θ , y el pico entre y que incluyen 22.4 a 22.8 es 22.6 grados en 2θ .

3. Una forma sólida cristalina del Compuesto 1:




Compuesto 1,

que tiene un patrón XRPD que comprende picos entre y que incluyen 9.7 a 10.1 grados en 2θ , entre y que incluyen 14.6 a 15.0 grados en 2θ , entre y que incluyen 16.8 a 17.2 grados en 2θ , entre y que incluyen 20.5 a 20.9 grados en 2θ , entre y que incluyen 21.3 a 21.7 grados en 2θ .

4. La forma sólida cristalina de la reivindicación 3, en donde el pico entre y que incluyen 9.7 a 10.1 es 9.9 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 14.6 a 15.0 es 14.8 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 16.8 a 17.2 es 17.0 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 20.5 a 20.9 es 20.7 grados en 2θ , el pico entre y que incluyen 21.3 a 21.7 es 21.5 grados en 2θ .

5. Una forma sólida cristalina del Compuesto 1:



Compuesto 1,

que tiene un patrón XRPD que comprende picos en 9.9 grados en 2θ , 14.8 grados en 2θ , 17.0 grados en 2θ , 20.7 grados en 2θ , y 21.5 grados en 2θ .

6. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto cristalino de cualquiera de una de las reivindicaciones 1-5, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

7. Un método para transformar la Forma A del Compuesto 1 en una Forma C sólida cristalina del Compuesto 1, el método que comprende

proporcionar la Forma A del Compuesto 1 en alcohol isopropílico, acetato de isopropilo, acetato de etilo o una combinación de los mismos, y

cristalizar el compuesto para obtener una Forma C sólida cristalina del Compuesto 1.

8. El método de la reivindicación 7, en donde la etapa de cristalización se realiza mediante conversión en suspensión.

9. El método de la reivindicación 8, en donde la Forma A del Compuesto 1 está en una mezcla de alcohol isopropílico y acetato de isopropilo.

10. El método de la reivindicación 9, en donde la mezcla se calienta a una temperatura de aproximadamente 50 °C.

11. El método de la reivindicación 7, en donde la Forma A del Compuesto 1 están en acetato de etilo.

12. El método de la reivindicación 11, en donde la Forma A del Compuesto 1 se solubiliza cuando está en acetato de etilo.

13. El método de la reivindicación 12, en donde la Forma A solubilizada del Compuesto 1 se calienta a una temperatura de aproximadamente 65°C.

14. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 11-13, que comprende además la adición de cristales de siembra de la Forma C a una carga de aproximadamente 0.1% a aproximadamente 5.0% de la cantidad total del Compuesto 1 presente.