


REIVINDICACIONES


1. Un compuesto de Fórmula (I):






o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque:

R¹ es un péptido capaz de suministrar selectivamente R²L- a través de una membrana que tiene un manto ácido o hipóxico;


R² se selecciona a partir del grupo que consiste en:












,y



L es un grupo seleccionado de:





en donde

R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son cada uno independientemente seleccionados a partir de H, alquilo C_{1-4} , alquenilo C_{1-4} , arilo C_{6-10} , cicloalquilo C_{3-10} , heteroarilo de 5-10 miembros, heterocicloalquilo de 4-10 miembros, halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$, en donde dicho alquilo C_{1-4} , alquino C_{1-4} , arilo C_{6-10} , y heteroarilo de 5-10 miembros son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^3 y R^4 junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-14} o grupo heterocicloalquilo de 4-14 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^3 y R^5 junto con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-14} o grupo heterocicloalquilo de 4-14 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^4 y R^6 junto con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-14} o grupo heterocicloalquilo de 4-14 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^5 y R^6 junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-14} o grupo heterocicloalquilo de 4-14 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^7 y R^8 junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-14} o grupo heterocicloalquilo de 4-14 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^7 y R^9 junto con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-14} o grupo heterocicloalquilo de 4-14 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^8 y R^{10} junto con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-14} o grupo heterocicloalquilo de 4-14 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^9 y R^{10} junto con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-14} o grupo heterocicloalquilo de 4-14 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

Z es arilo C_{6-10} o heteroarilo de 5-10 miembros; en donde el heteroarilo de 5-10 miembros tiene al menos un átomo de carbono formador de anillo y 1, 2, 3, o 4 heteroátomos formadores de anillo independientemente seleccionados a partir de N, O, y S, en donde el arilo C_{6-10} y el heteroarilo de 5-10 miembros son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de alquilo C_{1-4} , halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$,

$C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$,
 $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

A es H o alquilo C_{1-4} ;


R^{a1} , R^{b1} , R^{c1} , y R^{d1} son cada uno independientemente seleccionados a partir de H, alquilo C_{1-6} , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , haloalquilo C_{1-6} , OH, CN, NO_2 , y CO_2CH_3 ; en donde dicho alquilo C_{1-6} y alquenilo C_{2-6} son cada uno opcionalmente sustituidos con OH, CN, NO_2 , o CO_2CH_3 ; y


n s 0, 1, o 2.

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque:

R^1 es un péptido capaz de suministra selectivamente R^2L^- a través de una membrana celular que tiene un manto ácido o hipóxico;



R^2 se selecciona a partir del grupo que consiste en:






;

L es un grupo seleccionado a partir de:





en donde

R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son cada uno independientemente seleccionados a partir de H, alquilo C_{1-4} , alquenilo C_{1-4} , arilo C_{6-10} , heteroarilo de 5-10 miembros, halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$, en donde dicho alquilo C_{1-4} , alquenilo C_{1-4} , arilo C_{6-10} , y heteroarilo de 5-10 miembros son cada uno opcionalmente sustituidos con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^3 y R^4 junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-7} opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^3 y R^5 junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-7} opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^4 y R^6 junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-7} opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$, $OC(O)R^{b1}$, $OC(O)NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}R^{d1}$, $NR^{c1}C(O)R^{b1}$, $NR^{c1}C(O)OR^{a1}$, y $NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1}$;

o R^5 y R^6 junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C_{3-7} opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO_2 , OR^{a1} , SR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$,

OC(O)R^{b1}, OC(O)NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}C(O)R^{b1}, NR^{c1}C(O)OR^{a1}, y NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1};

o R⁷ y R⁸ junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C₃₋₇ opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO₂, OR^{a1}, SR^{a1}, C(O)R^{b1}, C(O)NR^{c1}R^{d1}, C(O)OR^{a1}, OC(O)R^{b1}, OC(O)NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}C(O)R^{b1}, NR^{c1}C(O)OR^{a1}, y NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1};

o R⁷ y R⁹ junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C₃₋₇ opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO₂, OR^{a1}, SR^{a1}, C(O)R^{b1}, C(O)NR^{c1}R^{d1}, C(O)OR^{a1}, OC(O)R^{b1}, OC(O)NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}C(O)R^{b1}, NR^{c1}C(O)OR^{a1}, y NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1};

o R⁸ y R¹⁰ junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C₃₋₇ opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO₂, OR^{a1}, SR^{a1}, C(O)R^{b1}, C(O)NR^{c1}R^{d1}, C(O)OR^{a1}, OC(O)R^{b1}, OC(O)NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}C(O)R^{b1}, NR^{c1}C(O)OR^{a1}, y NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1};

o R⁹ y R¹⁰ junto con el átomo de carbono al cual se unen forman un grupo cicloalquilo C₃₋₇ opcionalmente sustituido con 1, 2, o 3 sustituyentes independientemente seleccionados a partir de halo, CN, NO₂, OR^{a1}, SR^{a1}, C(O)R^{b1}, C(O)NR^{c1}R^{d1}, C(O)OR^{a1}, OC(O)R^{b1}, OC(O)NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}R^{d1}, NR^{c1}C(O)R^{b1}, NR^{c1}C(O)OR^{a1}, y NR^{c1}C(O)NR^{c1}R^{d1};

A es H o alquilo C₁₋₄; y

R^{a1}, R^{b1}, R^{c1}, y R^{d1} son cada uno independientemente seleccionados a partir de H, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, haloalquilo C₁₋₆, OH, CN, NO₂, y CO₂CH₃; en donde dicho alquilo C₁₋₆ y alquenilo C₂₋₆ son cada uno opcionalmente sustituidos con OH, CN, NO₂, o CO₂CH.

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R¹ es un péptido capaz de suministrar selectivamente R²L⁻ a través de una membrana celular que tiene un manto ácido o hipóxico que tiene un pH menor de aproximadamente 6.0.
4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R¹ es un péptido que comprende al menos una de las siguientes secuencias:

ADDQNPWRAYLDLLFPTDLLLLLLWCG (SEQ ID NO. 1; Pv1),

AEQNPIYWARYADWLFTTPLLALLVDADECG (SEQ ID NO. 2; Pv2),

ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWDADECG (SEQ ID NO. 3; Pv3), y

AAEQNPIYWWARYADWLFTTPLLALLVDADEGTCG (SEQ ID No. 6; Pv6); en donde R¹ se une a L mediante un residuo cisteína de R¹.

5. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R¹ es un péptido que comprende al menos la siguiente secuencia:

ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWCG (SEQ ID NO. 1; Pv1).

6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R¹ es un péptido que comprende al menos la siguiente secuencia:

AEQNPIYWARYADWLFTTPLLALLVDADECG (SEQ ID NO. 2; Pv2).


7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R¹ es un péptido que comprende al menos la siguiente secuencia:

ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWDADECG (SEQ ID NO. 3; Pv3).


8. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R¹ es un péptido que comprende al menos la siguiente secuencia:

AAEQNPIYWWARYADWLFTTPLLALLVDADEGTCG (SEQ ID NO. 6; Pv6).


9. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R² es:



10. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R² es:




11. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R^2 es:




12. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, o una sal


farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R^2 es:




13. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L es:




14. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L es:




15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L es:




16. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L es:



17. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L es:





18. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L es:







19. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-18, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸,



R^9 , y R^{10} son cada uno independientemente seleccionados a partir de H y alquilo C_{1-4} .


20. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-18, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , y R^{10} son cada uno H.
21. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque A es H.
22. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque A es CH_3 .
23. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-22, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Z es fenilo.
24. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-23, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque n es 0.
25. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-23, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque n es 1.
26. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-23, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque n es 2.
27. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se selecciona a partir de:














o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los mencionados anteriormente.

28. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se selecciona a partir de:







;




;




;



;



;y



o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los mencionados anteriormente.

29. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-28, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
30. Un método para tratar cáncer en un paciente en necesidad del mismo, caracterizado porque comprende administrar al paciente una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-28, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
31. El método de conformidad con la reivindicación 30, caracterizado porque el cáncer se selecciona a partir de cáncer de vejiga, cáncer de hueso, glioma, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, cáncer colorrectal, cáncer de endometrio, cáncer epitelial, cáncer de esófago, sarcoma de Ewing, cáncer de páncreas, cáncer de vesícula biliar, cáncer gástrico, tumores gastrointestinales, cáncer de cabeza y cuello, cánceres intestinales, sarcoma de Kaposi, cáncer de riñón, cáncer de laringe, cáncer de hígado, cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de próstata, cáncer de recto, carcinoma renal de células claras, cáncer de piel, cáncer de estómago, cáncer testicular, cáncer de tiroides, y cáncer de útero.
32. El método de conformidad con la reivindicación 30, caracterizado porque el cáncer se selecciona a partir de cáncer de pulmón, cáncer colorrectal y cáncer gástrico.