



REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica que comprende;
 - a) 0,5-100 mg de derivado de EGF(A),
 - b) 20-1000 mg, tal como 50-600 mg, de una sal de ácido N-(8-(2-hidroxibenzoil)amino)caprílico y
 - c) 10-600 mg de un hidrótrofo capaz de aumentar la solubilidad de SNAC al menos 2 veces, tal como 5 veces o tal como al menos 10 veces.
2. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el hidrótrofo es nicotinamida o resorcinol.
3. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la relación de sal de NAC/hidrótrofo (p/p) es 0,5-10, tal como 0,5-8 o tal como 0,5-5.
4. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición comprende, además, un lubricante seleccionado de estearato de magnesio o dibehenato de glicerilo.
5. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores que consiste de;
 - a) un derivado de EGF(A)
 - b) una sal de ácido N-(8-(2-hidroxibenzoil)amino)caprílico, tal como la sal de sodio de NAC (SNAC),
 - c) nicotinamida y
 - d) al menos un lubricante.
6. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde una dosis unitaria comprende;
 - i) 0,5-100 mg, tal como 1,0-50 mg de un derivado de EGF(A)
 - ii) 50-600 mg de sal de ácido N-(8-(2-hidroxibenzoil)amino)caprílico (NAC), tal como la sal de sodio de NAC (SNAC)
 - iii) 20-400 mg de nicotinamida y
 - iv) 0-15 mg de lubricante.
7. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el derivado de EGF(A) se selecciona del grupo de derivados de EGF(A) # 31, 95, 128, 133, 143, 144, 150, 151, 152 y 153 con las siguientes estructuras:


31




95




128




133



143



144



Chemical structure of the protein complex, showing the protein backbone and the attached lipid tails. The protein sequence is H-G T N E-N H-L D N L G-G-N H-S H V-N H-R D L E-I G Y E-N H-L P D G-F Q L V A-N H-R-N H-E-N H-O H. The lipid tails are attached to the protein backbone via a complex linkage involving a long chain of 18 carbons and a short chain of 4 carbons.

Chemical structure of the 12S subunit of the 20S proteasome core particle. The structure shows a complex polypeptide chain with various modifications, including a long fatty acid chain at the N-terminus, a hydroxamic acid group, and a long aliphatic chain at the C-terminus. The structure is labeled with '12S' and '20S'.

-
- Chemical structure of a protein complex, likely a dimeric protein with two long, flexible linker regions. The structure shows two protein subunits, each with a long, flexible linker region (indicated by wavy lines) connecting the N-terminus and C-terminus. The linker regions are labeled with amino acid sequences: H-G T N E-N H-C L D N L G and G-N H-C S H V-N H-C R D L E. The linker regions are also labeled with 'S' and 'P' indicating specific residues. The structure is shown in a 3D representation with various atoms and bonds labeled.

10. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde una unidad de dosis comprende;
 - a) 1-100 mg, tal como 2-75 mg, tal como 3-50 mg o tal como 1-25 mg del derivado de EGF(A),
 - b) 100-600 mg de SNAC,
 - c) 20-400 mg de hidrótrofo y
 - d) 0,1-30 mg de lubricante, tal como estearato de magnesio.
11. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde una unidad de dosis comprende;
 - a) 1-100 mg, tal como 2-75 mg, tal como 3-50 mg o tal como 1-25 mg del derivado de EGF(A),
 - b) 100-600 mg de SNAC,
 - c) 20-400 mg de nicotinamida y
 - d) 0,1-30 mg de estearato de magnesio.
12. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición es una composición sólida, tal como un tableta, para la administración oral.
13. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores para su uso en un método para mejorar los parámetros lipídicos y/o prevenir y/o tratar enfermedades cardiovasculares.
14. Un método de tratamiento de un sujeto que lo necesita, en donde el método comprende administrar una cantidad terapéuticamente activa de una composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores a dicho sujeto.
15. Un método para producir una composición farmacéutica sólida que comprende las etapas de;
 - a) obtener una sal de NAC y un hidrótrofo,
 - b) coprocesar dicha sal de NAC e hidrótrofo de a) y
 - c) preparar dicha composición farmacéutica sólida mediante el uso del producto de b) y un derivado de EGF(A).